

ORIGINAL ARTICLE

The Role of MicroRNA-429 in E2F3 Expression in Breast Cancer Cell Lines

Saeedeh Darvishi¹,

Nahid Atyabi²,

Arshad Hosseini^{3,4},

Pouria Omidi⁵,

Farhad Zaker⁶,

Arash Ghalyanchi Langeroudi⁷

, Siavash Moradi⁸

¹ PhD Student in Clinical Pathology, Department of Clinical Pathology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran

² Professor, Department of Clinical Pathology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran

³ Assistant Professor, Department of Medical Biotechnology, School of Allied Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

⁴ Assistant Professor, Cellular and Molecular Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

⁵ MSc Student in Medical Biotechnology, School of Allied Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

⁶ Professor, Department of Hematology, School of Allied Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

⁷ Associate Professor, Department of Microbiology and Immunology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran

⁸ Assistant Professor, Gastrointestinal Cancer Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

(Received February 7, 2018 ; Accepted November 6, 2018)

Abstract

Background and purpose: MicroRNA regulation of cancer-related pathways has a major effect on cancer development. MiR-429 is a member of miR-200 family with an important role in metastasis. There are many studies on the association between miR-429 and liver, bladder, bowel, and gastric cancers. In this study, we investigated the expression changes of E2F3 genes after transfection of MCF-7 cells using pre-miR-429 and anti-miR-429 as the potential targets of miR-429.

Materials and methods: In this experimental study, E2F3 was predicted as the potential target of miR-429 using miRNA bioinformatics tools. MCF-7 cells were then transfected with both miR-429 precursor and inhibitory vectors. RNA extraction and cDNA synthesis were done after 48 hr. Expression of miR-429 and target gene were determined by qRT-PCR.

Results: The comparison between the results of untransfected cells group, transfected with pre-miR-429 group, and transfected with anti-miR-429 group showed that down-regulation of miR-429, increased the expression level of E2F3 in cells transfected with miR-429 inhibitory vector (9.38 folds). Expression level of E2F3 decreased in cells transfected with pre-miR-429 vector (5.3 folds).

Conclusion: Low expression level of miR-429 in breast cancer was found to be effective in bone metastasis, although in ovarian cancer and colorectal carcinoma, resulted in decreasing invasion and metastasis. In current study, the expression level of E2F3 decreased when transfected with pre-miR-429 vector and increased when transfected with anti-miR-429 vector, therefore, miR-429 could be a potential target in breast cancer therapy.

Keywords: breast cancer, MCF-7, miR-429, E2F3

J Mazandaran Univ Med Sci 2019; 28 (168): 29-39 (Persian).

* Corresponding Author: Arshad Hosseini - School of Allied Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran. (E-mail: hoseini.a@iums.ac.ir)

بررسی نقش miR-429 با میزان بیان ژن E2F3 در رده سرطان پستان

سعیده درویشی^۱ناهید اطیابی^۲ارشد حسینی^{۳,۴}پوریا امیدی^۵فرهاد ذاکر^۶آرش قلیانچی لنگرودی^۷سیاوش مرادی^۸

چکیده

سابقه و هدف: یکی از عوامل کنترل کننده بسیاری از اجزای سلولی و عملکرد های بیولوژیک در سطح اپی ژنتیک، MicroRNA ها می باشند. miR-429 جزو خانواده miR-200 بوده و در متاستاز سرطان دخالت دارد. مطالعات بسیاری ارتباط miR-429 را با سرطان کبد، مثانه، روده و معده بررسی کرده اند. این مطالعه با هدف تغییر بیان ژن E2F3 پس از ترانسفکت کردن سلول های MCF-7 با وکتورهای anti-miR-429 و pre-miR-429 به عنوان هدف احتمالی miR-429 انجام پذیرفت.

مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، با استفاده از پایگاه های داده miR و ابزار های بیوانفورماتیکی E2F3 به عنوان هدف miR-429 پیش بینی شد. سپس سلول های MCF-7 با دو وکتور anti-miR-429 و pre-miR-429 ترانسفکت شدند. پس از گذشت ۴۸ ساعت، استخراج RNA و سنتز cDNA انجام شد. میزان بیان miR-429 و ژن هدف با استفاده از روش Real-Time PCR بررسی شد.

یافته ها: نتایج حاصل از مقایسه گروه سلول های ترانسفکت نشده، ترانسفکت شده با pre-miR-429 و ترانسفکت شده با anti-miR-429 نشان دهنده افزایش بیان ژن هدف در اثر ترانسفکشن با ۹/۳۸ (anti-miR-429 برابر) و کاهش بیان در اثر ترانسفکشن با pre-miR-429 می باشد (۵/۳ برابر).

استنتاج: کاهش بیان miR-429 در متاستاز به استخوان در سرطان پستان نقش داشته و در تومور تخدمان و کارسینومای کولورکتال کاهش بیان آن باعث کاهش متاستاز و تهاجم می گردد. در مطالعه حاضر نشان داده شد که میزان بیان E2F3 در اثر ترانسفکت با pre-miR-429 افزایش می یابد، بنابراین miR-429 می تواند به عنوان ساپرس کننده تومور در سرطان پستان از طریق مهار E2F3 عمل کند.

واژه های کلیدی: سرطان پستان، MCF7، miR-429، ژن E2F3

مقدمه

شایعترین سرطان در میان زنان ایرانی، سرطان پستان می باشد. میزان شیوع این بیماری از سال ۱۹۸۰ به بعد در آن نسبت به کشورهای غربی بیش تر می باشد^(۱). میزان

- مؤلف مسئول:** ارشد حسینی - تهران: بزرگراه همت غرب، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پرایزشکی، گروه بیوتکنولوژی پزشکی ۱. دانشجویی دکترای تحصیلی کلبیکال پاتولوژی، دانشکده دامپزشکی، گروه کلبیکال پاتولوژی، دانشگاه تهران، ایران ۲. استاد، گروه کلبیکال پاتولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران ۳. استادیار، گروه بیوتکنولوژی پزشکی، دانشکده پرایزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران ۴. استادیار، مرکز تحقیقات سلولی مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران ۵. دانشجویی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی، دانشکده پرایزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران ۶. استاد، گروه همانولوژی، دانشکده پرایزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، ایران، تهران ۷. دانشیار، گروه مکروبیولوژی و ایمنولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران ۸. استادیار، مرکز تحقیقات سرطان دستگاه گوارش، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
- تاریخ دریافت: ۱۳۹۶/۱۱/۸ تاریخ ارجاع چشم اصلاحات: ۱۳۹۶/۱۱/۸ تاریخ تصویب: ۱۳۹۷/۷/۱۵

بیماری مورد توجه قرار گیرد. می‌توان با بررسی ارتباط miR-429 با ژن‌هایی که به عنوان ژن هدف در مطالعات بیوانفورماتیک پیش‌بینی شده‌اند، به بررسی عملکرد این mRNA در بسیاری از فرآیندهای تنظیمی سلولی که در طری سرطان پستان رخ می‌دهد پرداخت. از طرفی در زمینه اهمیت انتخاب پروسه درمانی مناسب در سرطان پستان مشکلات فراوانی وجود دارد و عوارض برخی روش‌های درمانی و همچنین قیمت بسیار بالای برخی داروها، پروسه درمان را مشکل می‌کند. دسته‌بندی‌های رایج در جهت درمان بیماری هنوز در ایران چندان جای نیافتد و به شکل یک‌سواختی در درمان بیماری به کار گرفته نمی‌شود. تاکنون مطالعه‌ای در این خصوص و با بررسی بیان بیومارکرهای مورد استفاده در سطح mRNA و پروتئین صورت نگرفته است. از mRNA در حیطه تحقیقات پزشکی، خصوصاً در زمینه سرطان استفاده‌های زیادی می‌شود. تشخیص بر مبنای پروفایل بیانی mRNA و طراحی داروهای هدفمند بر پایه mRNA نیز از جمله این موارد می‌باشد. نقش دو گانه miR-200 در سرطان پستان اولیه و متاستاز شده از جذابیت‌های آن برای درمان‌های آینده می‌باشد که در ک فعل و انفعالات داخلی و اثرات متقابل آن را به طور miR-200 ترداری اهمیت می‌کند. خانواده miR-200c، miR-200b، miR-200a، miR-141 و miR-429 می‌باشد. براساس محل قرار گیری هر کدام از microRNA های خانواده ۲۰۰، این microRNA ها به دو گروه تقسیم‌بندی می‌شوند. mir-429 و mir-200b که بر روی کروموزوم ۱، ۱p36 و mir-141 و mir-200c بر روی کروموزوم ۱2p13 قرار گرفته‌اند. اولین گزارشی که در آن به ارتباط بین ۲۰۰ miR و بیماری در انسان اشاره شد، مربوط به الگوی بیانی سلول‌های عصبی مربوط به بیانی بوده است. پس از آن دیده شد که در طی بدخیمی‌های توموری، miR-200 به عنوان یک عامل بازدارنده کلیدی برای متاستاز و جلوگیری از انتقال حالت سلول‌های اپی‌تیالی به

بروز سرطان پستان در ایران ۲۵ زن در هر ۱۰۰ هزار زن بوده و هر ساله ۷۵۰۰ مورد جدید ابتلا به این سرطان گزارش شده است(۴). سرطان پستان بر اساس الگوهای مختلف بیان ژنی به چهار گروه تقسیم می‌شود. این چهار گروه شامل، دسته‌ای که در آن گیرنده استروژن بیان می‌شود که به نوع لومینال A شناخته می‌شود، گروهی که گیرنده استروژن در آن بیان می‌شود اما سطح گیرنده هورمونی پایینی داشته و به نام لومینال B شناخته می‌شود، گروهی که در آن گیرنده HER2 می‌شود و گروهی که در آن هیچ یک از گیرندهای استروژن، پروژسترون و HER2 بیان نمی‌شود و از نظر داشتن هر سه گیرنده، منفی است، می‌باشد. سرطان به عنوان یک بیماری ژنتیکی پیچیده شناخته شده است که در آن بسیاری از مکانیسم‌ها چه در سطح ژنتیک و چه در سطح اپی‌ژنتیک نقش دارند. از مکانیسم‌های کنترل اپی RNA ژنتیکی می‌توان از توالی‌های کوتاه غیر کدکننده microRNA ها نیز نامیده می‌شوند، یاد کرد. microRNA ها با کنترلی که پس از انجام فرآیند رونویسی بر روی کل محتوای رونوشت ژن‌ها دارند می‌توانند در بسیاری از پروسه‌ها سرطان را به سمت بدخیمی یا بالعکس ببرند. microRNA ها می‌توانند در تغییر سیکل سلولی، آپوپتوز، مقاومت دارویی، تاثیر در محیط اطراف تومور، اثرات قابل توجهی در سرنوشت سلول‌های سرطانی داشته باشند. گفته می‌شود که تنظیم بیان ۳۰ درصد از ژن‌های کدکننده پروتئین پس از ترجمه توسط RNA غیر کدکننده صورت می‌گیرد(۵). ۵۰ درصد از ژن‌های microRNA در ناحیه ژنومی مربوط به سرطان قرار دارد و این یافته حاکی از آن است که microRNA ها می‌توانند در زیست‌شناسی سرطان نقش بسیار پر رنگی داشته باشند(۶). با توجه به این که سرطان پستان شایع‌ترین نوع سرطان انسان و حیوان است، به طوری که سالیانه موارد متعدد و جدیدی از این بیماری در جهان تشخیص داده می‌شود، ضروری است نقش mRNA ها و مطرح شدن ژن‌های جدید و نقش آن‌ها در ایجاد و دسته‌بندی این

شد. هر چند میزان تغییر بیان miR-141 و miR-200C نتایج متفاوتی داشت اما نشان داده شد که در هر صورت در بیماران مبتلا به سرطان پستان این دو miRNA نقش کنترلی داشته‌اند و میزان بیان آن‌ها با چگونگی پیشرفت سرطان پستان ارتباط مستقیم داشته است (۱۰). اولین گزارشی که ارتباط miR-200 با cancer stem cell را با Shimono نشان داد در سال ۲۰۰۹ بود که در این مطالعه همکاران در بررسی میزان بیان ۳۷ نوع miRNA در سلول‌های بنیادی سرطانی پستان و همچنین سلول‌های سرطانی غیر تومور را نشان دادند که بیان هر ۵ عضو خانواده miR-200 در سلول‌های بنیادی سرطانی پستان، سلول‌های عادی شیری انسانی و موشی کاهش یافته است و miR-200 در جلوگیری از ایجاد سلول‌های سرطانی پستان و سلول‌های سرطانی جنبی نقش بسزایی دارد (۹). در مطالعه شکرالله زاده و همکاران، افزایش بیان معنی‌دار E2F3 به میزان ۶/۷ برابر با کاهش بیان miR-141 پس از ترانسفکت با anti-miR-141 داده شد (۱۲). با توجه به موارد ذکر شده، مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش miR-429 با میزان بیان ژن E2F3 در رده سرطان پستان، انجام پذیرفت.

مواد و روش‌ها

کشت سلول‌های MCF-7

در این مطالعه تجربی، سل لاین MCF7 (رده سلولی انسانی آدنو کارسینومای پستان) سلول‌ها در محیط DMEM-F12 که حاوی ۱۰ درصد سرم جنین گاو در ۳۵ درجه سانتی‌گراد و آتمسفر مرطوب حاوی ۵ درصد کربن دی اکسید بود کشت داده شدند. سلول‌ها با غلظت ۱۰ \times در یک پلیت ۲۴ خانه‌ای به مدت ۲۴ ساعت قبل از انتقال قرار داده شد.

وکتور بازدارنده miRNA-429 و پیش‌ساز miRNA-429 وکتور بازدارنده و پیش‌ساز و ماک به صورت آماده از شرکت abm-goods کانادا خریداری گردید. این وکتور از نوع لنتی ویروسی می‌باشد که برای کاهش

مزانشیمی یا EMT می‌شود. به علاوه، miR-200 دارای توانایی بازدارندگی نوزایی سلول‌های سرطانی شبه بنیادی و همچنین بازدارندگی از مقاومت به شیمی درمانی miR-429. miR-200 جزو خانواده miR-429 می‌باشد و نقش مهمی در پروگنووز تومور دارد. ژن‌های این خانواده در پیشرفت و متاستاز تومور، در جایی که (Epithelial Mesanchimal Transition) EMT می‌دهد، به طور گستره مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. miR-429 در هپاتوسلولار سل کارسینوما باعث افزایش تکثیر سلولی و مهار آپوپتوز شده و در آن افزایش بیان داریم. بنابراین ساپرس شدن بیان miR-429 باعث ممانعت از تکثیر سلولی و تحریک آپوپتوز سلولی می‌شود. miR-429 دارای نقش دوگانه در تومور می‌باشد و نقش‌های متفاوت miR-429 در انواع مختلف سرطان‌ها ممکن است به علت تفاوت در ژن‌های هدف و نوع سلول باشد. بر اساس مطالعات گوناگون، miR-429 در سرطان‌های pancreatic، gastric، colorectal، ductal adenocarcinoma در آن‌ها ژن‌های c-myc، sox-2، Ep-300، breast cancer stem cell از نقش انکوژنیک دارد و در آن‌ها ژن‌های E2F3 در سرطان پستان می‌تواند این سرطان را ساپرس کند. بیان این miR-200 در cancer stem cell کاهش می‌یابد و همه‌ی اعضای miR-429 در آن‌ها ژن‌های آن جا که رده سلولی MCF-7 دارای گیرنده ER می‌باشد، مطالعات زیادی اثرات مقاومت به داروهای ضد استروژنی را با مواجهه قرار دادن این رده‌ی سلولی با تاموکسیفن و داروهای هم‌خانواده آن مثل رلوکسیفن موردنظر قرار داده‌اند. بررسی miRNA در نمونه‌های بافعی و خون بیماران می‌تواند اطلاعات بسیار مفیدی در مورد پیش‌آگهی و پیشرفت سرطان در اختیار قرار دهد. در مورد سرطان پستان در مطالعه Antolín و همکاران بر روی ۵۷ بیمار مبتلا به درجه ۴ سرطان پستان و مقایسه آن‌ها با ۲۰ نمونه کنترل، میزان بیان miR-141 و miR-200C در خون با روش Real-timePCR اندازه گیری

۳۹۵ نانومتر تحریک می شود و انرژی الکترون های آن به تراز بالاتری برده می شود تا این که در طول موج ۵۰۷ نانومتر از خود تابش سبز رنگی را ساطع کرده که در زیر میکروسکوپ با استفاده از فیلتر ۳۹۵ نانومتر دیده می شود.

تست MTT

سلول های سرطان سینه در یک پلیت ۹۶ خانه ای قرار داده شدند. این تست ۴۸ ساعت بعد از انتقال وکتورها انجام شد. ۱۰۰ μl از محلول MTT که حاوی ۵ mg/ml (سوبسترات فورمازان) می باشد درون هر چاهک ریخته و ۴ ساعت در انکوپاتور قرار داده شد. پس از خارج کردن مایع MTT، و با اضافه کردن ۱۰۰ μl ۰/۰۴٪ ایزوپروپانول که حاوی اسید هیدروکلریک M می باشد، به مدت ۲۰ دقیقه انکوبه گردید. جذب رنگ بنفش ایجاد شده در هر چاهک در ۴۵۰ nm با استفاده از microplate reader اندازه گیری شد.

استخراج RNA، سنتز cDNA و Real-Time qRT-PCR
کارایی ترانسفکشن پس از ۴۸ ساعت چک شد و به منظور تغییر بیان ژن هدف توسط ورود وکتور جدید به سلول، RNA توتال سلول توسط کیت استخراج cDNA (korea) GeneAll RNA برای miRNA، توسط پرایمرهای stem-loop در کیت biorbyte، England) انجام شد و جهت بررسی تغییر میزان بیان mir از کیت اختصاصی Real-Time PCR (England) حاوی پرایمرهای اختصاصی این استفاده گردید. علاوه بر چک کردن میزان microRNA Real-Time qRT-PCR بیان mir با استفاده از روش (ایران) استفاده شد و تیمار نشده بررسی شد. جهت سنتز cDNA برای ژن هدف از کیت یکتا تجهیز آزمایشگاهی SYBR® Premix Ex Taq™ IITaKaRa (Japan) انجام شد. در پایان تغییر میزان بیان ژن ها با استفاده از متدهای ΔCt تحلیل شد. توالی پرایم مربوط به ژن هدف در جدول شماره ۱ نشان داده شده است.

بيان mRNA با اتصال به ناحیه 3'P و یا 5'P طراحی شده است. از سویه Top10 برای تکثیر و انجام ترانسفورماسیون وکتور استفاده گردید. پس از انجام واکنش ترانسفورماسیون جهت اطمینان از انتقال پلاسمید به باکتری، پلاسمید های نوترکیب با استفاده از کیت استخراج پلاسمید استخراج شده و اندازه آن ها با ژل الکتروفوروز آگارز مشخص و تایید گردید. محلول حاصل از استخراج پلاسمید توسط دستگاه نانو دراپ تعیین غلظت شد.

ترانسفکشن موقت سلول

برای انجام ترانسفکشن با استفاده از لیپوفکتامین ۲۰۰۰، سلول های MCF-7 در پلیت ۲۴ خانه seed شدند. از آن جایی که آنتی بیوتیک یک عامل ممانعت کننده برای ترانسفکشن می باشد، در هنگام کردن سلول ها از محیط کامل حاوی ۲۰ درصد بدون آنتی بیوتیک استفاده شد. ۲۴ ساعت قبل از ترانسفکشن، ۱۰۰۰۰ سلول را در پلیت ۲۴ خانه Seed گردید. سلول ها در روز ترانسفکشن بايد بین ۹۰ تا ۹۵ درصد باشد. جهت انجام ترانسفکشن، در یک میکروتیوب ۵۰ μl DMEM بدون سرم و بدون آنتی بیوتیک ریخته شد. سپس ۱ μl از لیپوفکتامین به آن اضافه گردید. در میکروتیوب دوم نیز ۵۰ μl DMEM بدون سرم و بدون آنتی بیوتیک ریخته شد. ۱ μg از وکتور به محیط اضافه گردید و به مدت ۵ دقیقه در دمای اتاق انکوبه شد. بعد از ۵ دقیقه محلول حاوی DNA را با محلول حاوی لیپوفکتامین مخلوط کرده و به ۲۰ دقیقه در دمای اتاق انکوبه گردید تا DNA و لیپوفکتامین در این زمان به خوبی باهم برهمنکش داشته باشند. سپس ۱۰۰ μl از مخلوط موجود در میکروتیوب ها به هر چاهک اضافه گردید. ۶-۴ ساعت بعد از تعویض محیط آن و جایگزینی با محیط حاوی FBS، در انکوپاتور قرار داده شد. کارایی ترانسفکشن بعد از ۲۴ تا ۴۸ ساعت بعد از ترانسفکت با استفاده از بررسی میزان فلورسنس حاصل از GFP بررسی شد. وکتورهای استفاده شده در این مطالعه دارای توالی GFP می باشند. GFP در طول موج

جدول شماره ۱: توالی و خصوصیات پرایمر ژن E2F3

	Sequence (5'-3')	Length	Tm	GC%
Forward primer	GCCTGACTCAATAGAGAGCCTAC	۲۲	۵۹/۴۹	۵۷/۱۷
Reverse primer	AGTCTTTGGAAAGCGGGTTTAGG	۲۲	۶۰/۵۵	۵۱/۰۰
Product length		۱۵۵		
Exon junction	1326/1327 (forward primer) on template NM_001949.4			

بررسی های بیوانفورماتیک جهت تعیین ژن هدف و آنالیز های آماری از پایگاه های داده میکرو RNA و ابزارهای miRWalk، miRBASE، miRMap، miRanda و TargetScan به منظور تعیین پیش بینی ژن های هدف miRNA-429 استفاده گردید و E2F3 به عنوان هدف miR-429 پیش بینی شد. در مقایسه بیان ژن از محاسبه با روش $\Delta\Delta CT$ استفاده شد و میزان فولدینگ گزارش گردید. تفاوت معنی دار بین میزان بیان ژن ها با آزمون کای اسکوئر و با مقایسه با گروه کنترل، منفی می باشد.

یافته ها

پیش بینی ژن هدف توسط پایگاه های داده و ابزار های بیوانفورماتیک

در این مطالعه با استفاده از پایگاه های داده و ابزارهای بیوانفورماتیک ژن هایی که احتمال دارند با miR-429 کنترل شوند، پیش بینی شده اند. در جدول شماره ۲، نحوه اتصال در ژن هدف seed در miR-429 و همچنین محل اتصال آن ها به صورت گرافیک نمایش داده شده است. لازم به ذکر است که این اطلاعات از پایگاه داده Target scan استخراج گردید.

ترانسفکشن برای وکتور های وکتور بازدارنده و mir-429 کننده

بر روی محیط انتخابی حاوی آنتی بیوتیک کانامايسین، باکتری های دریافت کننده ی وکتور رشد کرده است. کلونی هایی که به صورت تکی در پلیت هستند برای استخراج برداشته شد.

ترانسفکشن سلول MCF-7 تصویر فلورسنت و تصویر نوری سلول MCF-7 ترنسفکت شده با وکتور anti-miR-429 و همچنین وکتور pre-miR-429 سیگنال های حاصل از پروتئین GFP را نشان می دهد. از آنجا که قطعه مورد نظر در این مطالعه با این پروتئین فیوز شده است، می توان نتیجه گرفت که عملیات ترانسفکشن با موفقیت انجام شده و سلول های MCF-7 این توالی را بیان کرده اند (تصویر شماره ۱).



تغییر بیان miR-429 پس از ترانسفکشن سلول MCF-7 این مطالعه بر روی سلول های MCF-7 در سه گروه انجام شد که شامل، گروه اول سلول های ترانسفکت شده با وکتور پیش ساز miR-429، گروه دوم سلول های miR-429 و گروه سوم سلول های ترانسفکت نشده به عنوان گروه کنترل، می باشد. سلول های MCF-7، ترانسفکت شدن و پس از استخراج RNA و سنتز cDNA میزان بیان miR-429 در Real-Time PCR هر سه گروه سلول با استفاده از miR-429 در سلول های سنجیده شد. تغییرات میزان بیان miR-429 نسبت به ترانسفکت شده با وکتور بازدارنده miR-429- $\Delta\Delta CT$ ۶/۷ کاهش ۲ گروه کنترل با استفاده از روش $\Delta\Delta CT$ برابر را نشان داد. از طرفی، با استفاده از آزمون آماری مربع کای دو در مقایسه تغییرات میزان بیان بین دو گروه سلول های ترانسفکت شده با وکتور بازدارنده miR-429 و گروه کنترل که ترانسفکت نشده، تفاوت معنی دار مشاهده شد ($p < 0.05$). در مورد سلول های ترانسفکت شده با وکتور پیش ساز miR-429 نسبت به گروه کنترل نتایج نشان داد که میزان بیان miR-429 در این سلول ها افزایش داشته است و با استفاده از روش $\Delta\Delta CT$ ۲ افزایش ۴/۲ برابر بوده است. سیگنال GFP مثبت نیز دیده شده است و این افزایش بیان، معنادار بود ($p < 0.05$). نمودار شماره ۱، تغییرات بیان miR-429 در سه گروه ترانسفکت شده با وکتور پیش ساز و مهار کننده miRNA و گروه کنترل را نشان می دهد.

جدول شماره ۲: نحوه اتصال ژن‌های پیش‌بینی شده و miR-429

	Predicted consequential pairing of target region (top) and miRNA (bottom)	Site type
Position 2436-2442 of E2F3 3' UTR hsa-miR-429	5' ...AGUGGGUUAAGUACUACAGUAUUU... 3' ...UGCCAAAUGGUCU-GUCAUAAU	7mer-m8
Position 2857-2863 of E2F3 3' UTR hsa-miR-429	5' ...CUGUAAAUAUUUGCAGUAAU... 3' ...UGCCAAAUGGUCUGUCAUAU	7mer-m8

* 7mer-m8: An exact match to positions 2-8 of the mature miRNA (the seed + position 8)

** 8 mer: An exact match to positions 2-8 of the mature miRNA (the seed + position 8) followed by an 'A'





الف




ب

نمودار شماره ۱: تغییرات بیان miR-429 در سه گروه ترانسفکت شده با وکتور پیش ساز و مهار کننده E2F3 mRNA و گروه کنترل از روش

ارتباط بیان ژن E2F3 و miR-429
برای بررسی تغییر بیان ژن تست Real-Time PCR به صورت سه بار تکرار انجام شد. CT ژن E2F3 در اثر ترانسفکشن با anti-miR-429 کاهش یافت که این کاهش معنی دار است (افزایش بیان ژن به میزان ۹/۳۸ برابر) ($p < 0.05$). در سلول های ترانسفکت شده با pre-miR-429 نسبت به گروه کنترل، کاهش معنی دار در بیان ژن E2F3 پس از ترانسفکشن مشاهده شد (۵/۳ برابر) (نمودار شماره ۲).



ج



د


تصویر شماره ۱: الف: تصویر فلورسنت سلول MCF-7 ترانسفکت شده با وکتور anti-miR-429، ب: تصویر نوری منطبق بر شان قبلی، ج: تصویر فلورسنت سلول MCF-7 ترانسفکت شده با pre-miR429، د: تصویر نوری منطبق بر شان قبلی

نمودار شماره ۲: تغییرات بیان ژن E2F3 در هر سه گروه سلول MCF-7

داروها در مراحل پیش کلینیکی ارائه داده است. به علاوه، در نواحی غیر کدکننده، علاوه بر mRNA ها توالی های دیگری مثل LnRNA یا توالی طویل غیر کدکننده نیز دیده می شوند. به طور مثال گفته می شود miRNA که برخی از ژن ها در نتیجه های برهمکنش یک LnRNA میتوانند یک ژن را مورد هدف قرار دهند. در مطالعه حاضر که بر روی رده سلولی MCF-7 انجام گرفته است، ابتدا با استفاده از پایگاه های داده miRNA و ابزارهای بیوانفورماتیک ژن E2F3 به عنوان هدف احتمالی این mRNA در نظر گرفته شد و بیان miR-429 و ژن های هدف سه گروه سلول ترانسفکشن شده با miR-429، بازدارنده miR-429 و کتور پیش ساز seed شده اولیه برابر می باشد و تغییر بیان ژن را می توان با قطعیت بیشتری گزارش کرد (نمودار شماره ۳).

در رده سلولی MCF-7 سنجیده اند، اما هدف آن ها یا مقایسه ای پروفایل بیانی miR-429 با سایر mRNA ها و یا مقایسه ای آن با رده های مقاوم به دارو بوده است. همچنین مطالعاتی به صورت موردنی ارتباط ژن E2F3 با miR-429 نشان داده اند. تفاوت این مطالعات با مطالعه های حاضر انتخاب رده سلولی و نوع سرطان می باشد. E2F، نام یک خانواده از فاکتور های رونویسی می باشد که در کنترل چرخه سلولی نقش دارد. این خانواده از فاکتور های رونویسی، دارای ۹ پروتئین E2F1، E2F2، E2F3a، E2F3b، E2F4، E2F5، E2F8، E2F1، E2F2، E2F3a، E2F3b، E2F4، E2F5 می باشد که هر کدام نقش های متفاوتی ایفا می کنند. از میان پروتئین های این خانواده، E2F3 دو ایزو فرم E2F3a و E2F3b دارد. محل قرار گیری این ژن بر روی کروموزوم ۶ می باشد، البته نسخه هایی از ژن های کاذب آن نیز بر روی کروموزوم ۲ و ۷ وجود دارد. اطلاعاتی که در Uniprot KB در اختیار ما قرار می دهد حاکی از آن است که E2F3 با برهمکنش مجموعه ای پروتئینی G1 DRTF1/E2F کنترل چرخه سلولی را از مرحله S در دست می گیرد و در مورد سلول های چربی نیز با جلوگیری از چسبیدن ژن CEBPA به پرموتر ژن های

تغییرات زنده مانی سلول پس از انجام عملیات ترانسفکشن برای مشاهده اثر عملیات ترانسفکشن بر روی سلول و این که استفاده از محلول ترانسفکشن بر روی زنده مانی سلول چه اثری دارد، پس از انجام ترانسفکشن روی سلول در پلت ۹۶ خانه، ۴۸ ساعت پس از ترانسفکشن تست MTT انجام شد. نتایج این تست نشان داد که ترانسفکشن سلول ها با دو و کتور پیش ساز و بازدارنده miR-429 اثر قابل توجهی بر روی زنده مانی ندارد و در واقع استفاده از محلول ترانسفکشن سمیت سلولی را بالا نمی برد. می توان گفت که تغییرات بیان ژن فقط ناشی از عملیات ترانسفکشن می باشد. تعداد سلول های زنده مانده پس از ۴۸ ساعت از گذشت ترانسفکشن با تعداد سلول seed شده اولیه برابر می باشد و تغییر بیان ژن را می توان با قطعیت بیشتری گزارش کرد (نمودار شماره ۳).



Group	% Cell Viability
control	~100
MCF7 transfected with mimic	~102
MCF7 transfected with inhibitor vector	~85

نمودار شماره ۳: تغییرات زنده مانی در هر سه گروه سلول پس از انجام تست MTT

بحث

بیش از ۹۹ درصد از ژنوم انسان مربوط به نواحی غیر کدکننده می باشد. این نواحی که در گذشته به نام junkDNA می شدند کم کم در مطالعات زیست شناسی مولکولی جایگاه خود را پیدا کردند و اهمیت آن در بسیاری از بیماری های متابولیک، ایمنی و بیماری های پیچیده ژنتیکی مثل سرطان آشکار شد. بر جستگی مطالعات این شاخه از زیست شناسی مولکولی در کمتر از سه دهه آن قدر حائز اهمیت بود که کمپانی های مختلفی تصمیم به طراحی داروهای از جنس miRNA گرفتند. کمپانی miRNA Therapeutics لیستی از این

ژن‌های *E2F3* و *BMII* را مورد هدف قرار داده و بیان آن‌ها را تنظیم نمود. *BMII* فاکتور انکوژن در سرطان‌های مختلف انسانی و *E2F3* نیز به عنوان عامل اصلی در تنظیم تکثیر سلولی می‌باشدند. در این مطالعه افزایش بیان miR-429 بعد از ترانسفکت کردن سلول‌ها توسط Pre-miR-429 باعث مهار *BMII* و *E2F3* گردید(۱۵). مطالعات حاکی از آن می‌باشد که بیان ژن *E2F3* در بسیاری از سرطان‌ها از جمله سرطان کبد، سرطان مثانه، سرطان پروستات، و سرطان ریه افزایش پیدا کرده است(۱۶-۱۹). برای پی بردن به ارتباط بین پاسخ به شیمی درمانی در سرطان ریه و کنترل درمان توسط خانواده miR-200، *Feng* و همکاران در سال ۲۰۱۲ هنگام مطالعه بر روی رده‌ی سلولی miR-200b به این نتیجه رسیدند که ترانسفکشن miR-200b سلول‌ها باعث می‌شود که پاسخ این سلول‌های سرطانی به داروی دوستاکسل بهتر شود. با انجام تست لوسیفراز در این مطالعه دیده شد که این miRNA از طریق هدف قرار دادن ژن *E2F3* با جلوگیری از رشد سلولی، افزایش آپوپتوز و توقف چرخه سلولی در فاز G2/M موجب بمبود پاسخ به درمان می‌شود(۷). *Liu* و همکاران در سال ۲۰۱۴، طی مطالعه‌ای بر روی بافت بیماران مبتلا به سرطان مثانه و مقایسه‌ی آن با نمونه‌های افراد سالم، نتیجه گرفتند که تهاجم، مهاجرت و رشد سلول در این بیماران از جمله فاکتورهای مهمی هستند که توسط ژن *E2F3* کنترل می‌شوند. در این مطالعه ضمن اشاره به نقش miR-200c به عنوان عامل سرکوب کننده‌ی تومور در بیماران، نشان داده شد که miR-200c از طریق هدف قرار دادن ژن *E2F3* می‌تواند رفتار سلول سرطانی را جهت دهد(۲۰). مطالعه شکرالله زاده و همکاران، افزایش بیان معنی‌دار *E2F3* را به میزان ۶/۷ برابر با کاهش بیان anti-miR-141 پس از ترانسفکت با *anti-miR-141* نشان داده است(۱۲).

در مطالعه‌ی حاضر میزان بیان *E2F3* در اثر ترانسفکت با pre-miR-429 کاهش و با کاهش بیان

هدفمند مانع از تکثیر این سلول‌ها می‌شوند. این پروتئین با برهمه‌کننده‌هایی که با دومین‌های پروتئین سرکوب کننده توموری رتینوبلاستما دارد، می‌تواند در پیشبرد چرخه سلولی از فاز S به S نقش کلیدی ایفا کند. در حالت عادی پروتئین Rb با کنترلی که از نظر ساختاری بر روی پروتئین *E2F3* دارد، آن را به حالت خاموش نگه می‌دارد. داستیله شدن Rb توسط هیستون داستیلازها یا HDACs با تغییرات ساختاری که بر روی Rb ایجاد می‌کند می‌تواند ابتدا گروهی از کینازهای وابسته به سیکلین و سپس *E2F3* را آزاد کند. از آنجا که کنترل بسیاری از ژن‌هایی که در مسیر فاز S چرخه سلولی هستند در گروه بیان ژن *E2F3* می‌باشد، شروع بیان این ژن باعث افزایش بیان ژن‌های تیمیدیلات سنتاز و دهیدروفولات ردوکتاز می‌شود(۱۴،۱۳). خانواده‌ی miR-200 نقش مهمی در ایجاد تومور و هم ساپرس تومور و همچنین در پیشرفت تومور، متاستاز، تهاجم و پاسخ به درمان ایفا می‌کنند. miRNA-429 به عنوان miRNA از خانواده‌ی miR-200 تقسیم‌بندی می‌شود که نقش مهمی در پیشرفت تومور ایفا کرده و کاهش بیان miR-429 در متاستاز به استخوان سرطان پستان نقش دارد. کاهش بیان آن باعث کاهش متاستاز و تهاجم تومور تخدمان و کارسینومای کولورکتال می‌گردد. این نقش مهمی در EMT در انواع تومورها ایفا می‌کند. این میکروآرنا ژن‌های *BMII* و *E2F3* و مارکرهای EMT از جمله E-Cadherin، Vimentin، p14، Qui M و همکاران هدف قرار می‌دهد. در مطالعه‌ای که Qui M و همکاران در سال ۲۰۱۵ انجام دادند، نشان داده شد که ترانسفکت سلول‌های کارسینومای کلیه توسط miR-429 باعث مهار بیان *E2F3* و *BMII* و در نتیجه کاهش تکثیر و تهاجم سلول‌های توموری گردید. این در حالی است که با کاهش بیان miR-429، بیان *BMII* و *E2F3* افزایش پیدا کرده و در نتیجه منجر به افزایش تکثیر سلول‌های توموری و متاستاز گردید. همین طور نشان داده شد که miR-429 به طور مستقیم ناحیه‌ی ۳'UTR مربوط به

چگونگی هدف قرار دادن این ژن‌ها توسط miR-429 بررسی شود. میزان بیان miR-429 و میزان بیان ژن E2F3 در زیرگروههای مختلف سرطان پستان با وضعیت کلینیکو پاتولوژیک متفاوت بررسی شود و با بررسی بر روی شبکه‌ی PPI از ساخته شده، به وسیله‌ی EnrichR می‌توان ۱۰ دارویی که اثر سیستمیک دارند را به عنوان کاندیدا پیشنهاد کرد. منظور از داروی سیستمیک، دارویی می‌باشد که می‌تواند شبکه‌ی خاصی از پروتئین‌های مورد نظر را مورد هدف قرار داده و در آن اختلال ایجاد کند.

سپاسگزاری

محققین از تمامی کسانی که ما را در انجام این کار تحقیقاتی یاری رساندند، نهایت قدردانی و تشکر را دارند.

miR-429 افزایش می‌یابد. بنابراین miR-429 می‌تواند به عنوان ساپرس کننده‌ی تومور در سرطان پستان از طریق مهار E2F3 عمل کند.

با توجه به نتایج حاصله و محدودیت‌های این مطالعه پیشنهاد می‌شود که بررسی میزان بیان miR-429 در دیگر رده‌های سلولی سرطان پستان، در مدل حیوانی که توالی‌های پیش‌ساز و بازدارنده‌ی miR-429 به آن تزریق شده است، در نمونه‌های بیماران مبتلا به سرطان پستان، مورد بررسی قرار بگیرد. همچنین با استفاده از تست‌های مکمل کاربردی علاوه بر مطالعه‌ی حاضر که در سطح ترانسکریپتم انجام شده است، ارتباط بیان miR-429 با ژن‌ها در سطح پروتئومیک نیز مورد ارزیابی قرار گیرد و با استفاده از تست لوسيفراز و کلون کردن قطعات ژنی E2F3 در پایین دست توالی miR-429

References

- Mousavi S M, Montazeri A, Mohagheghi M A, Jarrahi A M, Harirchi I, Najafi M, et al. Breast cancer in Iran: an epidemiological review. *Breast J* 2007; 13(4): 383-391.
- Akbari A, Razzaghi Z, Homaee F, Khayamzadeh M, Movahedi M, Akbari M E. Parity and breastfeeding are preventive measures against breast cancer in Iranian women. *Breast Cancer* 2011; 18(1): 51-55.
- Haghigat S, Akbari M E, Ghaffari S, Yavari P. Standardized breast cancer mortality rate compared to general female population of Iran. *Asian Pacific Journal Cancer Prevention* 2012; 13(11): 5525-5528.
- Li C I, Uribe D J, Daling J R. Clinical characteristics of different histologic types of breast cancer. *Br J Cancer* 2005; 93(9): 1046-1052.
- Drakaki MJ, Ding L, Shen D, Luo J, et al. MicroRNA Gene Networks in Oncogenesis. *Curr Genomics* 2009; 10(1): 33-41.
- Appasani K. MicroRNAs: From Basic Science to Disease Biology. Cambridge: Cambridge university press. 2008.
- Feng B, Wang R, Song HZ, Chen LB. MicroRNA-200b reverses chemoresistance of docetaxel-resistant human lung adenocarcinoma cells by targeting E2F3. *Cancer* 2012; 118(3): 3365-3376.
- Feng X, Wang Z, Fillmore R, Xi Y. MiR-200, a new star miRNA in human cancer. *Cancer Lett* 2014; 344(2): 166-173.
- Shimono Y, Zabala M, Cho R W, Lobo N, Dalerba P, Qian D, et al. Downregulation of miRNA-200c links breast cancer stem cells with normal stem cells. *Cell* 2009; 138(3): 592-603.
- Huang X, Yao J, Huang H, Wang Ch, et al. MicroRNA-429 Modulates Hepatocellular Carcinoma Prognosis and Tumorigenesis. *Gastroenterology Research and Practice* 2013.

11. Antolin S, Calvo L, Blanco-Calvo M, Santiago M P, Lorenzo-Patino M J, Haz-Conde M, et al. Circulating miR-200c and miR-141 and outcomes in patients with breast cancer. *BMC Cancer* 2015; 15: 297.
12. Shokrollahzade S, Sarhadi S, Safa M, Hosseini A. Differential Expression of EGFR, MAP2K4 and E2F3 Genes as Targets of miR141 and its Association with Immune System Pathway. *J Cell Biol Mol Sci* 2017; 9(1): 6-15.
13. Giangrande PH, Zhu W, Rempel RE, Laakso N, Nevins JR. Combinatorial gene control involving E2F and E Box family members. *EMBO J* 2004; 23(6): 1336-1347.
14. Good L, Dimeri GP, Campisi J, Chen KY. Regulation of dihydrofolate reductase gene expression and E2F components in human diploid fibroblasts during growth and senescence. *J Cell Physiol* 1996; 168(3): 580-588.
15. Qiu M, Liang Z, Chen L, Tan G, Wang K, Liu L, et al. MicroRNA-429 suppresses cell proliferation, epithelial-mesenchymal transition, and metastasis by direct targeting of BMI1 and E2F3 in renal cell carcinoma. *Urol Oncol* 2015; 33(7): 332.e9-18.
16. Xu T, Zhu Y, Xiong Y, Ge YY, Yun JP, Zhuang SM. MicroRNA-195 suppresses tumorigenicity and regulates G1/S transition of human hepatocellular carcinoma cells. *Hepatology* 2009; 50(1): 113-121.
17. Feber A, Clark J, Goodwin G, Dodson AR, Smith PH, Fletcher A, et al. Amplification and overexpression of E2F3 in human bladder cancer. *Oncogene* 2004; 23(8): 1627-1630.
18. Tao T, Liu D, Liu C, Xu B, Chen S, Yin Y, et al. Autoregulatory feedback loop of EZH2/miR-200c/E2F3 as a driving force for prostate cancer development. *Biochim Biophys Acta* 2014; 1839(9): 858-865.
19. Cooper CS, Nicholson AG, Foster C, Dodson A, Edwards S, et al. Nuclear overexpression of the E2F3 transcription factor in human lung cancer. *Lung Cancer* 2006; 54(2): 155-162.
20. Liu L, Qiu M, Tan G, Liang Z, Qin Y, Chen L, et al. miR-200c inhibits invasion, migration and proliferation of bladder cancer cells through down-regulation of BMI-1 and E2F3. *J Transl Med* 2014; 12: 305.