

Investigating the Relationship between CBC Indices and Anthropometric Indices in the Tabari Cohort Population

Reza Alizadeh-Navaei¹
 Mahmood Moosazadeh¹
 Shamim Kordinezhad²
 Ehsan Zabolli¹
 Versa Omrani-Nava³
 Akbar Hedayatizadeh-Omran¹

¹ Associate Professor, Gastrointestinal Cancer Research Center, Non-communicable Diseases Institute, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

² Medical Student, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

³ MSc in Immunology, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

(Received February 7, 2023; Accepted April 3, 2024)

Abstract

Background and purpose: Being Overweight is a global health problem and is related to important underlying diseases such as cardiovascular disease, malignancy, diabetes, fatty liver, etc. Over the past three decades, obesity has increased globally, especially in low-and middle-income countries. Numerous studies have shown that obesity increases the risk of developing chronic and threatening diseases including diabetes, cardiovascular diseases, blood pressure, and reduces life expectancy. On the other hand, chronic inflammation around fat cells plays an important role in obesity-related diseases. Also, changes in blood parameters are associated with increased body mass and chronic inflammation in obesity, and peripheral blood cells, such as the number of platelets, neutrophils, lymphocytes, and monocytes, are related to the progression of various types of diseases and inflammatory conditions. Therefore, the purpose of this study is to find the relationship between blood count biomarkers and anthropometric indicators in the adult group according to the Tabari cohort data.

Materials and methods In the present study, cross-sectional data from a population-based cohort study called "Tabari Cohort Study" collected from 2014 to 2016 were used. This study is part of a nationwide study called "Epidemiological Prospective Study Group in Iran (Persian Cohort)". In the first phase of the Tabari cohort study, 10,255 participants aged between 35-70 years from urban and rural areas of Sari city were registered. Exclusion criteria in this study were inflammatory diseases, autoimmunity, malignancy, cardiovascular diseases, transplantation, and receiving any type of immunosuppressive drug, and finally 9939 people including 4043 men and 5896 women were included in the study. Age, height, weight, anthropometric measurements (BMI, waist circumference), CBC parameters including leukocytes, platelets, neutrophils, lymphocytes, and monocytes), and platelet distribution width (PDW) were recorded from the participants. By using the histogram drawing method to check whether the variables follow the normal distribution to decide between parametric or non-parametric analysis, T-test and ANOVA statistical tests, and SPSS 21 software, the results were extracted. The significance level in this study was considered to be 0.05 or less.

Results: Waist-to-hip ratio was associated with higher WBC ($P<0.001$), platelet ($P<0.001$), and lymphocyte percentage ($P<0.001$). Higher waist-to-hip ratio was associated with higher WBC ($P<0.001$), platelet ($P<0.001$), lymphocyte percentage ($P<0.001$), and monocyte percentage ($P<0.001$). Higher BMI values were associated with higher WBC ($P<0.001$), platelet ($P<0.001$), lymphocyte ($P<0.001$) and monocyte ($P<0.001$) percentages. WBC, platelet, lymphocyte, and monocyte percentage were significantly higher in people who had a higher ratio of waist circumference to height ($P<0.001$).

Conclusion: The results showed that the relationship between anthropometric indicators and blood findings in favor of inflammatory conditions and obesity can affect indicators related to whole blood count.

Keywords: Obesity, anthropometric indicators, blood cell count, inflammation, leukocyte

J Mazandaran Univ Med Sci 2024; 34 (232): 136-143 (Persian).

Corresponding Author: Akbar Hedayatizadeh-Omran - Gastrointestinal Cancer Research Center, Non-communicable Diseases Institute, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran. (E-mail: akbar_hedayati@yahoo.com)

بررسی ارتباط بین شاخص های CBC با شاخص های آنتروپومتریک در جمعیت کوهورت طبری

رضا علیزاده نوایی^۱

محمود موسی زاده^۱

شمیم کردی نژاد^۲

احسان زابلی^۱

ورسا عمرانی نوا^۳

اکبر هدایتی زاده عمران^۱

چکیده

سابقه و هدف: اضافه وزن یک مشکل جهانی سلامتی و مرتبط با بیماری های زمینه ای مهم از جمله بیماری قلبی - عروقی، بدخیمی، دیابت کبد چرب و... است. در سه دهه گذشته، چاقی در سطح جهان به ویژه در کشورهای با درآمد کم و متوسط، افزایش یافته است. مطالعات متعدد نشان داده اند که چاقی خطر ابتلا به بیماری های مزمن و تهدید کننده از جمله دیابت، بیماری های قلبی عروقی، فشار خون را افزایش و امید به زندگی را کاهش می دهد. از طرفی التهاب مزمن در اطراف سلول های چربی نقش مهمی در بیماری های مرتبط با چاقی ایفا می کند. هم چنین تغییرات در پارامترهای خونی با افزایش توده بدن و التهاب مزمن در چاقی همراه بوده و سلول های خون محیطی، مانند تعداد پلاکت ها، نوتروفیل ها، لنفوسیت ها و مونوسیت ها، با پیشرفت انواع مختلف بیماری ها و شرایط التهابی مرتبط هستند. بنابراین این مطالعه با هدف، یافتن ارتباط نشانگرهای زیستی شمارش خون با شاخص های آنتروپومتریک در گروه بزرگسالان بر طبق داده های کوهورت طبری، انجام پذیرفت.

مواد و روش ها: در مطالعه حاضر، از داده های مقطعی مطالعه هم گروهی مبتنی بر جمعیت به نام "مطالعه کوهورت طبری" که از سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۳۹۶ جمع آوری گردیده، استفاده شد. این مطالعه بخشی از یک مطالعه سراسری به نام "گروه مطالعات آینده پژوهی همه گیری شناسی در ایران (پرشین کوهورت)" می باشد. در فاز اول مطالعه کوهورت طبری، تعداد ۱۰۲۵۵ نفر شرکت کننده در سنین بین ۳۵-۷۰ سال از مناطق شهری و روستایی شهرستان ساری ثبت شده اند. معیارهای خروج در این تحقیق ابتلا به بیماری های التهابی، خود ایمنی، بدخیمی، بیماری های قلبی عروقی، پیوند و دریافت هر نوع داروی سرکوب گر ایمنی بوده و در نهایت تعداد ۹۹۳۹ فرد مشتمل ۴۰۴۳ مرد و ۵۸۹۶ زن وارد مطالعه شدند. شاخص های سن، قد، وزن، اندازهای آنتروپومتریک (BMI دور کمر و...) و پارامترهای CBC شامل لکوسیت ها، پلاکت ها، نوتروفیل ها، لنفوسیت ها و مونوسیت ها، عرض توزیع پلاکت (PDW) از شرکت کنندگان ثبت گردید. با استفاده از روش رسم نمودار هیستوگرام برای بررسی این که آیا متغیرها از توزیع نرمال پیروی می کنند تا بین تحلیل پارامتریک یا غیرپارامتریک تصمیم گیری شود، و آزمون های آماری T-test و ANOVA و نرم افزار SPSS 21 نتایج حاصل استخراج شد. سطح معنی داری در این مطالعه ۰/۰۵ و کم تر از آن در نظر گرفته شد.

یافته ها: دور کمر بالاتر با WBC ($P < 0/001$)، پلاکت ($P < 0/001$)، درصد لنفوسیت ($P < 0/001$) بالاتر همراه بود. نسبت دور کمر به لگن بالاتر با WBC ($p < 0/001$)، پلاکت ($P < 0/001$)، درصد لنفوسیت ($P < 0/001$)، درصد مونوسیت ($P < 0/001$) بیش تر همراه بود. مقادیر بالاتر BMI با WBC ($P = 0/000$)، پلاکت ($P < 0/001$)، درصد لنفوسیت ($P < 0/001$) و مونوسیت ($P < 0/001$) بالاتر همراه بودند. WBC، پلاکت، درصد لنفوسیت و مونوسیت بالاتر به طور معنی داری در افرادی که نسبت بیش تر دور کمر به قد داشتند، مشاهده شد ($P < 0/001$).

استنتاج: نتایج نشان دهنده ارتباط بین شاخص های آنتروپومتریک و یافته های خونی به نفع شرایط التهابی بوده و چاقی می تواند شاخص های مرتبط با شمارش کامل خون را تحت تاثیر قرار دهد.

واژه های کلیدی: چاقی، شاخص های آنتروپومتریک، شمارش سلول های خونی، التهابی، لکوسیت

E-mail: akbar_hedayati@yahoo.com

مؤلف مسئول: اکبر هدایتی زاده عمران - ساری: دانشگاه علوم پزشکی مازندران، مرکز تحقیقات سرطان گوارش

۱. دانشیار، مرکز تحقیقات سرطان گوارش، پژوهشکده بیماری های غیرواگیر، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

۲. دانشجوی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

۳. کارشناس ارشد ایمونولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

تاریخ دریافت: ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ تاریخ ارجاع جهت اصلاحات: ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ تاریخ تصویب: ۱۴۰۳/۱/۱۵

مقدمه

مطابق تخمین فدراسیون جهانی چاقی، در سال ۲۰۲۰ تعداد ۸۰۰ میلیون نفر با چاقی در جهان زندگی می‌کردند که از این تعداد ۳۹ میلیون کودک زیر ۵ سال و ۳۴۰ میلیون نفر کودکان و نوجوانان بین ۵ تا ۱۹ سال بودند. علاوه بر این، حداقل یک میلیارد نفر دیگر در معرض خطر اضافه وزن یا چاقی قرار دارند (۱). در سه دهه گذشته، چاقی در سطح جهان به‌ویژه در کشورهای با درآمد کم و متوسط افزایش یافته است (۲). پیشنهاد شده است که افزایش شیوع چاقی را می‌توان به تغییرات سبک زندگی، به‌ویژه عادات غذایی و فعالیت بدنی ناکافی در محیط‌های روستایی و شهری نسبت داد. مطالعات متعدد نشان داده‌اند که چاقی خطر ابتلا به بیماری‌های مزمن و تهدید کننده از جمله دیابت نوع ۲، بیماری‌های قلبی عروقی، فشارخون بالا، چربی خون بالا و آپنه خواب را افزایش داده و امید به زندگی را تا حدود ۷ سال کاهش می‌دهد (۳). اندازه‌گیری چاقی در این بررسی‌ها با شاخص توده بدنی (BMI، وزن بر حسب کیلوگرم/مجدور قد) انجام می‌شود که با میزان چربی بدن همبستگی دارد. اندازه‌گیری BMI از مزیت سادگی در محاسبات در مطالعات اپیدمیولوژیک برخوردار است، اما در عین حال کمبودهایی هم دارد، زیرا بین چربی و توده بدون چربی بدن تمایز قائل نمی‌شود. بنابراین، BMI باید به عنوان یک اندازه‌گیری غربالگری در نظر گرفته شود، تا یک روش تشخیصی مدنظر باشد. اندازه‌گیری‌های تکمیلی برای رفع نقایص BMI، باید شامل دور کمر و یا نسبت دور کمر به قد باشد. هر دو این متغیرها، پیش‌بینی‌کننده قوی خطر سلامت هستند (۴). پیشنهاد شده شاخص‌های آنتروپومتریک مانند دور کمر (WC) و نسبت دور کمر به قد (WHtR) که چاقی مرکزی را ارزیابی می‌کنند، بیش از BMI با اختلالات قلبی-متابولیک مرتبط هستند (۵). CBC یک آزمایش هماتولوژیک معمول برای ارزیابی تصویر کامل خون از جمله سلول‌های تشکیل‌دهنده آن، گلبول‌های قرمز، لکوسیت‌ها و

پلاکت‌ها برای بررسی بیماری‌ها و شرایط خاص است. این تست رایج‌ترین آزمایش خون است که در آن علاوه بر شمارش سلول‌های اصلی، تعداد و درصد زیر گروه‌های لکوسیتی مانند نوتروفیل‌ها، مونوسیت‌ها، ائوزینوفیل‌ها و بازوفیل‌ها نیز گزارش می‌شود. علاوه بر این، پارامترهایی مانند هموگلوبین، هماتوکریت و شاخص‌های مربوط به این سه نوع سلول خونی اصلی نیز در این آزمایش به دست می‌آید. میانگین حجم گلبولی، میانگین غلظت هموگلوبین گلبول‌های قرمز، عرض توزیع گلبول‌های قرمز، میانگین حجم پلاکتی، عرض توزیع پلاکتی و پلاکت کریت برخی از این شاخص‌ها هستند (۶،۳). یافته‌ها نشان می‌دهد که تغییرات در پارامترهای خونی با افزایش توده بدن و التهاب مزمن در چاقی همراه است. التهاب مزمن اطراف سلول‌های چربی نقش مهمی در بیماری‌های مرتبط با چاقی ایفا می‌کند. از آنجایی که تعداد WBC در التهاب افزایش می‌یابد، این احتمال وجود دارد که تعداد WBC در بیماران مبتلا به چاقی افزایش یابد. بافت چربی، IL-6 تولید می‌کند، یک سایتوکاین پیش‌التهابی که در گرانولوپوزیس مغز استخوان و تکثیر و تمایز WBC نقش دارد (۷).

مطالعه‌ای بر روی دختران نوجوان چاق نشان داد که بین نوتروفیل‌ها و تعداد کل گلبول‌های سفید خون با BMI ارتباط مثبت وجود دارد (۸). با توجه به تغییر رویکرد زندگی و شیوع چاقی در جامعه و از آنجایی که چاقی در استان مازندران از شیوع بالایی برخوردار بوده است و نظر به این که مطالعات محدودی در این زمینه وجود دارد، لذا هدف این مطالعه، بررسی سنجش ارتباط بین شاخص‌های شمارش کامل و شاخص‌های آنتروپومتریک در جمعیت مطالعه هم‌گروهی طبری بوده است که می‌تواند برای تسهیل در غربالگری و برنامه‌ریزی‌های بهداشتی کاربرد داشته باشد.

مواد و روش‌ها

در مطالعه حاضر، از داده‌های مقطعی مطالعه

هم گروهی مبتنی بر جمعیت به نام "مطالعه کوهورت طبری" که از سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۳۹۶ جمع آوری گردیده، استفاده شد. این مطالعه بخشی از یک مطالعه بزرگ به نام "کوهورت پرشین" بوده است که پس از تصویب با کد اخلاق IR.MAZUMS.IMAMHOSPITAL.REC.1401.14288 انجام شده است. در فاز اول مطالعه کوهورت تعداد ۱۰۲۵۵ نفر شرکت کننده در سنین بین ۳۵-۷۰ سال از مناطق شهری و روستایی شهرستان ساری، مازندران، ایران ثبت شده اند. معیارهای خروج در این تحقیق ابتدا به بیماری های التهابی، خود ایمنی، بدخیمی، بیماری های قلبی عروقی، پیوند و دریافت هر نوع داروی سرکوب گر ایمنی بودند که در نهایت تعداد ۹۹۳۹ فرد مشتمل ۴۰۴۳ مرد ۵۸۹۶ زن وارد مطالعه شدند و شاخص های سن، قد، وزن، گلوکز خون ناشتا، اندازه های آنترپومتریک (BMI)، دور کمر (WC)، نسبت دور کمر به قد (WHtR) و... و پارامترهای CBC (لکوسیت ها، پلاکت ها، نوتروفیل ها، لنفوسیت ها و مونوسیت ها) و عرض توزیع پلاکت (PDW) از شرکت کنندگان ثبت شده است.

مقیاس های تن سنجی

تمامی اندازه گیری ها توسط افراد آموزش دیده و روش های استاندارد صورت گرفت. وزن با استفاده از ترازوی SECA 755 اندازه گیری شد (هامبورگ، آلمان). برای اندازه گیری قد، از قدسنج SECA 226 (هامبورگ، آلمان) استفاده شد. بیماران براساس BMI (وزن تقسیم بر توان دوم قد) به گروه های، BMI کم تر از 25kg/m^2 نرمال، BMI بین 25kg/m^2 - $29/9$ ، اضافه وزن و BMI بیش تر از 30kg/m^2 ، چاق در نظر گرفته شد، تقسیم شدند. دور کمر (WC) بیش تر از ۸۸ سانتی متر برای زنان و بیش تر از ۱۰۲ سانتی متر برای مردان به عنوان چاقی شکمی تعریف شد. نسبت دور کمر به لگن کم تر از ۰/۸۵ برای زنان و کم تر از ۰/۹ برای مردان به عنوان نسبت نرمال تعریف شد. نسبت دور کمر به قد (WHtR)

که با تقسیم دور کمر (WC) بر قد محاسبه می شود، برای شرکت کنندگان زن و مرد $WHtR \geq 0/50$ ، چاقی شکمی تعریف شد (۵).

نسبت های محاسباتی خونی

شمارش کامل خون (CBC)، شاخص های خون شناسی برای همه نمونه ها با استفاده از (Celltac Alpha MEK-6510 K توکیو، ژاپن) اندازه گیری شده است. لنفوسیت، مونوسیت، نوتروفیل و پلاکت به صورت درصد گزارش شدند.

تجزیه و تحلیل آماری

نتایج برای همه متغیرها به صورت میانگین $\pm$ انحراف استاندارد (SD) یا در صورت لزوم به صورت درصد، بیان شد. از روش رسم نمودار هیستوگرام برای بررسی این که آیا متغیرها از توزیع نرمال پیروی می کنند تا بین تحلیل پارامتری یا ناپارامتریک تصمیم گیری شود، استفاده شد. آزمون های آماری مورد استفاده T-test و ANOVA بوده و با استفاده از نرم افزار SPSS 21 انجام شد. سطح معنی داری در این مطالعه ۰/۰۵ در نظر گرفته شد.

یافته ها

در جدول شماره ۱، یافته های CBC به صورت میانگین و انحراف معیار نمایش داده شده است. همان طور که در جدول شماره ۲ گزارش شده است، دور کمر بالاتر با WBC، پلاکت و درصد لنفوسیت بالاتر و با هموگلوبین، MCV، گرانولوسیت و PDW کم تر همراه بود. MPV و درصد مونوسیت اختلاف معنی داری بین گروه ها نشان ندادند. در جدول شماره ۳ یافته های CBC براساس نسبت دور کمر به لگن نشان داده شده است. دور کمر به لگن بیش تر با WBC، PLT، درصد لنفوسیت و درصد مونوسیت بیش تر همراه بود. هموگلوبین، MCV و MPV اختلاف آماری معنی داری براساس یافته دور کمر به لگن نشان ندادند.

جدول شماره ۱: میانگین و انحراف معیار شاخص های CBC

متغیر CBC	میانگین	Std. Deviation	تعداد
WBC	۶/۴۷	۱/۵۷	۹۹۳۹
HGB	۱۳/۸۲	۱/۵۹	۹۹۳۹
MCV	۸۵/۰۸	۷/۸۳	۹۹۳۹
PLT	۲۵۵/۵۰	۵۷/۵۲	۹۹۳۹
LY	۳۷/۹۶	۸/۱۸	۹۹۳۹
MO	۳/۶۱	۱/۱۸	۹۹۳۹
GR	۵۸/۳	۹/۱۱	۹۹۳۹
MPV	۷/۹۵	۰/۵۲	۹۹۳۹
PDW	۱۶/۹۵	۰/۷۸	۹۹۳۹

جدول شماره ۲: شمارش سلول های خونی بر اساس دور کمر

متغیر CBC بر اساس طبقه بندی دور کمر	تعداد	انحراف معیار ± میانگین	سطح معنی داری *
WBC	۵۰۷۷	۶/۳۱±۱/۵۳	۰/۰۰۰
	۴۸۶۲	۶/۶۵±۱/۵۹	>= ۱۰۲ for male and >= ۸۸ for female
HGB	۵۰۷۷	۱۴/۱۷±۱/۶۱	۰/۰۰۰
	۴۸۶۲	۱۳/۴۴±۱/۴۸	>= ۱۰۲ for male and >= ۸۸ for male
MCV	۵۰۷۷	۸۵/۴۶±۸/۰۳	۰/۰۰۰
	۴۸۶۲	۸۴/۶۹±۷/۶۰	>= ۱۰۲ for male and >= ۸۸ for male
PLT	۵۰۷۷	۲۴۲/۹۵±۵۵/۱	۰/۰۰۰
	۴۸۶۲	۲۶۷/۵۷±۵۷/۵۲	>= ۱۰۲ for male and >= ۸۸ for male
LY	۵۰۷۷	۳۷/۴۳±۸/۱۲	۰/۰۰۰
	۴۸۶۲	۳۸/۵۲±۸/۲۱	>= ۱۰۲ for male and >= ۸۸ for male
MO	۵۰۷۷	۳/۶±۱/۱۸	۰/۳۵۲
	۴۸۶۲	۳/۶۱±۱/۱۹	>= ۱۰۲ for male and >= ۸۸ for male
GR	۵۰۷۷	۵۸/۸۹±۹/۰۵	۰/۰۰۰
	۴۸۶۲	۵۷/۶۷±۹/۱۳	>= ۱۰۲ for male and >= ۸۸ for male
MPV	۵۰۷۷	۷/۹۵±۰/۵۳	۰/۶۹۶
	۴۸۶۲	۷/۹۵±۰/۵۲	>= ۱۰۲ for male and >= ۸۸ for male
PDW	۵۰۷۷	۱۶/۰۱±۰/۷۹	۰/۰۰۰
	۴۸۶۲	۱۶/۸۹±۰/۷۷	>= ۱۰۲ for male and >= ۸۸ for male

*: T-test

جدول شماره ۴: ارزیابی شاخص های شمارش

سلول های خونی با یافته های BMI را نشان می دهد. این یافته ها نشان می دهد که مقادیر بالاتر BMI با WBC، پلاکت، درصد لنفوسیت و مونوسیت بالاتر همراه بودند. مقادیر بالاتر BMI با هموگلوبین، MCV، MPV، PDW و درصد گرانولوسیت پایین تر همراه بود. در جدول شماره ۵، یافته های CBC بر اساس نسبت دور کمر به قد نشان داده شده است. براساس این نتایج، WBC، پلاکت، درصد لنفوسیت و مونوسیت بالاتر به طور معنی داری در نسبت بیش تر دور کمر به قد مشاهده شد. هموگلوبین، MCV، درصد مونوسیت، MPV پایین تر به طور معنی داری در نسبت بیش تر دور کمر به قد مشاهده شد. یافته PDW نیز اختلاف معنی داری نشان نداد.

جدول شماره ۳: شمارش سلول های خونی بر اساس نسبت دور کمر به لگن

متغیر CBC بر اساس طبقه بندی نسبت دور کمر به لگن	تعداد	انحراف معیار ± میانگین	سطح معنی داری *
WBC	۳۱۵۴	۶/۲۶±۱/۵۴	۰/۰۰۰
	۶۷۸۵	۶/۵۲±۱/۵۸	> ۰/۹ for male and > ۰/۸۵ for female
HGB	۳۱۵۴	۱۳/۸۳±۱/۶۴	۰/۵۳۹
	۶۷۸۵	۱۳/۸۱±۱/۵۷	> ۰/۹ for male and > ۰/۸۵ for female
MCV	۳۱۵۴	۸۵/۰۴±۸/۱۹	۰/۷۳۵
	۶۷۸۵	۸۵/۱±۷/۶۶	> ۰/۹ for male and > ۰/۸۵ for female
PLT	۳۱۵۴	۲۴۹/۶۸±۵۷/۵۵	۰/۰۰۰
	۶۷۸۵	۲۵۸/۲۱±۵۷/۳۰	> ۰/۹ for male and > ۰/۸۵ for female
LY	۳۱۵۴	۳۷/۲۸±۷/۸۷	۰/۰۰۰
	۶۷۸۵	۳۸/۲۸±۸/۳۰	> ۰/۹ for male and > ۰/۸۵ for female
MO	۳۱۵۴	۳/۵۳±۱/۱۶	۰/۰۰۰
	۶۷۸۵	۳/۶۴±۱/۱۹	> ۰/۹ for male and > ۰/۸۵ for female
GR	۳۱۵۴	۵۹/۱۴±۸/۷۲	۰/۰۰۰
	۶۷۸۵	۵۷/۹±۹/۲۶	> ۰/۹ for male and > ۰/۸۵ for female
MPV	۳۱۵۴	۷/۹۶±۰/۵۴	۰/۰۸۰
	۶۷۸۵	۷/۹۴±۰/۵۲	> ۰/۹ for male and > ۰/۸۵ for female
PDW	۳۱۵۴	۱۶/۹۷±۰/۷۹	۰/۰۳۶
	۶۷۸۵	۱۶/۹۴±۰/۷۸	> ۰/۹ for male and > ۰/۸۵ for female

*: T-test

جدول شماره ۴: شمارش سلول های خونی بر اساس یافته های BMI

متغیر CBC بر اساس طبقه بندی BMI	تعداد	انحراف معیار ± میانگین	سطح معنی داری *
WBC	۳۱۷۹	۶/۲۳±۱/۵۸	۰/۰۰۰
	۴۲۲۱	۶/۳۸±۱/۵۱	۲۵ - ۲۹/۹
	۳۳۳۹	۶/۸۷±۱/۵۹	= > ۳۰
HGB	۳۱۷۹	۱۴/۰۴±۱/۶۴	۰/۰۰۰
	۴۲۲۱	۱۳/۸۸±۱/۵۸	۲۵ - ۲۹/۹
	۳۳۳۹	۱۳/۵۲±۱/۵۴	= > ۳۰
MCV	۳۱۷۹	۸۶/۰۳±۸/۲۵	۰/۰۰۰
	۴۲۲۱	۸۵/۰۱±۷/۸۴	۲۵ - ۲۹/۹
	۳۳۳۹	۸۴/۴۸±۷/۴۴	= > ۳۰
PLT	۳۱۷۹	۲۴۷/۲۷±۵۶/۹۵	۰/۰۰۰
	۴۲۲۱	۲۵۲/۳۱±۵۵/۹۳	۲۵ - ۲۹/۹
	۳۳۳۹	۲۶۵/۴±۵۸/۵۲	= > ۳۰
LY	۳۱۷۹	۳۷/۰۹±۸/۵۴	۰/۰۰۰
	۴۲۲۱	۳۸/۱۵±۸/۱۳	۲۵ - ۲۹/۹
	۳۳۳۹	۳۸/۳۵±۷/۹۵	= > ۳۰
MO	۳۱۷۹	۳/۵۴±۱/۱۷	۰/۰۰۵
	۴۲۲۱	۳/۶۲±۱/۱۹	۲۵ - ۲۹/۹
	۳۳۳۹	۳/۶۴±۱/۱۸	= > ۳۰
GR	۳۱۷۹	۵۹/۳۱±۹/۴۱	۰/۰۰۰
	۴۲۲۱	۵۸/۰۸±۹/۱۵	۲۵ - ۲۹/۹
	۳۳۳۹	۵۷/۸۵±۸/۷۷	= > ۳۰
MPV	۳۱۷۹	۷/۹۷±۰/۵۵	۰/۰۱۰
	۴۲۲۱	۷/۹۵±۰/۵۲	۲۵ - ۲۹/۹
	۳۳۳۹	۷/۹۳±۰/۵۲	= > ۳۰
PDW	۳۱۷۹	۱۶/۹۴±۰/۷۹	۰/۰۰۳
	۴۲۲۱	۱۶/۹۸±۰/۷۸	۲۵ - ۲۹/۹
	۳۳۳۹	۱۶/۹۲±۰/۷۷	= > ۳۰

*: ANOVA

جدول شماره ۵: شمارش سلول‌های خونی براساس نسبت دور

کمر به قد

متغیر CBC بر اساس طبقه بندی نسبت دور کمر به قد	تعداد	انحراف معیار $\pm$ میانگین	سطح معنی داری *
WBC	1345	6/14 $\pm$ 1/62	< 0/000
	8594	6/53 $\pm$ 1/56	>= 0/50
HGB	1345	14/07 $\pm$ 1/661	< 0/000
	8594	13/78 $\pm$ 1/58	>= 0/50
MCV	1345	86/06 $\pm$ 8/32	< 0/000
	8594	86/93 $\pm$ 7/74	>= 0/50
PLT	1345	222/29 $\pm$ 59/17	< 0/000
	8594	257/41 $\pm$ 57/02	>= 0/50
LY	1345	36/57 $\pm$ 8/36	< 0/000
	8594	38/18 $\pm$ 8/13	>= 0/50
MO	1345	3/68 $\pm$ 1/17	< 0/000
	8594	3/63 $\pm$ 1/18	>= 0/50
GR	1345	59/89 $\pm$ 9/19	< 0/000
	8594	58/05 $\pm$ 9/07	>= 0/50
MPV	1345	8/00 $\pm$ 0/56	< 0/000
	8594	7/94 $\pm$ 0/52	>= 0/50
PDW	1345	16/96 $\pm$ 0/18	< 0/000
	8594	16/95 $\pm$ 0/18	>= 0/50

*: T-test

بحث

در مطالعه حاضر ارتباط میان شاخص‌های آتروپومتریکی و برخی شاخص‌های مربوط به شمارش کامل سلول‌های خونی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان‌دهنده ارتباط بین این شاخص‌ها و یافته‌های خونی به نفع شرایط التهابی است. تمام مقادیر داده‌های شمارش خونی برحسب گروه‌های BMI اختلاف معنی داری داشته است. بروز چاقی اخیراً افزایش یافته و تقریباً به یک اپیدمی تبدیل شده است. این شاخص یک عامل خطر برای بیماری‌های قلبی عروقی از جمله آنژین صدری، فشار خون بالا، نارسایی احتقانی قلب، انفارکتوس میوکارد و فیبریلاسیون دهلیزی است. هیپرتروفی و هیپرپلازی بافت چربی باعث هیپوکسی در سلول‌های چربی می‌شود و سطح استرس را در سلول‌ها افزایش می‌دهد. در نتیجه، فاکتورهای پیش‌التهابی موضعی آزاد و منجر به التهاب می‌شوند. التهاب باعث تسریع پیشرفت آترواسکلروز می‌شود و همچنین ممکن است باعث پارگی پلاک آترواسکلروتیک و ترومبوز شود (۹). التهاب ناشی از چاقی منجر به مقاومت به انسولین و دیابت نوع ۲ می‌شود که به ایجاد سندرم متابولیک کمک می‌کند.

سطح نشانگرهای التهابی، از جمله پروتئین واکنش گر C، فریتین و سیتوکین‌ها، در چاقی افزایش می‌یابد. تعداد کل گلبول‌های سفید که یک نشانگر التهابی است، در چاقی و سندرم متابولیک افزایش می‌یابد.

علاوه بر این، افزایش تعداد پلاکت‌ها و فعال شدن آن به عنوان بخشی از التهاب مزمن در چاقی رخ می‌دهد. همچنین، چاقی یک عامل خطر برای فشارخون بالا است که با افزایش پارامترهای گلبول قرمز (RBC) مانند هموگلوبین و هماتوکریت مرتبط است. این یافته‌ها نشان می‌دهد که تغییرات در پارامترهای خونی با افزایش توده بدن و التهاب مزمن در چاقی همراه است (۷). در بررسی حاضر شمارش پلاکت با تمام شاخص‌های آتروپومتریکی بالا، ارتباط معنی داری داشته است. میزان MPV و تعداد پلاکت‌ها نشانگر پتانسیل ترومبوتیک و عوامل خطر برای عوارض ریز عروقی در دیابت هستند (۱۰). در این راستا با توجه به مطالعه Chen و همکاران، مقاومت به انسولین افزایش یافته و وضعیت گلیسمی باعث افزایش تعداد پلاکت‌ها در قند خون می‌شود (۱۱).

Taniguchi و همکاران، نشان دادند که افزایش تعداد پلاکت‌ها ممکن است به طور مستقل مقاومت به انسولین را در بین بیماران DM نوع ۲ ژاپنی غیر چاق پیش‌بینی کند (۱۲).

مطالعه Kodiatte و همکاران نشان داد که پلاکت‌هایی با حجم بیش تر حاوی گرانول‌های متراکم تر، ترشح بیش تر سروتونین و β -thromboglobulin و دارای پتانسیل تولید ترومبوکسان A2 بیش تری هستند که منجر به افزایش پتانسیل ترومبوتیک در مقایسه با پلاکت‌های کوچک تر و کم تر فعال می‌شود و در نتیجه واکنشی تر هستند. در این مطالعه گزارش داده شده که MPV در ۱۲۸ کودک چاق در مقایسه با کودکان با وزن طبیعی به طور قابل توجهی بیش تر بود (۱۳). مطالعه حاضر نشان داد تعداد WBC بیش تر با اندازه‌های بدنی بزرگ تر همراه می‌باشد. در مطالعه‌ای که توسط Dixon

وجود دارد و علاوه بر آن، تعداد کل لکوسیت‌های محیطی نیز با دیس لیپیدی مرتبط است (۱۷). در مطالعه Zhang S-S و همکاران نیز تعداد مطلق مونوسیت‌ها در افراد دارای اختلال متابولیک در مقایسه با افراد سالم بیش‌تر بوده که در این راستا یافته‌های مطالعه حاضر نیز تعداد بیش‌تر مونوسیت‌ها در مقادیر بالاتر BMI، و نسبت دور کمر به لگن و قد بالاتر را نشان داد (۱۸). یادآور می‌شود حجم بالای نمونه‌ها در مطالعه حاضر و معنی‌دار بودن ارتباط متغیرها علی‌رغم وجود اختلاف ناچیز از نظر بالینی می‌تواند توجیه‌کننده این اختلاف ناچیز باشد. در نهایت این احتمال وجود دارد که چاقی می‌تواند از طریق التهاب مزمن شاخص‌های مرتبط با شمارش کامل خون را تحت تاثیر قرار دهد.

سپاسگزاری

مقاله حاضر حاصل پایان‌نامه دانشجوی پزشکی خانم شمیم کردی‌نژاد در دانشگاه علوم پزشکی مازندران بوده و نویسندگان از تمامی افرادی که در این فرایند دخیل بوده‌اند، به‌ویژه حمایت‌های معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مازندران تشکر و قدردانی می‌نمایند.

References

1. Masood B, Moorthy M. Causes of obesity: a review. Clin Med (Lond) 2023; 23(4): 284-291.
2. Endalifer ML, Diress G. Epidemiology, Predisposing Factors, Biomarkers, and Prevention Mechanism of Obesity: A Systematic Review. J Obesity 2020; 2020: 6134362.
3. Abiri B, Ahmadi AR, Amini S, Akbari M, Hosseinpanah F, Madinehzad SA, et al. Prevalence of overweight and obesity among Iranian population: a systematic review and meta-analysis. J Health Popul Nutr 2023; 42(1): 70.
4. Bray GA, Frühbeck G, Ryan DH, Wilding JP. Management of obesity. Lancet 2016; 387: 1947-1956.
5. Alirezaei T, Soori H, Irilouzadian R, Najafimehr H. Novel Anthropometric Indices as Screening Tools for Obesity: A Study on Healthy Iranians. J Nutr Metab 2023; 2023: 6612411.
6. George-Gay B, Parker K. Understanding the complete blood count with differential. J PeriAnesth Nurs 2003; 18(2): 96-114.
7. Jeong HR, Lee HS, Shim YS, Hwang JS. Positive Associations between Body Mass

و همکاران روی تقریباً ۱۵۰۰۰ زن سالم انجام شد، مشخص شد که چاقی با افزایش تعداد کل WBC مرتبط بوده که با مطالعه حاضر در یک راستا می‌باشد (۱۴). ارتباط بین تعداد گلبول‌های سفید و بیماری‌های قلبی عروقی برای اولین بار بیش از ربع قرن پیش مورد توجه قرار گرفت. اکنون دریافت شده است که التهاب نقش مرکزی در تصلب شرایین و سندرم‌های حاد کرونری دارد. چندین مطالعه اپیدمیولوژیک به‌طور مداوم ارتباط معنی‌داری بین تعداد گلبول‌های سفید خون و بروز بیماری عروق کرونر قلب و سکته را نشان داده‌اند. عفونت و التهاب ممکن است به لایه اندوتلیال عروق کمک کرده و باعث تسریع پیشرفت آترواسکلروز شود. التهاب هم‌چنین ممکن است باعث پارگی پلاک آترواسکلروتیک و ترومبوز شود. براساس مطالعه جمشیدی و همکاران، تعداد WBC با چندین عامل خطر بیماری قلبی عروقی از جمله، کلسترول سرم، تری‌گلیسیرید و مصرف تنباکو مرتبط است (۱۵). در این راستا در مطالعه Abdelmageed Elmugabil، زنان چاق تعداد WBC و سطح هموگلوبین بالاتری داشتند (۱۶). هم‌چنین یک مطالعه در سال ۲۰۱۵ نشان داد که همبستگی مثبتی بین افزایش تعداد کل لکوسیت‌های محیطی و خطر دیابت

- Index and Hematological Parameters, Including RBCs, WBCs, and Platelet Counts, in Korean Children and Adolescents. *Children* 2022; 9(1): 109.
8. Al-Sufyani AA, Mahassni SH. Obesity and immune cells in Saudi females. *Innate Immun* 2011; 17(5): 439-450.
9. Erdal E, İnanir M. Platelet-to-lymphocyte ratio (PLR) and Plateletcrit (PCT) in young patients with morbid obesity. *Rev Assoc Med Bras* 2019; 65(9): 1182-1187.
10. Akinsegun A, Olusola DA, Sarah JO, Olajumoke O, Adewumi A, Majeed O, et al. Mean platelet volume and platelet counts in type 2 diabetes: mellitus on treatment and non-diabetic mellitus controls in Lagos, Nigeria. *Pan Afr Med J* 2014; 18:42.
11. Chen LK, Lin MH, Chen ZJ, Hwang SJ, Chiou ST. Association of insulin resistance and hematologic parameters: study of a middle-aged and elderly Chinese population in Taiwan. *J Chin Med Assoc* 2006; 69(6): 248-253.
12. Taniguchi A, Fukushima M, Seino Y, Sakai M, Yoshii S, Nagasaka S, et al. Platelet count is independently associated with insulin resistance in non-obese Japanese type 2 diabetic patients. *Metabolism* 2003; 52(10): 1246-1249.
13. Kodiatte TA, Manikyam UK, Rao SB, Jagadish TM, Reddy M, Lingaiah HK,etal. Mean platelet volume in type 2 diabetes mellitus. *J Lab Physicians* 2012; 4(1): 5-9.
14. Dixon JB, O'Brien PE. Obesity and the white blood cell count: changes with sustained weight loss. *Obes Surg* 2006; 16(3): 251-257.
15. Jamshidi L, Seif A. Association Between Obesity, White Blood Cell and Platelet Count. *Zahedan J Res Med Sci* 2017; 19(2): e4955.
16. Elmugabil A, Rayis DA, Abdelmageed RE, Adam I, Gasim GI. High level of hemoglobin, white blood cells and obesity among Sudanese women in early pregnancy: a cross-sectional study. *Future Sci OA* 2017; 3(2): FSO182.
17. Yoshimura A, Ohnishi S, Orito C, Kawahara Y, Takasaki H, Takeda H, et al. Association of Peripheral Total and Differential Leukocyte Counts with Obesity-Related Complications in Young Adults. *Obesity Facts* 2015; 8(1): 1-16.
18. Zhang SS, Yang XJ, Ma QH, Xu Y, Chen X, Wang P, et al. Leukocyte related parameters in older adults with metabolically healthy and unhealthy overweight or obesity. *Sci Rep* 2021; 11: 4652.