

بررسی ضرورت رادیوگرافی در دررفتگی قدمای مفصل شانه

مانی مفیدی ⁺(M.D.) کوروش احمدی ^{*}(M.D.)

چکیده

سابقه و هدف: دررفتگی قدمای شانه، شایع ترین دررفتگی مفصلی در بین مفاصل بزرگ می‌باشد. در اکثر موارد، این دررفتگی در بخش اورژانس جاندازی می‌گردد. به طور متداول قبل و بعد از جاندازی، پرتونگاری شانه درخواست می‌شود. هدف از این مطالعه، بررسی ضرورت انجام پرتونگاری شانه در درمان بیماران مشکوک به دررفتگی شانه در بخش اورژانس بود.

مواد و روش‌ها: این مطالعه Case series در طول یک سال در بخش اورژانس بیمارستان‌های رسول اکرم و شهدای هفتم تیر تهران بر روی ۱۱۶ بیمار مشکوک به دررفتگی قدمای شانه انجام گرفت. در ابتدا و انتهای جاندازی و قبل از انجام پرتونگاری، احتمال دررفتگی یا جاندازی کامل توسط پزشکان اورژانس ارزیابی و ثبت گردید. در نهایت پرتونگاری قبل و بعد از جاندازی، جهت تعیین دقیق تشریصی پزشکان توسط یک ارتوپد، بازبینی و نتایج مقایسه گردید.

یافته‌ها: ۸۴ نفر (۷۲ درصد) از افراد مورد مطالعه، مرد و نفر (۳۲ درصد) زن بودند. میانگین سنی افراد $\pm ۸/۵$ بود. ۳۰ نفر دررفتگی تکرار شده شانه با مکانیسم غیر ضربه (Trauma) داشتند (گروه ۱) و ۸۶ نفر، اولین مورد دررفتگی شانه یا دررفتگی با مکانیسم ضربه داشتند (گروه ۲). دقیق تشریصی پزشک در تعیین دررفتگی در گروه ۱، معادل ۱۰۰ درصد و در گروه ۲ معادل ۹۸ درصد بود. تشخیص اشتباه جاندازی کامل، فقط در موارد همراه با شکستگی دیده شد. از نظر دقیق تشریصی در زمان اطمینان پزشک از وجود دررفتگی یا جاندازی درست، اختلاف معنی داری بین قضاؤت بالینی پزشکان اورژانس و ارتوپد دیده نشد.

استنتاج: مطالعه حاضر نشان داد که قضاؤت بالینی پزشک با کمک معاینه فیزیکی مفصل شانه در تعیین وجود دررفتگی قدمای شانه و همچنین جاندازی کامل آن بسیار دقیق و قابل اطمینان است. پرتونگاری اولیه باید در موارد دررفتگی به علت ضربه گرفته شود. پرتونگاری جهت تأیید محل صحیح مفصل جانداخته شده باید در دررفتگی‌های همراه با شکستگی و یا در زمان شک پزشک انجام گیرد.

واژه‌های کلیدی: دررفتگی قدمای شانه، رادیوگرافی، جاندازی

* استادیار طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی ایران
** دستیار تخصصی طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی ایران
E mail: mmofidi@iums.ac.ir

+ مولف مسئول: تهران- خیابان نیایش، بیمارستان رسول اکرم
تاریخ دریافت: ۱۳۸۶/۱۰/۳ تاریخ ارجاع جهت اصلاحات: ۱۳۸۶/۱۱/۱۰
تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۱/۲۲

مقدمه

مدرن تر و با احتمال آسیب کم انجام گیرد(۱۲،۱۳). مطالعات اخیر، انجام پرتونگاری قبل و بعد از جاندازی را در تمامی موارد دررفتگی قدامی شانه زیر سوال برده است(۱۱،۱۲،۱۴). مطالعات متعددی در این زمینه انجام گرفته است. در این مطالعات که تعدادی گذشته نگر و تعدادی آینده نگر بودند، پژوهشگران نتیجه گرفتند به دلیل این که دقت تشخیصی پزشک در تعیین وجود دررفتگی و جاندازی بسیار زیاد است، انجام پرتونگاری قبل و بعد از جاندازی برای تمام موارد دررفتگی شانه لازم نمی باشد و در مواردی که پزشک از وجود دررفتگی و یا جاندازی کامل، اطمینان دارد می توان از انجام آنها چشم پوشی کرد. ولی در مواردی که پزشک از جاندازی کامل، مطمئن نمی باشد انجام پرتونگاری جهت کنترل توصیه می شود. همچنین در این مطالعات به دنبال جاندازی، حتی در موارد همراه با شکستگی، شکستگی قابل توجه جدیدی در پرتونگاری کنترل دیده نشده است(۱۱،۱۶).

با عنایت به این که انجام پرتونگاری قبل و بعد از جاندازی، مستلزم اتفاق وقت قابل توجه بوده، بیمار در معرض اشتعه مضر قرار گرفته و بار مادی قابل توجهی را بر بیماران وارد می کند، مطالعه حاضر بر اساس این اهداف انجام گرفت که بینیم آیا قضاوت بالینی پزشک برای تعیین وجود دررفتگی قدامی شانه آنقدر دقیق است که بتوان پرتونگاری قبل از جاندازی را در این بیماران حذف کرد و از سوی دیگر در صورت اطمینان کامل پزشک از جاندازی کامل، لزومی به انجام پرتونگاری کنترل نباشد تا در صورت دست یابی به نتایج مثبت، اصلاحاتی در روند تشخیص و درمان این بیماران صورت گیرد.

در رفتگی قدامی شانه، شایع ترین دررفتگی مفصلی در انسان است(۱،۲). شیوع آن در جامعه ۱۷ در ۱۰۰۰۰ می باشد(۳). تظاهرات آن شامل درد شدید و عدم توانایی بیمار در انجام برقی از حرکات شانه است. دست مبتلا در یک طرف و دور از بدن قرار گرفته و ساعد به سمت خارج می چرخد. گاهی اوقات سر استخوان بازو در قدام لمس می شود(۴). این دررفتگی در برقی موارد همراه با شکستگی هایی مانند شکستگی قدام گلنوبید و توپروزیته بزرگ استخوان بازو می باشد(۵،۶). تشخیص این نوع دررفتگی با گرفتن شرح حال و معاینه فیزیکی دقیق براحتی قابل انجام است(۴).

جاندازی بسته این دررفتگی معمولاً موقت آمیز است(۷). در مطالعات انجام شده احتمال عدم موقتیت جاندازی بین ۰ تا ۳۰ درصد به دست آمده است(۸،۲). برای جاندازی این دررفتگی روش های متعددی مانند Stimson (Hippocratic)، روشن Milch، روشن Scapular manipulation (Scapular manipulation) وجود دارد(۹،۱۰). جاندازی این دررفتگی در بیمارستان ها توسط متخصصین ارتقیلی یا اورژانس انجام می گیرد. به طور معمول در اغلب موارد هر دو این پزشکان قبل و بعد از اقدام به جاندازی، پرتونگاری شانه درخواست می کنند. دلایل درخواست این پرتونگاری ها شامل تأیید وجود دررفتگی، کامل بودن جاندازی و اطمینان از عدم ایجاد شکستگی جدید در هنگام جاندازی مفصل شانه می باشند(۱۱).

در مطالعات انجام شده موارد بسیار اندکی از شکستگی به دنبال جاندازی دررفتگی شانه مشاهده شده است. در واقع در این پژوهش های فراوان انجام شده، احتمال ایجاد شکستگی به دنبال جاندازی، بسیار نادر گزارش شده است؛ مخصوصاً وقتی جاندازی با روش های

مواد و روش ها

پزشک اورژانس با نظر ارتوپد در مورد دررفتگی، جاندازی و شکستگی مورد مقایسه قرار گرفت. داده های SPSS به دست آمده توسط روش T-test و با برنامه SPSS پردازش شد.

در پردازش تحلیلی مقادیر $P_{Value} < 0.05$ معنادار در نظر گرفته شد. در ابتدا بیماران برگه رضایت جهت ورود به مطالعه را تکمیل کرده و به تمام سؤالات مطرح شده از طرف ایشان پاسخ داده شد. در طی مطالعه، رمزهای ۲۶ گانه اخلاقی به کار گرفته شد.

یافته ها

در این مطالعه که در طول یک سال در بخش اورژانس بیمارستان های رسول اکرم (ص) و شهدای هفتم تیر انجام گرفت، ۱۱۶ بیمار مشکوک به دررفتگی قدمای شانه وارد مطالعه شدند. ۸۴ نفر (۷۲ درصد) از افراد مورد مطالعه، مرد و ۳۲ نفر (۲۸ درصد) زن بودند. میانگین سنی افراد $8/5 \pm 3/1$ بود. ۳۰ نفر دررفتگی تکرار شده شانه با مکانیسم غیر ضربه داشتند (گروه ۱) و ۸۶ نفر اولین مورد دررفتگی شانه یا دررفتگی با مکانیسم ضربه داشتند (گروه ۲).

در گروه ۱ هیچ شکستگی قبل و بعد از جاندازی وجود نداشت. در موارد دچار ضربه گروه ۲، ۸ مورد شکستگی وجود داشت که در تمامی موارد پس از جاندازی، شکستگی جدیدی دیده نشد. در گروه ۱ یک مورد و در گروه ۲ شش مورد جاندازی ناموفق بود که به اطاق عمل فرستاده شدند. نتایج معاینه پزشک اورژانس و نظر ارتوپد در هر دو گروه در جداول شماره ۱ و ۲ آورده شده است.

ارزش های آماری معاینه پزشک در جدول شماره ۳ نشان داده شده است.

در این مطالعه بررسی بیماران (Case series) از مهر ماه ۸۵ تا مهر ماه ۸۶ در بخش اورژانس بیمارستان های حضرت رسول اکرم و شهدای هفتم تیر واقع در تهران انجام گرفت. با در نظر گرفتن $\alpha = 0.05$ و $\beta = 0.80$ (Power = ۰.۸۰) و بر مبنای مطالعات قبلی^(۶)، تعداد ۱۱۶ بیمار انتخاب گردید. افرادی که به دنبال ضربه به شانه یا خود به خود دچار درد و محدودیت حرکت مفصل شانه به صورت قرارگیری بازو در وضعیت دور از بدن (external Rotation) و چرخش خارجی (abduction) مفصل شده بودند با تشخیص احتمالی دررفتگی قدمای مفصل شانه وارد مطالعه شدند.

معیارهای خروج از مطالعه شامل موارد: سن بیشتر از ۶۵ و کمتر از ۱۵ سال و وجود آسیب استخوانی، عصبی یا عروقی در اندام آسیب دیده بود.

بیماران قبل از انجام پرتونگاری توسط متخصصین یا رزیدنت های ارشد طب اورژانس معاینه شدند. اطلاعات جمعیت شناختی، علت دررفتگی (ضربه یا غیر ضربه)، مرتبه دررفتگی (بار اول یا تکرار شده) و تشخیص پزشک (به صورت دررفتگی قطعی یا مشکوک) ثبت گردید. پرتونگاری انجام شده و برای ارتوپد فرستاده شد. در صورت تأیید دررفتگی توسط ارتوپد، جاندازی به روش دلخواه پزشک طب اورژانس انجام گردید. جهت تأیید جاندازی از معاینه مفصل شانه، شنیدن صدای کلیک استخوان در هنگام جا رفتن و احساس کاهش درد بیمار کمک گرفته شد. نتیجه ارزیابی کلی به صورت جاندازی کامل، مشکوک یا ناموفق نوشته شد. سپس پرتونگاری کنترل، انجام شده و مجددآ جهت نظرخواهی به نزد ارتوپد، فرستاده شد. در صورت تأیید ارتوپد شانه بسته و بیمار با توصیه مراجعه به درمانگاه ارتوپدی مرخص گردید. در موارد جاندازی ناکامل، بیمار به اطاق عمل فرستاده شد. در نهایت تشخیص

جدول شماره ۳: ارزش‌های آماری معاینه پزشک اورژانس در تعیین وضعیت مفصل در شانه

مکانیسم	وضعیت مفصل شانه				
	ضریب با نوبت اول		غیر ضریب		
	بعد جاندازی	قبل جاندازی	بعد جاندازی	قبل جاندازی	شناخت
حساسیت	۸۳	۹۵	۹۶	۹۳	۹۶
ویژگی	۵۰	۱۰۰	۶۰	-	-
ارزش اخباری مثبت	۸۳	۱۰۰	۹۷	۱۰۰	۱۰۰
ارزش اخباری منفی	۵۰	۴۰	۵۰	-	-

* در موارد غیر ضریب به دلیل این که موارد منفی حقیقی وجود نداشت ویژگی و ارزش اخباری منفی محاسبه نشد. اعداد به درصد می‌باشند.

بحث

امروزه به طور معمول، پزشکان قبل و بعد از اقدام به جاندازی در رفتگی قدمامی شانه، در خواست پرتونگاری شانه می‌کنند. انجام پرتونگاری قبل و بعد از جاندازی در رفتگی قدمامی شانه از موارد مورد بحث متخصصین ارتوپدی و طب اورژانس می‌باشد(۱۴، ۱۷، ۱۶). گروهی از محققین عقیده دارند که این در رفتگی براحتی با گرفتن شرح حال و معاینه مفصل قابل تشخیص است(۴). از سوی دیگر مطالعات دیگری، پرتونگاری پس از جاندازی را مورد سؤال قرار داده است. در این مطالعات کاهش یافتن درد، شنیدن صدای کلیک جاندازی و بهبود دائمی حرکت مفصلی به جای رادیو گرافی توصیه شده است(۱۶، ۳). در صدموفیتی جاندازی در رفتگی شانه بدون توجه به نوع تکنیک جاندازی ۷۰ تا ۹۶ درصد می‌باشد(۲). موقوفت جاندازی در این مطالعه ۹۴ درصد به دست آمد. در دو مطالعه که بروی ۶۹ و ۱۰۴ بیمار انجام گرفت به ترتیب ۲ و ۵ مورد شکست در جاندازی اتفاق افتاد(۱۴، ۱۲). این میزان در مطالعه ما ۷ مورد بود که این اختلاف شاید به خاطر تفاوت‌های سنی و فیزیکی بیماران و یا به خاطر احتیاط و ملاحظه بیشتر، از جهت نرساندن آسیب ثانویه در هنگام جاندازی در مطالعه ما باشد.

جدول شماره ۱: دقت معاینه پزشک در تعیین وضعیت مفصل در گروه با در رفتگی تکرار شده شانه با مکانیسم غیر ضریب

مکانیسم اورژانس	تعداد	نظر ارتود	تعداد (درصد)	قبل جاندازی
در رفت	۴۹	در رفت	(۹۶) ۲۹	در رفت
در نرفت	۰	در نرفت	۰	
مشکوک	۱	در رفت	(۴) ۱	مشکوک
	۰	در نرفت	۰	
				بعد جاندازی
جاندازی کامل	۲۷	جاندازی کامل	(۹۰) ۲۷	جاندازی کامل
جاندازی نا کامل	۰	جاندازی نا کامل	۰	
مشکوک	۲	جاندازی کامل	(۶) ۲	مشکوک
	۰	جاندازی نا کامل	۰	
جاندازی نا کامل	۱	جاندازی کامل	(۴) ۱	جاندازی نا کامل
	۰	جاندازی نا کامل	۰	
				دقت تشخیصی در زمان اطمینان از وضعیت مفصل (۵۷/۵۷ CI ۹۳=۹۵/۹۵)(%) (۱۰۰%)

* نظر ارتود بر اساس رؤیت پرتونگاری شانه
CI: درجه اطمینان

جدول شماره ۲: دقت معاینه پزشک در تعیین وضعیت مفصل در گروه با در رفتگی نوبت اول یا با مکانیسم ضریب

مکانیسم اورژانس	تعداد	نظر ارتود*	تعداد (درصد)	قبل جاندازی
در رفت	۸۶	در رفت	(۹۳) ۸۰	در رفت
در نرفت	۷۸	در رفت	(۴۳) ۳۵	
مشکوک	۰** ۲	در نرفت	۰	مشکوک
	۳	در رفت	(۷) ۶	
مشکوک	** ۳	در نرفت	۰	
				دقت تشخیصی در زمان اطمینان از وضعیت مفصل (۷۸/۸۰ CI ۹۱=۹۵/۹۸)(%) (۱۰۰%)
				بعد جاندازی (همراه باشکنگی)
جاندازی کامل	۵	جاندازی کامل	(۶۲) ۵	جاندازی کامل
جاندازی نا کامل	۱	جاندازی نا کامل	(۲۵) ۲	مشکوک
مشکوک	۱	جاندازی کامل	(۲۵) ۲	
جاندازی نا کامل	۱	جاندازی نا کامل	(۱۳) ۱	جاندازی نا کامل
				دقت تشخیصی در زمان اطمینان از وضعیت مفصل (۵/۶ CI ۳۵=۹۵/۹۵)(%) (۸۳/۸۰%) (۱۰۰%)
				بعد جاندازی (در رفتگی ساده)
جاندازی کامل	۶۷	جاندازی کامل	(۹۲) ۶۷	جاندازی کامل
جاندازی نا کامل	۰	جاندازی نا کامل	۰	
مشکوک	۳	جاندازی کامل	(۶) ۵	مشکوک
جاندازی نا کامل	۲	جاندازی نا کامل	۰	
جاندازی نا کامل	۱	جاندازی کامل	(۲) ۱	جاندازی نا کامل
				دقت تشخیصی در زمان اطمینان از وضعیت مفصل (۶۸/۶۸ CI ۹۴=۹۵/۹۵)(%) (۱۰۰%)
				بعد جاندازی کامل

* نظر ارتود بر اساس رؤیت پرتونگاری شانه

** برای ۵ بیمار که طبق نظر ارتود در رفتگی نداشتند جاندازی صورت نگرفت
CI: درجه اطمینان

ضریب و موقع عدم اطمینان پزشک از وضعیت مفصل و پرتونگاری پس از جاندازی درموارد همراه با شکستگی توصیه گردید(۱۲).

پژوهش حاضر نشان داد که در موارد دررفتگی مکرر قدمی شانه بدون مکانیسم ضربه، پزشکان به طور بسیار دقیق قادر به تشخیص دررفتگی و جاندازی صحیح بودند (جدول شماره ۱). درمواردی که تشخیص قطعی پزشک اورژانس دررفتگی یا جاندازی کامل بود، در تمامی موارد تأیید ارتوپد مشاهده گردید (دقت تشخیصی ۱۰۰ درصد). در زمان اطمینان پزشک اورژانس از وضعیت مفصل، اختلاف معنی داری بین نظر پزشک و ارتوپد دیده نشد. بنابراین می شود نتیجه گرفت که در موارد دررفتگی مکرر قدمی شانه بدون مکانیسم ضربه می توان از انجام پرتونگاری قبل و بعد از جاندازی صرف نظر کرد.

در موارد دررفتگی نوبت اول یا با مکانیسم ضربه بر خلاف گروه اول موارد بیشتری از عدم اطمینان پزشک از دررفتگی مشاهده گردید که ۵۰ درصد موارد مشکوک طبق نظر ارتوپد دچار دررفتگی نشده بودند. ولی در این گروه هم در زمان اطمینان پزشک اورژانس از وضعیت مفصل، اختلاف معنی داری بین نظر پزشک و ارتوپد دیده نشد ($P < 0.05$). دقیق تر شخیصی پزشک معادل ۹۸ درصد به دست آمد (جدول شماره ۲).

از سوی دیگر ۸ مورد شکستگی در گروه ۲ دیده شد که در افراد با دررفتگی- شکستگی تعداد قابل توجهی از موارد همراه با جاندازی ناموفق یا عدم اطمینان از وضعیت مفصل پس از جاندازی بود. دقیق تر شخیصی پزشک از وضعیت جاندازی در این افراد به مراتب کمتر و معادل ۸۳ درصد به دست آمد (جدول شماره ۲). بین نظر پزشک و ارتوپد اختلاف معنی داری وجود داشت ($P < 0.05$). بنابراین در موارد همراه با شکستگی باید پرتونگاری پس از جاندازی انجام گیرد

در دو مطالعه انجام شده هیچ شکستگی جدید قابل توجهی به دنبال جاندازی دیده نشد که مطابق با نتایج مطالعه حاضر می باشد(۱۳، ۱۴).

چند محقق در دانشگاه کالیفرنیا مطالعه ای در زمینه نیاز به پرتونگاری قبل و بعد از جاندازی دررفتگی شانه انجام دادند. این پزشکان الگوریتمی جهت لزوم پرتونگاری تهیه کردند. طبق این الگوریتم پرتونگاری شانه درموارد دررفتگی نوبت اول، موارد همراه با ضربه و عدم اطمینان پزشک از وضعیت مفصل گرفته شد. با این الگوریتم ۴۶ درصد کاهش در انجام پرتونگاری ها و صرفه جویی قابل توجه در وقت مشاهده شد. از سوی دیگر هیچ مورد شکستگی یا دررفتگی از قلم افتاده در موارد بدون پرتونگاری شانه یافت نشد (با پیگیری تلفنی). درنهایت محققین نتیجه گرفتند که نظر پزشک در تعیین محل سراستخوان بازو بسیار دقیق می باشد، بنابراین در دررفتگی شانه پرتونگاری باید به طور انتخابی و طبق الگوریتم توصیه شده درخواست گردد(۱۵).

مطالعه دیگری در ارتباط با ارزش پرتونگاری پس از جاندازی بر روی ۷۳ بیمار با دررفتگی قدمی شانه انجام گرفت. در این مطالعه حدود ۳۷ درصد شکستگی ها فقط در پرتونگاری پس از جاندازی مشاهده شدند، با این وجود هیچ کدام از این شکستگی های از قلم افتاده موجب اختلال در درمان دررفتگی نگردیده بودند. محققان این مطالعه نتیجه گرفتند دررفتگی قدمی شانه ممکن است همراه با شکستگی هایی باشد که به خاطر کوچکی یا وضعیت قرارگیری مفصل در پرتونگاری اولیه دیده نشوند، ولی این شکستگی ها روند درمانی بیمار را تغییر نمی دهد(۱۶). در مطالعه Hendey (۲۰۰۰) در آمریکا که بر روی ۱۰۴ بیمار انجام گرفت نتیجه گرفته شد که معاینه پزشک اورژانس در تعیین دررفتگی و جاندازی کامل بسیار دقیق می باشد. درنهایت پرتونگاری اولیه در موارد با مکانیسم

مقالات و کتب مرجع هم به آن اشاره شده است(۱-۶)، علاوه بر این متخصصین و رزیدنت‌های ارشد طب اورژانس آموزش‌های لازم جهت معاینه درست مفصل شانه را دیده بودند، بنابراین در مرحله تشخیص دررفتگی شانه، احتمال موارد از قلم افتاده (منفی کاذب) بسیار ضعیف می‌باشد. از سوی دیگر پس از جاندازی مفصل، تمامی پرتونگاری‌ها توسط یک متخصص ارتود بد تصمیم‌گیری می‌شد، بنابراین در این مرحله (تأیید جاندازی) ما هیچ مورد منفی کاذبی نداشتیم.

به عنوان نتیجه‌گیری کلی این مطالعه نشان می‌دهد که پزشکان در موارد دررفتگی شانه بدون شکستگی به طور بسیار دقیقی قادر به تشخیص دررفتگی و جاندازی صحیح می‌باشند. پرتونگاری شانه باید در زمانی که پزشک از وضعیت مفصل اطمینان ندارد، درخواست گردد. در دررفتگی نوبت اول یا با مکانیسم ضربه پرتونگاری قبل از جاندازی باید انجام گیرد. در این بیماران پرتونگاری پس از جاندازی باید به موارد همراه با شکستگی یا مشکوک محدود گردد. بنابراین به نظر می‌رسد زمانی که پزشک از طریق معاینه و شرح حال وضعیت مفصل شانه را تعیین می‌کند، پرتونگاری شانه نکته جدیدی که تغییر دهنده روند درمانی بیمار باشد را اضافه نمی‌کند.

زیرا در این موقع ارزیابی وضعیت مفصل با معاینه مشکل می‌باشد.

در بیماران گروه ۲ که پرتونگاری آنها فاقد شکستگی بود مجدداً شاهد دقت تشخیصی بسیار بالای پزشکان در زمان اطمینان کامل بودیم (۱۰۰ درصد)؛ به طوری که اختلاف معنی‌داری بین نظر پزشک و ارتود بد نداشت. پس نتیجه می‌گیریم در موارد دررفتگی نوبت اول شانه یا با مکانیسم ضربه، اگر در پرتونگاری قبل از جاندازی شکستگی دیده نشود، در صورت اطمینان پزشک از جاندازی کامل می‌توان پرتونگاری پس از جاندازی را حذف کرد.

این مطالعه دارای برخی محدودیت‌ها است. ممکن است تعدادی از بیماران واجد شرایط به ذلیل عدم تشخیص پزشک وارد مطالعه نشده باشند (منفی کاذب)، مهارت پزشکان در معاینه مفصل شانه با هم متفاوت است و از سوی دیگر تعدادی از شکستگی‌های ریز ممکن است در پرتونگاری دیده نشوند. همان‌طور که در برخی مطالعات تذکر داده شده (۱۹) در صورت عدم انجام پرتونگاری، ترس از مسائل پزشکی قانونی که همیشه دست و پا گیر پزشکان است وجود دارد، بنابراین مطالعات دیگر با حجم نمونه بیشتر توصیه می‌شود. دررفتگی قدامی شانه با گرفتن شرح حال و معاینه فیزیکی دقیق براحتی قابل تشخیص می‌باشد که در

فهرست منابع

1. Kesmezacar H. The evaluation and treatment of acute anterior shoulder dislocation. *Acta Orthop Traumatol Turc* 2005; 39: 40-47.
2. Uehara DT, Rudzinski JP. Injuries to the shoulder complex and humerus. In: Tintinalli J, Kelen G, Stapcynski J. *Emergency Medicine* 5th ed. New York: McGraw Hill; 2004. p. 1695-1702.
3. Daya M. Shoulder. In: Marx J, Hockberger R, Walls R. *Rosen's Emergency Medicine* 6th ed. Philadelphia: Mosby; 2006. p. 670-701.

4. Hoi E. A new method of immobilization after traumatic anterior dislocation of the shoulder. A preliminary study. *J Shoulder Elbow Surgery* 2003; 12(5): 413-415.
5. Despeyroux ML, Loustau O, Railhac JJ, Sans N. Imaging of traumatic injuries of the shoulder. *J Radiol* 2007; 88(5): 718-733.
6. Lee DJ, Yeap JS, Fazir M, Muhd Borhan TA, Kareem BA. Audit on radiographs in anterior shoulder dislocations. *Med J Malaysia* 2005; 60(1): 15-20.
7. Shyamkumar AJ, Charity R, Periera A, Deshmukh SC. Interposed subscapularis: a rare cause of irreducible shoulder dislocation. *E J Orthop Surg Traumatol* 2005; 15(1): 42-44.
8. Yuen MC, Yap PG, Chan YT, Tung WK. An easy method to reduce anterior shoulder dislocation: The Spaso technique. *Emerg Med J* 2001; 18: 370-2.
9. Cunningham NJ. Techniques for reduction of anteroinferior shoulder dislocation. *Emerg Med Australas* 2005; 17(5-6): 463-471.
10. Habermeyer P, Lichtenberg S. Diagnosis and treatment of anterior and posterior shoulder dislocation. II. Treatment. *Chirurg* 2003; 74(12): 1178-1194.
11. Hendey GW, Kinlaw K. Clinically significant abnormalities in postreduction radiographs after anterior shoulder dislocation. *Ann Emerg Med* 1996; 28(4): 399-402.
12. Hendey GW. Necessity of radiographs in the emergency department management of shoulder dislocations. *Annals Of Emergency Medicine* 2000; 36(2): 108-113.
13. Wen D. Current concepts in the treatment of anterior shoulder dislocations. *Am J Emerg Med* 1999; 17: 401-407.
14. Harvey RA, Trabulsky ME, Roe L. Are postreduction antero-posterior and scapula Y views useful in anterior shoulder dislocations? *Am J Emerg Med* 1992; 10: 149.
15. Kahn JH, Mehta SD. The role of post-reduction radiographs after shoulder dislocation. *J Emerg Med* 2007; 33(2): 169-173.
16. Hendey GW, Chally MK, Stewart VB. Selective radiography in 100 patients with suspected shoulder dislocation. *J Emerg Med* 2006; 31(1): 23-28.
17. Ufberg J, McNamara R. Management of common dislocations. In: Robert J, Hedges J. *Clinical procedures in Emergency Medicine*. 4th ed. Philadelphia, PA: WS Saunders; 2004. p. 946-988.
18. Shuster M, Abu-Laban RB, Boyd J. Prereduction radiographs in clinically evident anterior shoulder dislocation. *Am J Emerg Med* 1999; 17: 653.
19. Cattermole G, Wyatt J. X ray for shoulder dislocation? *J Emerg Med* 2006; 31: 23-28.