

بررسی وضعیت جمع‌آوری، حمل، و دفع زباله‌های بیمارستان‌های دولتی و خصوصی استان مازندران در سال ۱۳۸۰

* انوشیروان حسني (Ph.D.)
 ** مریم جوادیان (M.Sc.)
 *** شیرزاد غلامی (M.Sc.)
 مهدی یونسیان (M.Sc.)

چکیده

سابقه و هدف : بیمارستان یکی از منابع تولید زباله در شهرها بوده که بخش اعظم مواد زاید تولیدی آن را زباله‌های مخاطره‌آمیز تشکیل می‌دهد. عدم توجه به کنترل زباله‌های بیمارستانی نه تنها سلامت بیماران و پرسنل بیمارستانی را به خطر می‌اندازد بلکه به طور غیرمستقیم اثر شدیدی بر روی سلامت انسان‌های خارج از بیمارستان داشته و موجب آلودگی محیط زیست می‌شود. برهمین اساس، وضعیت جمع‌آوری، حمل، و دفع زباله‌های بیمارستان‌های دولتی و خصوصی استان مازندران مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روش‌ها : تحقیق به روش توصیفی و از نوع زمینه‌یابی (پیمایشی) بر روی کلیه بیمارستان‌های سطح استان در سال ۱۳۸۰ انجام پذیرفت که شامل ۲۰ بیمارستان دولتی و ۷ بیمارستان خصوصی می‌باشد. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، مشاهده عینی محقق و تکمیل پرسشنامه (فرم اطلاعاتی) محقق ساخته بوده است.

نتایج : یافته‌های بدست آمده از این پژوهش نشان داد که علی‌رغم این که بیمارستان‌های استان مازندران جداسازی زباله را انجام می‌دهند اما در ۸۵ درصد از بیمارستان‌ها جداسازی زباله به طور کامل انجام نمی‌گیرد و گاه‌آن زباله‌های عفونی در سطلهای غیرعفونی دیده می‌شود؛ کای اسکوئر ($\chi^2 = ۳/۸۴$) بدست آمده رابطه معنی‌داری بین بیمارستان‌های دولتی و جداسازی زباله نشان می‌دهد. نحوه حمل زباله از بخش‌ها به جایگاه موقت زباله در ۴۵ درصد از بیمارستان‌های دولتی بوسیله دست و در ۵۵ درصد مابقی به وسیله چرخ‌دستی بود. این کار در ۴۲ درصد از بیمارستان‌های خصوصی به وسیله دست و در ۵۸ درصد مابقی به وسیله چرخ‌دستی انجام می‌گرفت. شصت درصد از بیمارستان‌های موردن بررسی دارای زباله سوز هستند و کای اسکوئر ($\chi^2 = ۲/۲۵$) بدست آمده نیز رابطه معنی‌داری را بین زباله سوزهای سالم و فعال و بیمارستان‌های دولتی نشان داد.

استنتاج : با توجه به نتایج پژوهش، قانونمند نمودن و تدوین آینین نامه‌های اجرایی در زمینه مواد زاید بیمارستانی و حفظ و توسعه کمیته کنترل عفونت بیمارستانی و بکارگیری نیروی کارآمد بهداشت محیطی و همچنین آموزش مداوم کارکنان بیمارستان از امور اجتناب ناپذیر جهت جمع‌آوری، حمل، و دفع بهداشتی زباله‌های بیمارستانی می‌باشد.

واژه‌های کلیدی : زباله سوز، زباله‌های عفونی و غیر عفونی، بیمارستان‌های دولتی و خصوصی

۱- این تحقیق طی شماره ۳۱-۷۹ در شورای پژوهشی دانشگاه ثبت گردیده و با حمایت مالی دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام شده است.

* استادیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران ساری- خیابان وصال شیرازی- دانشکده بهداشت

** کارشناس ارشد دانشگاه علوم پزشکی مازندران

*** مریم دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران

مقدمه

از گاز متان، یک مورد بیماری تنگی نفس و مجروح شدن بچه ها از شیشه شکسته و ظروف چینی و مواردی از آتش سوزی های ناشی از سوزاندن زباله است. ولی مواد زاید بیمارستانی حتی اگر سوزانده شوند، احتمال خطر از بین نمی رود(۲).

مواد زاید خطرناک می تواند سلامت انسان را به خطر اندازد. از خصوصیات مواد زاید خطرناک این است که تکنولوژی جمع آوری و دفع این گونه مواد تابع ضوابط و معیارهای خاصی است که بایستی به صورت ویژه ای توسط متخصصان اجرا گردد(۲).

مواد زاید مسئله ساز در بیمارستان نه تنها احتمال خطرناک بیماری زایی بلکه احتمال خطر مجروح کردن و آلدگی کارکنان را نیز دارد. در یک مطالعه اپیدمیولوژیک بر روی کارکنان یک بیمارستان آموزشی که توسط Kuri (۱۹۹۷) و همکاران طی سه سال انجام گرفت، آسیب دیدگی کارکنان با سوزن و اشیاء تیز زاید بیمارستان مورد بررسی قرار گرفت که روش کار از طریق پرسشنامه بود و پارامترهای مورد بررسی ابتلای به هپاتیت C و HIV بوده است. نتایج بدست آمده در طی این سه سال بیانگر آسیب دیدگی ۲۴۸ نفر از کارکنان بوده است که از این تعداد ۴۳/۱ درصد پرستاران، ۱۹ درصد نظافت چیان، ۱۵/۷ درصد انترن ها، ۱۱/۷ درصد رزیدنت ها، و ۶ درصد تکنسین ها بوده اند که ۱۰/۵ درصد به علت دفع سرسوزن و ۱۲/۵ درصد در مدت جمع آوری زباله و ۷۷/۵ درصد نیز به دلایل دیگر بوده است(۳).

Cox (۱۹۹۷) و همکاران نیز در مطالعه ای تحت عنوان مدیریت حفاظت محیطی مواد زاید و نقش کارکنان در توسعه آن، به کاهش حجم زباله تولیدی توسط ارایه کنندگان خدمات بهداشتی، از طریق آموزش آنها اشاره نموده اند(۴).

بیمارستان یک مؤسسه پژوهشی است که با استفاده از امکانات تشخیصی، درمانی، بهداشتی، آموزشی، و تحقیقی به منظور بهبودی بیماران سرپایی و بستری به وجود می آید و آسایش و اینمی بیماران و کارکنان خود را تأمین می نماید(۱).

در بیمارستان ها، طیف وسیعی از زباله، تولید می شود. زباله های حاصل از قسمت های اداری و زباله های آشپزخانه، از نوع مواد زاید خانگی است، در حالی که زباله های ناشی از اتاق عمل کاملاً عغونی بوده و جزو مواد زاید خطرناک به حساب می آیند. در تمامی بیمارستان ها، زباله های خانگی تولید می شود. اجزایی مانند کاغذ، پسمانده آشپزخانه، گل و غیره در زباله بیمارستان ها وجود دارد. این مواد در صورتی که با مواد خطرناک و عغونی مخلوط شوند، بی خطر بوده و می توان آنها را همانند مواد زاید خانگی جمع آوری، حمل، و دفع نمود. به این مواد، مواد زاید مشابه "مواد زاید خانگی" گفته می شود. علاوه بر مواد فوق، مواد زاید خطرناک هم در بیمارستان ها تولید می شود. نوع این مواد، به نوع فعالیت بیمارستان بستگی دارد. به این نوع مواد زاید تولیدی خطرناک، "مواد زاید ویژه بیمارستانی" گویند(۱).

در خصوص وجود عوامل بیماری زا در زباله های خانگی هیچ گونه آماری در دسترس نمی باشد. البته تعیین احتمال یا پتانسیل ایجاد و خطر ناشی از مواد زاید خانگی و گسترش و بسط آن بسیار مشکل می باشد. نتایجی که پژوهشکان در سال ۱۹۷۲ طبق بررسی در کشور جمهوری آلمان فدرال از طریق ۱۲۵۱ برگ پرسشنامه در مورد ایجاد بیماری از طریق مواد زاید خانگی به دست آورده اند، نشان می دهد که مجموعاً ۱۲۴۴ نفر به این سوال پاسخ نداده اند و یا پاسخ منفی داده اند و فقط ۷ مورد جواب مثبت به دست آمده است که شامل یک مورد مسمومیت ناشی از قرص ها، یک مورد مسمومیت ناشی

شناخت وضعیت بیمارستان‌ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردیده است.

جامعه آماری این تحقیق شامل ۱۹ بیمارستان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مازندران و یک بیمارستان تأمین اجتماعی و ۷ بیمارستان خصوصی می‌باشد که جمعاً ۲۷ بیمارستان دولتی و خصوصی را تشکیل می‌دهند و از آنجایی که کل جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفت، از نمونه آماری استفاده نشده است. ابزار گردآوری این تحقیق فرم اطلاعاتی (پرسشنامه محقق ساخته) می‌باشد که وضعیت زباله‌ها را در چهار مرحله تولید و انتقال به جایگاه نگهداری موقت و نحوه جمع‌آوری و دفع و نیز کلیه عوامل و متغیرهای دخیل در این مراحل را مورد بررسی قرار می‌دهد.

داده‌های بدست آمده از پرسشنامه در جدول‌های منعکس شده و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. از آنجایی که جمع‌آوری داده‌ها به صورت تمام شماری بوده است، لذا جهت تجزیه و تحلیل از آمار توصیفی استفاده شد. بنابراین پس از ثبت داده‌ها در کامپیوتر از جدول توزیع فراوانی و نمودارهای ستونی استفاده گردید و نیز با استفاده از پارامترهای نظری میانگین و غیره جامعه مزبور مورد ارزیابی قرار گرفت و همچنین جهت مقایسه بیمارستان‌های دولتی و خصوصی از آمار استنباطی کای اسکوئر استفاده شد.

نتایج

۷۴ درصد از بیمارستان‌های استان را بیمارستان‌های دولتی (۱۹ مورد تحت پوشش وزارت بهداشت و درمان و یک مورد تحت پوشش تأمین اجتماعی) تشکیل می‌دهند که حدوداً دارای ۲۶۲۱ تخت فعال می‌باشند. در سطح استان تنها در پنج بیمارستان پرسنل بهداشت محیط وجود دارد که از این میان چهار نفر آنها در بیمارستان‌های شهر ساری مستقر هستند. بیمارستان‌های خصوصی با

جداسازی مواد مختلف از داخل زباله‌های بیمارستانی در هر مرحله از جمع‌آوری زباله و یا زیر و رو کردن این مواد کاملاً غیربهداشتی بوده و منع اعلام شده است^(۵). بنابراین لزوم جداسازی زباله‌های ویژه بیمارستانی از زباله مشابه مواد زاید خانگی بیمارستانی در مبدأ تولید زباله الزامی بوده و کلیه مراحل جمع‌آوری، حمل، و دفع جداگانه زباله تأکید می‌گردد.

در پژوهش دیگری که توسط عبدالایمان عموبی (۱۳۷۵) انجام شد، وضعیت جمع‌آوری، حمل، نقل، و دفع نهایی زباله در بیمارستان‌های استان خوزستان با استفاده از پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت که در این پژوهش بیش از ۲۲ درصد از کل زباله تولیدی بیمارستان‌ها عفونی بوده که در بیشتر آنها (۱۲/۷۸ درصد)، این نوع زباله همراه دیگر زباله‌های تولیدی به خارج از بیمارستان حمل می‌شود و در ۲/۵۶ درصد از بیمارستان‌ها زباله تولیدی به شیوه دستی از بخش‌ها جمع‌آوری شده است^(۶).

باتوجه به اهمیت زباله‌های بیمارستانی و بررسی‌های انجام شده، این مطالعه با هدف شناخت وضعیت جداسازی، حمل، و دفع زباله‌های بیمارستان‌های دولتی و خصوصی و مقایسه بیمارستان‌ها بر حسب متغیرهای مختلف پژوهش و نیز مشخص نمودن وضعیت زباله‌سوزها و کمیته کنترل عفونت بیمارستانی و کمیته بهداشت انجام گرفت.

مواد و روش‌ها

این پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی بوده که جهت شناخت موضوعات پژوهش از دو شیوه استفاده شده است. نخست شیوه کتابخانه‌ای و اسنادی که به منظور آگاهی از نظریه‌های صاحب نظران و محققان درباره موضوع مورد تحقیق و برای صورت بندی فرضیات مورد استفاده قرار گرفت. دوم آن که جهت

متأسفانه این دستگاه به علت عدم کارآبی لازم دراثر مرور زمان اکثراً شکسته و تیغه آن کند شده و عملاً در بیمارستان‌ها از آن استفاده نمی‌شود. در تمامی بیمارستان‌ها زباله‌های نوک تیز را در جعبه‌های مقاوم نگهداری می‌کنند و نیز طریقه انهدام جنین و اندام‌های قطع شده، تحويل دادن به بیمار و نهایتاً دفن در گورستان بوده و طریقه انهدام جفت در ۷۷ درصد از بیمارستان‌ها سوزانیدن می‌باشد.

جمع‌آوری زباله از بخش‌ها در ۵۵ درصد از بیمارستان‌ها به وسیله چرخ دستی بوده است و در ۴۵ درصد از بیمارستان‌ها وسیله جمع‌آوری زباله سطل پلاستیکی به همراه کیسه نایلون بوده که در هر شیفت به وسیله دست از بخش‌ها جمع‌آوری می‌شود و بعد از تخلیه، شسته شده و به تناوب ضدغونی می‌گردد.

در ۳۳ درصد از بیمارستان‌ها، اتفاک جایگاه موقت مستقل، مسقف و متناسب با حجم زباله تولیدی بوده و در ۲۰ درصد از بیمارستان‌ها زباله درون اتفاک زباله سوز بوده و در ۱۰ درصد از بیمارستان‌ها جایگاه موقت زباله به شکل تریلی چرخدار مسقف بوده و در ۳۰ درصد از بیمارستان‌ها زباله‌ها در گوشه‌ای تلبیار می‌شود. تنها در ۱۵ درصد از بیمارستان‌ها جایگاه موقت دارای آب و کفسور بوده و ۲۰ درصد از آنها دیواره قابل شستشو داشتند ولی در ۷۵ درصد از بیمارستان‌ها شرایط ضد غونی رعایت نگردیده بود، به نحوی که در این جایگاه حشرات و جانوران موذی و خانگی دیده‌می‌شوند. همچنین در ۷۷ درصد از بیمارستان‌ها جایگاه موقت روباز بوده است که در انتشار آلودگی می‌تواند نقش مهمی را ایفاء نماید.

در خصوص مدت نگهداری زباله در جایگاه موقت، در ۶۵ درصد از بیمارستان‌ها روزانه و در ۳۵ درصد از بیمارستان‌ها هفته‌ای ۳ بار زباله‌ها از جایگاه موقت به محل دفع نهایی حمل می‌شود و همچنین نحوه حمل

داشتن ۳۸۴ تخت فعال فاقد پرسنل بهداشت محیط می‌باشد. بیمارستان‌های دولتی در سال گذشته ۸۳ بار جلسه کنترل عفوونت بیمارستانی را تشکیل داده‌اند به عبارت دیگر هر بیمارستان حدوداً ۴ بار جلسه داشته است. در بیمارستان‌های خصوصی ۲۲ بار جلسه کنترل عفوونت بیمارستانی برگزار شده است، یعنی هر بیمارستان حدوداً ۳ بار جلسه داشته است.

علی‌رغم آن که زباله‌دان‌های مخصوص زباله‌های عفوونی تقریباً در تمامی بیمارستان‌های مورد بررسی قرار داشته است، کای اسکوئر ($X^3 = ۳/۸۴$) بدست آمده از بیمارستان‌های دولتی و خصوصی (جدول شماره ۱) نیز مؤید همین مسئله بوده، ولی متأسفانه در ۸۵ درصد از آنها جداسازی زباله به طور کامل اجرا نمی‌شود و گاهی زباله‌های عفوونی در کیسه و سطل‌های غیر عفوونی وجود داشته است.

جدول شماره ۱: وضعیت وجود زباله دان مخصوص زباله‌های عفوونی در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی استان مازندران در سال ۱۳۸۰

بیمارستان خصوصی	بیمارستان دولتی	بلی	خیر
۱	۱۹		
		۶	۱

کیسه زباله زرد رنگ جهت جداسازی زباله‌ها بسیار نازک و کوچک بود به گونه‌ای که در هنگام استفاده غالباً پاره شده و زباله‌ها به زمین ریخته می‌شوند و در مقایسه بیمارستان‌های دولتی و خصوصی نیز ($X^2 = ۰/۷۱$) اختلاف بین آنها معنی دارنبوده است. به عبارت دیگر بیمارستان‌های خصوصی و دولتی از نظر جداسازی زباله با یکدیگر تفاوت چندانی ندارند.

از آنجایی که معاونت درمان دانشگاه اقدام به توزیع Needle cutter نموده است، در تمامی بیمارستان‌های دولتی این دستگاه وجود داشته است اما این وسیله در هیچ یک از بیمارستان‌های خصوصی وجود ندارد.

اتفاقکی که زباله‌سوز در آن قرار دارد در ۵۰ درصد از بیمارستان‌های دولتی قابل شستشو و دارای حمام و توالت بوده است که از این تعداد تنها ۲۵ درصد از حمام و توالت بهداشتی برخوردارند و بقیه آنها فاقد حمام و توالت می‌باشند. مقدار زباله سوزانده شده بسته به حجم زباله تولیدی در بیمارستان‌ها متغیر است ولی به طور کلی متوسط میزان زباله جهت سوختن ۷۰ کیلوگرم می‌باشد.

اتفاقک زباله سوز در ۶۶ درصد از بیمارستان‌های خصوصی که دارای زباله سوز هستند کاشی کاری بوده و توالت و حمام بهداشتی دارند و مقدار زباله سوزانده شده با وجود متغیر بودن حدود ۳۵ کیلوگرم می‌باشد.

مقدار دود خروجی از دستگاه زباله‌سوز در بیمارستان‌های دولتی در حین کار بستگی به نوع روش کردن آن نیز دارد که در ۲۵ درصد از بیمارستان‌ها زیاد، در ۳۰ درصد متوسط، و در ۴۵ درصد کم می‌باشد. بوی ناشی از دستگاه در حین کار در ۸ درصد زیاد، در ۸ درصد متوسط، و در ۸۴ درصد از زباله‌سوزها کم می‌باشد و خاکستر حاصل از دستگاه در ۱۶ درصد موارد دفن و بقیه به همراه سایر زباله‌ها به خارج از بیمارستان حمل می‌شود. در مرور بیمارستان‌های خصوصی نیز مقدار دود خروجی و بوی ناشی از دستگاهها کم بوده و خاکستر حاصل از دستگاهها به خارج از بیمارستان حمل می‌شود.

۵۸ درصد از زباله سوزهای بیمارستان‌های دولتی نزدیک محل مسکونی بوده و نیمی از بیمارستان‌ها در شب زباله‌سوزهایشان را روشن می‌کنند. پنجاه درصد از بیمارستان‌های خصوصی زباله سوزشان نزدیک بخش بوده و در ساعت اداری زباله سوز شان را روشن می‌کنند.

بحث

تحقیق نشان داد که متوسط تشکیل جلسات کمیته کنترل عفونت در بیمارستان‌های دولتی حدوداً ۴ جلسه و در بیمارستان‌های خصوصی حدوداً ۳ جلسه در سال

زباله از جایگاه موقت در ۹۰ درصد از بیمارستان‌ها به وسیله کامیون شهرداری و در ۱۰ درصد از بیمارستان‌ها بهوسیله تریلر چرخدار انجام می‌گیرد. در ۵۵ درصد از بیمارستان‌ها، زباله‌های عفونی را سوزانده و در ۱۰ درصد از بیمارستان‌ها زباله را برای سوزاندن به بیمارستان دیگری می‌برند. سی و پنج درصد از بیمارستان‌ها زباله‌های عفونی را همراه با زباله‌های شهری به محل دفع نهایی منتقل می‌کنند که موجب بروز مشکلات بهداشتی فراوانی در محل دفع نهایی گردیده است.

در ۵۸ درصد از بیمارستان‌هایی که دارای زباله سوز هستند متصدیان آموزش دیده بر روی دستگاه کار می‌کنند که به طور متوسط ۵ سال است که این کار را انجام می‌دهند.

۶۰ درصد از بیمارستان‌های دولتی دارای زباله سوز سالم و فعال هستند و یک مورد نیز تازه خریداری نموده و یک بیمارستان نیز دارای زباله سوز خراب و غیر فعال است که در حال تعمیر بوده است. به عبارت دیگر، ۶۵ درصد از بیمارستان‌های دولتی دارای زباله سوز سالم و فعال بوده‌اند. حال آن که تنها ۲۸ درصد از بیمارستان‌های خصوصی دارای زباله سوز سالم و فعال می‌باشند و یک مورد خریداری شده به دلیل وصل نشدن به گاز شهری غیر فعال می‌باشد. کای اسکوئر بدست آمده از وضعیت دستگاه زباله‌سوز ($\chi^2=2/25$) می‌باشد که تفاوت معنی داری را بین وضعیت دستگاه زباله‌سوز در بیمارستان‌های دولتی با غیردولتی نشان می‌دهد (جدول شماره ۲).

جدول شماره ۲: وضعیت دستگاه زباله سوز در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی استان مازندران در سال ۱۳۸۰

	بیمارستان دولتی	
جمع	۱۲	
سالم	۱	۱
فعال	۷	۴
بیمارستان خصوصی		
جمع	۱۴	۲
سالم	۲	۱
فعال	۱۱	۷
بیمارستان دولتی	۷	۴

$X^2=\frac{\sum (O-E)^2}{E}$

$X^2=2/25$

یک سیستم صحیح دفع زباله منطقی با شرایط موجود و اجرای دقیق آن و همچنین نظارت و کنترل اصولی بر آن، از شیوع بیماری و ایجاد آلودگی در محیط جلوگیری نمود.

نحوه جمع آوری زباله از بخش ها و انتقال به جایگاه موقت در ۴۵ درصد از بیمارستان های استان دستی بوده و مدت نگهداری زباله در جایگاه موقت در ۶۵ درصد از بیمارستان ها کمتر از ۲۴ ساعت و حمل و نقل توسط شهرداری است. حال آن که طبق تحقیقی که توسط علیرضا رایگان شیرازی نژاد (۱۳۷۵) در استان فارس صورت پذیرفت، در بیشتر بیمارستان های مورد مطالعه، زباله ها به وسیله دست جمع آوری شده و مدت نگهداری زباله در جایگاه موقت نگهداری زباله در ۵/۹۰ درصد از بیمارستان ها بیش از یک شبانه روز است و حمل و نقل توسط شهرداری صورت می گیرد.^(۷)

نتایج تحقیق یعقوبی فر (۱۳۷۷) در تهران نشان می دهد درصد مطلوبیت یا میزان دستیابی به اهداف ویژه در بیمارستان های مورد مطالعه، براساس دستورالعمل تفکیک، جمع آوری، انتقال و دفع مواد زاید بیمارستانی و طرح سازمان خدمات موتوری شهرداری حدود ۸۰ درصد بوده است. دفع نهایی این زباله ها از طریق دفع آنها در ترانشه های ویژه با استفاده از پودر آهک و طرح احداث زباله سوز مرکزی نیز در دست اقدام می باشد.^(۸)

ذکر این نکته ضروری است که هنگام جمع آوری زباله کارکنان باید از روپوش و دست کش ضخیم و چکمه و ماسک تنفسی استفاده نمایند و نیز می توان یک نقشه تیپ را برای جایگاه موقت زباله کلیه بیمارستان ها ارایه داد که در آن ضمن مسقف بودن جایگاه، بهسازی (کاشیکاری یا سنگ کاری) سقف، کف و دیواره نیز در نظر گرفته شود و همچنین کف آن با شیب مناسبی به سمت کف شور هدایت گردیده و دارای آب و فاضلاب بهداشتی بوده، توری داشته باشد و وسایل و تجهیزات لازم برای ضد عفونی کردن جایگاه موقت زباله در نظر گرفته شود.

می باشد که با عنایت به بخشنامه وزارت بهداشت و درمان مبنی بر تشکیل جلسات به طور ماهیانه، تعداد جلسات $\frac{1}{3}$ انتظار مورد نظر بوده است، ضمن آن که تعداد جلسات کنترل عفونت در بیمارستان های خصوصی به $\frac{1}{4}$ تقلیل یافته است. حال آن که باید تشکیل جلسات کمیته کنترل عفونت بیمارستانی را اصلی ترین و مهمترین کانون رفع مشکلات عفونی و بهداشتی بیمارستان دانست. بیمارستان های دولتی با حدود ۲۶۲۱ تخت فعال، روزانه ۱۴۰۰ کیلوگرم زباله عفونی تولید می کنند و بیمارستان های خصوصی با داشتن ۳۸۴ تخت فعال، روزانه ۲۱۰ کیلوگرم زباله عفونی تولید می نمایند. این در مقایسه با تحقیق محمدعلی عبدالی (۱۳۷۵) که رابطه بین، مقدار زباله تولیدی و تعداد تخت بیمارستان را طبق فرمول $Y = \frac{181/153+1}{1/54}$ بدست آورد، کمتر می باشد، و عدمه ترین دلیل آن این است که بیمارستان های استان بسیاری از زباله هایشان را جزو زباله های عفونی به حساب نمی آورند. حال آن که طبق گزارش پروفسور Dresher (۱۹۹۷) از دانشکده پزشکی هانوور، از هر ۱۰۰ نمونه خون که از افراد سالم گرفته شده، یک نمونه دارای آنتی ژن استرالیایی است که منتقل کننده بیماری هپاتیت B می باشد. در تفسیر این نتیجه گیری باید تمام مواد زاید ناشی از بخش خون بیمارستان را جزو مواد زاید ویژه بیمارستانی تلقی کرد.

سرانه زباله تولیدی در بیمارستان های استان ۱/۱ تا ۱/۳ کیلوگرم به ازاء هر تخت می باشد، حال آن که در مطالعه محمدی بقایی (۱۳۷۰) در ۲۲ بیمارستان تهران، سرانه زباله تولیدی ۲/۷۱ کیلوگرم به ازاء هر تخت گزارش شده است. ضمن آن که سرانه زباله های بیمارستانی در سایر کشورها نیز دلالت بر مقادیر بالاتری از سرانه زباله بیمارستانی دارد (از جمله در کشور تایوان ۳/۵ تا ۴ کیلوگرم و در آمریکا ۲ تا ۹ کیلوگرم در شبانه روز گزارش شده است).^(۹)

از آنجایی که میزان زباله تولیدی در استان کمتر از سایر بیمارستان ها می باشد، به راحتی می توان با ایجاد

انجام نمی‌گیرد) می‌تواند به وسیله ماشین‌های مخصوص جمع آوری شود.

زباله‌ها باید از مبدأ تولید جداسازی شده و حمل زباله‌های عفونی بارعايت مقررات اینمی و حفاظتی به جایگاه دفع زباله‌های بیمارستانی صورت گیرد و در زباله سوزهایی با ظرفیت مناسب، و در ساعات بعد از ۱۰ صبح (به خاطر اینورژن هوا) و با تجهیزات کنترل آلودگی هوا (اسکرابر) سوزانیده شود.

اگر روش دفن بهداشتی مدنظر باشد باید مواد زاید قبل از دفن، استریل و گندزادی گردند و محل دفن مطابق مقررات پوشیده شود. این مسئله نیاز به آموزش مداوم کارکنان دارد و سیستم زباله‌سوز مرکزی در شهرهای کلیه زباله‌های عفونی مراکز درمانی اعم از بیمارستان‌ها، آزمایشگاه‌ها، مطب‌ها و غیره را تحت پوشش قرار دهد، مدامی موفق خواهد بود که مدیریتی مخصوص این کار با کارگرانی آموزش دیده و مجهز به لباس مخصوص با رعایت مقررات اینمی و حفاظتی زباله‌های تفکیک شده از مراکز درمانی را دریافت نموده و در ماشین‌های مخصوص حمل زباله عفونی که با آرم و رنگ مشخص علامت گذاری شده قرار دهنده و به جایگاه مخصوص زباله که کلیه شرایط لازم بهداشت محیطی (از قبیل قابل شستشو بودن سقف، کف، دیواره، دارا بودن حمام و دستشوئی بهداشتی و غیره) را داراست، حمل نموده، تا کارگران آموزش دیده این امور که مجهز به وسایل حفاظتی و اینمی هستند، زباله‌ها را سوزانیده و خاکستر حاصل را در حوضچه مخصوص آن با رعایت مقررات دفن نمایند.

در کلیه بیمارستان‌های دولتی، Needle cutter خریداری شده به علت خرابی زود هنگام فاقد کارآیی می‌باشد. بنابراین طبق پیشنهاد، کلیه بیمارستان‌ها و سایل نوک تیز را در جعبه مقاوم نگهداری می‌کنند. به طور کلی با عنایت به مسایل مطرح شده در مورد بیمارستان‌های استان مازندران پیشنهادهای ذیل ارایه می‌گردد:

تدوین نمودن آین نامه‌های اجرایی در زمینه مواد زاید بیمارستانی به نحوی که قانونمند شود.

حفظ و تقویت کمیته‌های کنترل عفونت بیمارستانی و کنترل مداوم برنامه‌ها، و آموزش مستمر به پرسنل از طریق این کمیته‌ها، با عنایت به این که در حال حاضر این جلسات بسیار نامنظم بوده و عملأً کمیته‌ها غیر فعال می‌باشند.

استخدام کارشناس کار آمد بهداشت محیط در بیمارستان و گذاشتن دوره‌های آموزشی برای آنان جهت نظارت مستمر در بیمارستان، حال آن که هم اکنون از مجموع ۲۷ بیمارستان، ۵ بیمارستان دارای پرسنل بهداشت محیط می‌باشد که ۴ بیمارستان آن در شهر ساری قرار دارد.

مواد زاید خطرناک بیمارستانی باید در کیسه‌های دو جداره‌پلاستیکی، با رنگ مخصوص (ترجیحاً زرد) و بر چسب (مواد زاید خطرناک) جمع آوری گردد و خود بیمارستان باید مسؤول دفع این گونه مواد باشد. فقط زباله‌های غیر خطرناک با رعایت کامل موارد جداسازی (به دلیل آن که جداسازی زباله به طور کامل

فهرست منابع

۱. عبدالی، محمدعلی. دفع مواد زاید بهداشتی و درمانی. تهران: شهرداری، آذرماه، ۱۳۷۵.
 ۲. سعیدنیا، احمد. کتاب سبز شهرداری. جلد هفتم، مواد زاید جامد شهری، تهران: وزارت کشور، ۱۳۷۸.
 ۳. Kuri-Bulos - NA - et al. Epidemiology of needlestick and sharp injuries at a university hospital in a developing country. *Ar- J - Infect Control.* 1997(Aug); 25(4): 322 – 9.
 ۴. COX M, Rhett C, Gudmundsen A. Environmental protection through waste management implication for staff development. *Junrse -Staff - Dev.* 1997. Nar-Apr; 13(2): 62-72.
 ۵. عمرانی، قاسم علی. مواد زاید جامد. جلد دوم، تهران: مرکزانشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، پاییز ۱۳۷۷، ص ۲۳۴.
۶. عمومی، عبدالایمان. بررسی وضعیت جمع آوری، نگهداری، حمل و نقل، و دفع مواد زاید بیمارستانی در بیمارستان های استان خوزستان وارایه پیشنهادهای مناسب جهت رفع مشکلات آن. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۵.
۷. رایگان شیرازی نژاد، علیرضا. بررسی وضعیت موجود جمع آوری حمل و دفع زباله های بیمارستانی استان فارس و ارایه روش های مناسب دفع. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس به راهنمایی عمرانی، قاسم علی، ۱۳۷۵.
۸. یعقوبی فر، محمدعلی. بررسی روش های دفع زباله های بیمارستانی در بیمارستان های واقع در محدوده فعالیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، ۱۳۷۷.