

## *A Review of Insecticide Resistance in Malaria Vectors of Iran*

Mohammad Yousef Mogaddam<sup>1,2</sup>,  
Farzad Motevalli Haghi<sup>3</sup>,  
Mahmoud Fazeli-Dinan<sup>3</sup>,  
Nasibeh Hosseini-Vasoukolaei<sup>3</sup>,  
Ahmad Ali Enayati<sup>4</sup>

<sup>1</sup> MSc Student in Medical Entomology, Student Research Committee, Faculty of Public Health, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

<sup>2</sup> Darmian Health Network, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran

<sup>3</sup> Assistant Professor, Department of Medical Entomology and Vector Control, Health Sciences Research Center, Faculty of Health, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

<sup>4</sup> Professor, Department of Medical Entomology and Vector Control, Health Sciences Research Center, Faculty of Health, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

(Received January 20, 2016 ; Accepted March 7, 2016)

### **Abstract**

**Background and purpose:** *Anopheles* mosquitoes are of particular importance because they transmit malaria. Implementing the malaria elimination program reduced its incidence in recent years in Iran. However, in the last decade, almost an annual average of 15 thousand cases was recorded. So far 24 species of *Anopheles* are collected in Iran of which 8 species are confirmed as malaria vectors. Despite the implementation of programs to combat malaria, it is still endemic in Iran due to various reasons including insecticide resistance among *Anopheles*.

**Materials and methods:** A review of published literature (1921-2015) was performed in electronic databases including Google Scholar, PubMed, SID, Ovid Medline, Web of Science, Irandoc, and the World Health Organization (WHO) web site. The search keywords were *Anopheles*, malaria, resistance, vectors, and mechanisms. A total of 160 articles and thesis were found from which 60 met the inclusion criteria.

**Results:** *Anopheles stephensi* was found resistant to DDT, Dieldrin and Malathion and becoming resistant against deltamethrin. However, no reports have been found on resistance in *An. fluviatilis*, *An. superpictus*, and *An. sacharovi* against DDT, Dieldrin, Malathion, and Deltamethrin. Different studies indicated that *An. maculipennis*, *An. dthali*, and *An. culicifacies* are resistant to DDT.

**Conclusion:** Insecticide resistance is becoming a serious threat to the effectiveness of malaria control measures, this is specially crucial as the country embarked on the malaria elimination programme, therefore, monitoring insecticide resistance in the main malaria vectors in Iran is of paramount importance.

**Keywords:** *Anopheles*, resistance, malaria, insecticide, Iran

## مروری بر مقاومت پشه های آنوفل ناقل مالاریا به حشره کش ها در ایران

محمد یوسف مقدم<sup>۱</sup>  
فرزاد متولی حقی<sup>۳</sup>  
محمود فاضلی دینان<sup>۳</sup>  
نصیبه حسینی واسوکلایی<sup>۳</sup>  
احمدعلی عنایتی<sup>۴</sup>

### چکیده

**سابقه و هدف:** پشه های آنوفل به دلیل این که ناقلین بیماری مالاریا می باشند، از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. در ایران ۲۴ گونه آنوفل صید شده که ۸ گونه از آن ها ناقل قطعی مالاریا می باشند. مالاریا به دلایل مختلف از جمله مقاومت آنوفل ها به حشره کش ها، هنوز در کشور حذف نشده است.

**مواد و روش ها:** در این مطالعه که به روش مروری انجام شد، با استفاده از کلمات کلیدی مانند آنوفل، مالاریا، مقاومت، ناقلین، حشره کش، مکانیسم های مقاومت و غیره و جستجو در اینترنت، سایت های مرتبط، مجلات معتبر پزشکی و بهداشتی، PubMed، Google Scholar، SID، Web of Science، Ovid Medline، iran doc، سایت WHO و غیره، تعداد ۱۶۰ مقاله و پایان نامه منتشر شده طی سال های ۱۳۰۰ تا سال ۱۳۹۴ دریافت و در نهایت تعداد ۶۰ منبع انتخاب و مورد نقد، تفسیر، تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

**یافته ها:** آنوفل استغفنی نسبت به سموم Dieldrin، DDT و Malathion مقاوم و نسبت به دلتامترین به سمت مقاومت پیش می رود، هنوز گزارشی مبنی بر مقاومت An. Fluviatilis، An. Superpictus، An. Sacharovi و نسبت به سموم Deltamethrin و Malathion، Dieldrin، DDT در ایران وجود ندارد. هم چنین بررسی ها نشان از مقاومت این ناقلین به حشره کش DDT دارد.

**استنتاج:** مقاومت به حشره کش ها به تهدیدی در برابر اثربخشی روش های مبارزه با ناقلین تبدیل شده است. این موضوع به خصوص با در نظر گرفتن برنامه حذف مالاریا در ایران دارای اهمیت ویژه ای است. بنابراین ارزیابی مقاومت به حشره کش ها در ناقلین مالاریا مورد تأکید است.

**واژه های کلیدی:** آنوفل، مقاومت، مالاریا، حشره کش، ایران

### مقدمه

حشرات یکی از بزرگ ترین رده های سلسله جانوری به شمار می آیند که از نظر تنوع گونه ای، پرشمارترین رده این سلسله محسوب می شوند. در این رده، پشه های آنوفل به دلیل این که ناقلین بیماری مالاریا

**مؤلف مسئول:** احمدعلی عنایتی - ساری: کیلومتر ۱۷ جاده فرح آباد، مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم، دانشکده بهداشت  
۱. دانشجوی ارشد حشره شناسی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران  
۲. کارشناس حشره شناسی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران  
۳. استادیار، گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران  
۴. استاد گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران  
✉ تاریخ دریافت: ۱۳۹۴/۱۱/۱ تاریخ ارجاع جهت اصلاحات: ۱۳۹۴/۱۲/۱۵ تاریخ تصویب: ۱۳۹۴/۱۲/۱۷

می‌باشند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. از بین ۴۶۳ گونه آنوفل شناسایی شده در دنیا، ۷۰ گونه ناقل بیماری مالاریا می‌باشند. در ایران نیز ۲۴ گونه آنوفل صید شده که ۸ گونه از آن‌ها به عنوان ناقلین قطعی مالاریا شناسایی شده‌اند (۱، ۲). مالاریا یکی از مهم‌ترین بیماری‌های عفونی واگیر در جهان است که در ۹۹ کشور جهان به صورت آندمیک وجود دارد (۳). این بیماری یکی از پر اهمیت‌ترین بیماری‌های عفونی ایران می‌باشد که در دهه اخیر به طور متوسط سالانه حدود ۱۵ هزار نفر را مبتلا نموده است. این آمار در سال ۲۰۱۳، تعداد ۵۱۹ بیمار از کل کشور بوده است (۴). از زمان‌های گذشته دور نیز این بیماری در ایران وجود داشته و برای اطباء ایرانی شناخته شده بوده است. در کتاب مقدس ایرانیان باستان (اوستا) به علائم بیماری مانند تب و لرز اشاره شده است (۵). پزشکان معروف و مشهور ایرانی مانند ابوعلی سینا در کتاب قانون و اسماعیل جرجانی در کتاب ذخیره خوارزمشاهی در حدود ۱۰۰۰ سال قبل، به علائم بیماری مالاریا مانند تب تایب، تب نوبه، تب و لرز اشاره نموده‌اند (۶). از طرف دیگر این بیماری به دلیل وفور بالا، ایجاد ضعف و ناتوانی، کم‌خونی، کاهش فعالیت فیزیکی مبتلایان، بروز بیماری در فصل کشاورزی و غیره، بیش از سایر بیماری‌ها مورد توجه بوده است. شیوع این بیماری در ایران به حدی بالا بوده که دکتر نلیکان، پزشک مظفرالدین شاه، در کتاب خود به نام راهنما برای مسافرین و سکنه ایران می‌نویسد: نود درصد مردم گیلان و مازندران مبتلا به مالاریا می‌باشند، به طوری که کسبه این مناطق همه روزه دکان‌های خود را به دست شاگردان خود می‌سپارند و به منازل می‌روند و تب می‌کنند و ۱-۲ ساعت بعد برمی‌گردند و سپس شاگردان برای تب کردن به منازل می‌روند. از میان افراد مشهور آن زمان که درگیر این بیماری شده ولی جان سالم بدر بردند، می‌توان به شاه عباس، فتحعلی شاه و ناصرالدین شاه قاجار اشاره نمود. اهمیت بیماری در ایران در

گذشته به حدی بالا بوده است که از آن به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بلایای کشور و یکی از عوامل بسیار مهم مرگ و میر و کاهش جمعیت یاد می‌نموده‌اند (۷). انگل‌های پلاسمودیوم شامل مالاریه، اوله، ویواکس و فالسیپاروم عامل ایجاد بیماری مالاریا می‌باشند که در ایران گونه‌های ویواکس، فالسیپاروم و مالاریه، عامل بیماری محسوب می‌شوند و با علائم لرز، تب، کم‌خونی و گاهی اوقات با عوارض شدید و کشنده همراه می‌باشد (۸).

اولین بررسی و مطالعه رسمی دولتی در خصوص بیماری مالاریا، توسط لاتشیف و گروه آن در دی ماه ۱۳۰۰ در رشت و بندرانزلی (بندر پهلوی سابق) انجام شد که بر اساس این گزارش، بیماری مالاریا در مناطق فوق با شدت بالایی وجود داشته است (۹). در سال ۱۳۰۳، دکتر ژیلومور بنا به تقاضای دولت ایران برای مطالعه بیماری مالاریا و بیماری‌های عفونی به ایران سفر کرد. براساس گزارش ایشان، مالاریا شایع‌ترین بیماری عفونی کشور ایران بود که هر ساله، ۴ تا ۵ میلیون نفر از جمعیت ۱۳ میلیون نفری آن زمان ایران به این بیماری مبتلا می‌گردیدند. در ادامه این فعالیت‌ها، بعد از جنگ جهانی دوم، گروه کارشناسان سازمان جهانی بهداشت به ایران اعزام شدند و بعد از بررسی و مطالعه بیماری در ۳۶۲ روستا در مناطق شمال، جنوب و مرکز کشور به این نتیجه رسیدند که ۷۵ درصد جمعیت کشور در مناطق مالاریا خیز زندگی می‌کنند و در معرض خطر این بیماری قرار دارند (۷). آغاز برنامه جدی مبارزه با بیماری مالاریا را می‌توان از سال ۱۳۲۴ با اعزام تعدادی از پزشکان وزارت بهداشتی و ارتش به خرم‌آباد برای طی دوره آموزشی روش‌های مقابله با بیماری مالاریا (مبارزه بالارو و دارودرمانی) دانست که منجر به اجرای برنامه مبارزه در شهرهای شیراز، اصفهان، کرمانشاه، سنندج، بوشهر و شمیران در سال ۱۳۲۵ گردید و برای اولین بار در سال ۱۳۲۶، سم پاشی روستای مامازان ورامین به طور آزمایشی با محلول نفتی ددت انجام شد و سپس در سال

۱۳۲۸، مناطقی از بلوچستان مورد سم پاشی قرار گرفت. به دلیل نتایج مطلوبی که در نتیجه سم پاشی در زمینه کاهش شدت بیماری به دست آمد و به منظور گسترش برنامه‌های مبارزه با بیماری مالاریا، در سال ۱۳۲۸ اداره مبارزه با بیماری مالاریا در وزارت بهداشتی تاسیس شد که منجر به اجرای برنامه عمومی مبارزه با مالاریا از سال ۱۳۲۹ تا سال ۱۳۳۶ به مدت ۷ سال و با هدف بررسی حشره‌شناسی، عملیات سم پاشی و عملیات مراقبت در سطح کشور گردید و در نهایت به توصیه سازمان جهانی بهداشت و با تصویب دولت وقت، برنامه ریشه کنی بیماری مالاریا از سال ۱۳۳۶ در سطح کشور رسماً آغاز شد (۹).

این برنامه از سال ۱۳۳۶ در بخشی از مناطق کشور و با هدف خاتمه دادن به انتقال مالاریا، پاک کردن مناطق آلوده و در نهایت از بین بردن کامل عامل بیماری در کشور (ریشه کن کردن بیماری) در مدت زمان محدود و طی ۴ مرحله شامل مراحل آمادگی، حمله، استحکام و نگهداری طراحی و از طریق سمپاشی مکان‌های استراحت آنوفل، از بین بردن محل‌های تخم‌ریزی آن، بیماریابی، درمان بیماران و سایر اقدامات موثر از سال ۱۳۳۶ در بخشی از مناطق کشور شروع گردید و قرار بود در طی سال‌های بعد و براساس برنامه ریزی صورت گرفته، کل مناطق کشور تحت پوشش برنامه قرار گیرد و در نهایت در پایان برنامه، بیماری در کشور به طور کامل ریشه کن شود. ولی به دلایل مختلف، منجمله مقاومت ناقلین به حشره کش‌ها که با مقاومت آنوفل استفنسی (ناقل مهم مناطق جنوبی کشور) به ددت (در اواخر همان سال اول اجرای برنامه) شروع و به تدریج در برابر سایر حشره کش‌ها تداوم یافت. برنامه ریشه کنی، علی‌رغم کاهش چشمگیر بیماری در کشور، نتوانست به هدف نهایی خود یعنی از بین بردن کامل بیماری دست یابد (۷، ۱۰) که این موضوع در سال ۱۳۴۶ منجر به تغییر برنامه ریشه کنی به برنامه کنترل شد. در سال ۱۳۸۵، دولت جمهوری اسلامی

ایران برنامه حذف مالاریا را به منظور حذف بیماری تا سال ۲۰۲۵ میلادی تصویب و به مرحله اجرا گذاشت (۱۱). متأسفانه چالش مهم مقاومت تا به امروز، علی‌رغم تولید و ساخت حشره کش‌های جدید و موثر، به دلیل توسعه مکانیسم‌های مقاومت در ناقلین، هم‌چنان گریبانگیر اکثر برنامه‌های مبارزه با بیماری مالاریا در سراسر دنیا می‌باشد.

#### مقاومت به حشره کش‌ها و مکانیسم‌های آن

مقاومت عبارت است از افزایش توانایی رویارویی یک گونه خاص از حشره در هر مرحله از چرخه زندگی در برابر میزان دوزی از حشره کش که در حالت طبیعی و شرایط معمول آن گونه را از بین می‌برد (۱۲). در نوعی دیگری از مقاومت، ممکن است حشره‌ای به واسطه مقاومت به یک نوع حشره کش، به نوع دیگری از حشره کش که تاکنون در معرض تماس با آن قرار نگرفته است، نیز مقاومت نشان دهد که به آن مقاومت متقاطع (Cross resistance) می‌گویند. تشابهات موجود بین سموم آلی کلره و پیرتروئیدها (خصوصاً از نظر مکانیسم اثر) موجب افزایش احتمال وجود مقاومت متقاطع بین این دو گروه از حشره کش‌ها گردیده است. هرچند در مطالعه ای که در زمینه بررسی مقاومت آنوفل استفنسی در جنوب ایران انجام شد، ارتباطی بین مقاومت به د.د.ت و پیرتروئیدها مشاهده نگردید (۱۳، ۱۴)، ولی در مطالعه دیگری که در زمینه بررسی مقاومت آنوفل استفنسی جنوب ایران به مالاتیون و احتمال مقاومت متقاطع آن با پیریمیفسوس متیل (اکتلیک) انجام شد، وجود این نوع مقاومت گزارش گردید (۱۲، ۱۵). به طور کلی، مکانیسم‌های مقاومت در حشرات به چهار دسته ذیل تقسیم می‌شوند:

الف- مکانیسم‌های بیوشیمیایی: این مکانیسم‌ها در نتیجه دخالت آنزیم‌های متابولیزه کننده خصوصاً اکسیدازها، استرازها و گلوکوتایون اس ترانسفرازها در بدن حشرات ایجاد می‌شود که طی آن با افزایش مقدار

این آنزیم‌ها در بدن حشرات یا افزایش فعالیت آن‌ها، مولکول حشره‌کش در بدن حشره خنثی و بی اثر می‌شود (۱۶) که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

۱- اکسیدازها: بیش از ۱۰۰ نوع از این آنزیم‌ها در بدن حشرات شناسایی شده‌اند که با اکسیداسیون بر روی مولکول حشره‌کش، باعث اکسیده شدن حشره‌کش و در نتیجه خنثی شدن آن شوند (۱۷،۱۲).

۲- استرازاها: این آنزیم‌ها باعث تجزیه ترکیبات دارای پیوند استری می‌شوند. اغلب حشره‌کش‌ها، خصوصاً انواع فسفره‌ها، کاربامات‌ها و پیروتریئیدها، توسط این آنزیم‌ها تجزیه و خنثی می‌شوند و در نتیجه مقاومت به آنها ایجاد می‌گردد. این مقاومت یا به وسیله افزایش شدت فعالیت آنزیم صورت می‌پذیرد و یا از طریق کاهش سرعت آزادسازی مولکول حشره‌کش مهار شده توسط آنزیم آنزیم اتفاق می‌افتد. مورد اخیر که به آن مقاومت از نوع sequestration می‌گویند، توسط پدیده پیچیده‌تر دیگری به نام gene amplification که عبارت است از افزایش در تعداد کپی نسخه‌های ژن مربوط به تولید آنزیم استرازا، رخ می‌دهد (۱۲).

۳- گلوکوتاتیون-اس-ترانسفرازها: تاکنون بیش از ۱۰۰ ژن مربوط به این آنزیم‌ها در بدن حشرات شناسایی شده‌اند. این آنزیم‌ها در بافت‌های مختلف و در مراحل گوناگون حشرات به مقادیر متفاوت وجود دارند که ترکیبات چربی دوست مانند حشره‌کش‌ها را با گلوکوتاتیون که آب دوست می‌باشد، ترکیب و مهار نموده و سپس از طریق سیستم ادراری، دفع می‌نمایند (۱۲، ۱۸، ۱۹).

ب- مکانیسم‌های مربوط به تغییر محل هدف حشره‌کش: در این نوع مکانیسم‌ها، حشرات با تغییر محل اثر حشره‌کش در بدن خود، مانع اثر حشره‌کش و در نتیجه بروز مقاومت می‌شوند که شامل موارد ذیل می‌باشد:

۱- Knockdown Resistance (KDR): در این نوع مقاومت، در ژن پروتئین کانال سدیمی اکسون‌های سلول‌های عصبی که محل اثر حشره‌کش‌هایی مانند ددت و انواع پیرتروئیدها می‌باشد، به دلیل موتاسیون‌های

نقطه‌ای، تغییری اتفاق می‌افتد و در نتیجه این پروتئین، حساسیت خود را نسبت به مولکول حشره‌کش از دست داده و در برابر حشره‌کش‌ها، مقاوم می‌شود (۱۲، ۲۰، ۲۱).

۲-GABA (Gamma-aminobutyric acid): در این نوع مکانیسم، تغییر در ژن کانال کلر سلول‌های عصبی که محل اثر حشره‌کش‌هایی مانند لیندین، دیلدترین، اندرین، اندوسولفان و غیره می‌باشد، اتفاق می‌افتد و در نتیجه منجر به مقاومت به این نوع حشره‌کش‌ها می‌گردد (۱۲).

۳-Altered Acetylcholinesterase (AChE): در این نوع مقاومت، در اثر موتاسیون‌های نقطه‌ای ایجاد شده در ژن آنزیم استیل کولین استراز که محل اثر حشره‌کش‌های فسفره و کاربامات‌ها می‌باشد، تغییراتی ایجاد می‌شود که منجر به از بین رفتن حساسیت و ایجاد مقاومت در مقابل حشره‌کش‌های فوق می‌گردد (۱۲، ۲۲).

ج- مکانیسم‌های رفتاری: در این نوع مقاومت، حشرات تحت تاثیر فشار ناشی از حشره‌کش‌ها در درازمدت، رفتارهای خونخواری و استراحت خویش را تغییر داده و بدین ترتیب خود را در مقابل حشره‌کش‌ها محافظت می‌نمایند (۱۲).

د- مکانیسم‌های کاهش نفوذ حشره‌کش به بدن و افزایش دفع آن: این نوع مقاومت در اثر تغییرات ایجاد شده در جلد بدن حشرات که باعث کاهش ضریب جذب حشره‌کش به بدن و از سوی دیگر با افزایش دفع حشره‌کش‌ها از بدن که با افزایش نقش آفرینی آنزیم‌های متابولیزه‌کننده‌ای مانند گلوکوتاتیون-اس-ترانسفرازها همراه می‌باشد، اتفاق می‌افتد (۱۲).

#### روش‌های تشخیص مقاومت

شناسایی و تشخیص مقاومت حشرات در برابر حشره‌کش‌ها با روش‌های مختلفی انجام می‌شود که براساس نوع حشره، دوره زندگی آن، مکانیسم احتمالی مقاومت و روش‌های مورد استفاده، متفاوت می‌باشد.

این روش‌ها به ۳ دسته ذیل تقسیم می‌شوند:

۱- روش‌های کلاسیک: پایه و اساس این روش‌ها را تست‌های حساسیت (Bioassay) تشکیل می‌دهد. برای انجام این تست‌ها، کیت‌های مختلفی وجود دارد که مهم‌ترین و معتبرترین آن‌ها، کیت‌های استاندارد سازمان جهانی بهداشت می‌باشد. یکی از این کیت‌ها، کیت زیست‌سنجی پشه‌های بالغ می‌باشد که حاوی دو نوع لوله استوانه‌ای به رنگ سبز (برای نگهداری پشه‌ها) و رنگ قرمز (برای تماس پشه‌ها با کاغذهای آغشته به حشره‌کش) می‌باشد. در این روش، ۱۰۰ پشه هم‌سن، هم‌جنس و تغذیه شده با آب قند را در ۴ لوله حاوی کاغذ آغشته به حشره‌کش با دوزهای مشخص وارد نموده (در هر لوله ۲۵ پشه)، به مدت زمان تعیین شده تماس داده و سپس نتایج مرگ و میر را قرائت می‌نمایند. هم‌چنین ۱۰۰ پشه دیگر را نیز در دو لوله به عنوان شاهد در نظر می‌گیرند. نتایج به دست آمده را با روش‌های آماری (پروبیوت) مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهند (۱۲، ۲۳). کاربرد این روش برای تشخیص وجود یا عدم وجود مقاومت در پشه مورد نظر می‌باشد ولی مکانیسم مقاومت به کمک این روش قابل شناسایی نخواهد بود. یکی دیگر از روش‌های کلاسیک تشخیص مقاومت، تست سینرژیک می‌باشد که تا حدودی با کمک این روش می‌توان مکانیسم مقاومت را نیز حدس زد. سینرژیک‌ها، مواد کمکی هستند که برای مهار آنزیم‌های متابولیزه‌کننده حشره‌کش‌ها و در نتیجه افزایش قدرت کشندگی حشره‌کش به آن‌ها اضافه می‌شوند. در این روش، حشره مورد نظر را ابتدا با حشره‌کش فاقد سینرژیک تماس داده و مرگ و میر حاصل را شمارش می‌کنند و سپس با حشره‌کش حاوی سینرژیک مشخص، تماس داده و مرگ و میر حاصل را محاسبه نموده و نتایج را آنالیز پروبیوت نموده و در نهایت اگر چنانچه شاخص خط رگرسیون مربوط به تست حشره‌کش به اضافه سینرژیک با خط رگرسیون مربوط به تست حشره‌کش تنها در سوش حساس و مقاوم اختلاف آماری معنی‌داری داشته باشد، می‌توان

نتیجه گرفت که ماده سینرژیک به کار رفته در کاهش یا سرکوب مقاومت نقش داشته است و به عبارتی با این تست می‌توان با در نظر گرفتن نوع ماده سینرژیک به کار رفته تا حدود زیادی مکانیسم مقاومت حشره را شناسایی نمود (۱۲).

۲- روش‌های بیوشیمیایی: در این روش‌ها با استفاده از تست‌های دقیق بیوشیمیایی طراحی شده، نسبت به اندازه‌گیری آنزیم‌های مختلف مسئول مقاومت در بدن حشرات اقدام می‌گردد. امروزه این تست‌ها در میکروتیترپلیت و از طریق دستگاه میکروتیترپلیت ریدر انجام می‌شود که مهم‌ترین آن‌ها شامل تست‌های منواکسیژنازها، استرازاها، گلوکوتایون اس ترانسفراز و استیل کولین استراز می‌باشد (۱۲، ۲۴، ۲۵، ۲۶).

۳- روش‌های بیولوژی مولکولی: با استفاده از این روش‌ها، تغییرات مولکولی و نیز بیان ژن اتفاق در بدن حشرات که منجر به پیدایش مقاومت می‌شود را شناسایی می‌نمایند. کاربرد این روش‌ها بیش‌تر برای تشخیص مقاومت از نوع تغییر محل اثر می‌باشد که مهم‌ترین آن‌ها شامل Polymerase Chain Reaction (PCR) و Micro Array می‌باشد (۱۲).

بروز و ظهور مقاومت در ناقلین در برابر حشره‌کش‌های نسل‌های قدیم و جدید، یکی از مهم‌ترین مشکلات سر راه برنامه‌های مبارزه با بیماری مالاریا خصوصاً در مناطق مالاریا خیز سراسر دنیا می‌باشد (۲۷). در ایران نیز مقاومت در برابر حشره‌کش‌ها از همان سال آغاز برنامه ریشه‌کنی بیماری مالاریا، پدید آمد و این مقاومت شاید با تغییر حشره‌کش‌ها در مقطع محدودی از زمان کم‌رنگ می‌گردید، ولی مجدداً با تغییر مکانیسم مقاومت توسط ناقلین، مجدداً تبدیل به یک مشکل اساسی می‌شد. در حال حاضر، مالاریا اکثراً در مناطق جنوب و جنوب شرقی ایران شامل استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان و مواردی هم در کانون‌های شمالی کشور (مناطق مرزی ایران و جمهوری آذربایجان) شامل استان‌های گیلان، اردبیل، آذربایجان شرقی و آذربایجان

تاریخچه مبارزه با بیماری، برنامه‌ریزی، پشه‌های آنوفل، مقاومت، حشره‌کش‌ها، مقاومت آنوفل‌ها در ایران منتشر شده بود، جمع‌آوری گردید. منابع و مقالات غیرمرتبط حذف و منابع مرتبط با مالاریا، آنوفل و مقاومت مطالعه شد. در نهایت تعداد ۶۰ مقاله و منبع علمی با در نظر گرفتن هدف مطالعه و با توجه به نیاز انتخاب و مورد نقد، تفسیر، تجزیه و تحلیل قرار گرفت (تصویر شماره ۱).

## یافته‌ها


در ایران تاکنون ۲۴ گونه آنوفل تعیین هویت و ۸ گونه ذیل به عنوان ناقلین قطعی مالاریا معرفی شده‌اند (۲):

### 1- *Anopheles stephensi* (*A. stephensi*)


غربی انتشار دارد (۸). در این مقاله با بررسی متون و تحقیقات انجام شده از سال ۱۳۰۰ تاکنون به بررسی مقاومت آنوفل‌های ایران در برابر حشره‌کش‌ها پرداخته شده است.

## مواد و روش‌ها


در این مطالعه که به روش مروری انجام شد، با استفاده از کلمات کلیدی شامل: آنوفل، مالاریا، مقاومت، ناقلین، حشره‌کش و مکانیسم با جستجو در اینترنت و سایت‌های مرتبط با مجلات معتبر پزشکی و بهداشتی شامل Google Scholar، PubMed، SID، WHO تعداد ۱۶۰ منبع علمی شامل کتاب، مقالات، پایان‌نامه‌ها و گزارشاتی که طی سال‌های ۱۳۰۰ تا سال ۱۳۹۴ به زبان‌های فارسی و انگلیسی در زمینه مالاریا،




تصویر شماره ۱: فلوجارت جستجو و انتخاب مقالات



تصویر شماره ۳: نقشه پراکندگی آنوفل ساکارووی



تصویر شماره ۴: نقشه پراکندگی آنوفل استفنسی



تصویر شماره ۵: نقشه پراکندگی آنوفل کولیسیفاسیس

- 2-*Anopheles culicifacies* (*A. culicifacies*)
- 3-*Anopheles fluviatilis* (*A. fluviatilis*)
- 4-*Anopheles superpictus* (*A. superpictus*)
- 5-*Anopheles dthali* (*A. dthali*)
- 6-*Anopheles sacharovi* (*A. sacharovi*)
- 7-*Anopheles maculipennis s.l.* (*A. maculipennis*)
- 8-*Anopheles pulcherrimus*. (*A. pulcherrimus*)


انتشار گونه‌های ناقل در نقاط مختلف ایران متفاوت

و به شرح ذیل می باشد:

۱- *A. Maculipennis*: این گونه از استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان بزرگ، اصفهان، فارس، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، کردستان، زنجان، شهرستان ایذه در استان خوزستان و شمال تهران گزارش گردیده است و ناقل اصلی در استان‌های شمالی کشور معرفی شده است (۲).


۲- *A. Sacharovi*: این آنوفل، ناقل مهم استان‌های شمالی کشور و بخش‌هایی از استان فارس می باشد (۲).

۳- *A. Stephensi*: گونه غالب و ناقل اصلی مناطق جنوب و جنوب شرقی ایران خصوصاً استان هرمزگان می باشد و در استان‌های سیستان و بلوچستان، بوشهر، کرمان، فارس، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، ایلام و جنوب کرمانشاه نیز وفور و انتشار دارد (۲).



تصویر شماره ۲: نقشه پراکندگی آنوفل ماکولی پنیس





تصویر شماره ۹: نقشه پراکنندگی آنوفل پولکریموس


۴- *A. Culicifacies*: پراکنندگی این گونه در سیستان و بلوچستان، جنوب خراسان، جنوب کرمان، فارس و تا حدودی در استان هرمزگان مشاهده شده است و به عنوان ناقل اصلی بیماری مالاریا در شمال و جنوب استان سیستان و بلوچستان مطرح می‌باشد (۲).

۵- *A. dthali*: بیش‌ترین وفور این گونه در مناطق جنوبی کوه زاگرس در محدوده سیستان و بلوچستان، کرمان، فارس، خوزستان و استان کرمانشاه می‌باشد و گزارشاتی مبنی بر حضور این آنوفل در یزد، محلات، همدان، طبرس و اصفهان نیز وجود دارد (۲).


۶- *A. Fluviatilis*: حضور این گونه در مناطق جنوبی از جمله سیستان و بلوچستان، کرمان، خوزستان و فارس مشاهده می‌شود و به عنوان ناقل مالاریای نیمه پایدار در کشور معرفی شده است (۲).

۷- *A. Superpictus*: پراکنندگی این ناقل در فلات مرکزی، مناطق کوهستانی شمال و مناطق تپه‌ای جنوب کشور شامل مناطقی از سیستان و بلوچستان، بندرعباس، بشاگرد، جیرفت، تبریز، همدان، ایلام، ایوان غرب، تهران، ورامین، فردوس، سبزواری، مشهد، نهبوند و برازجان گزارش شده است (۲).


۸- *A. Pulcherrimus*: این آنوفل از استان‌های چهارمحال و بختیاری، فارس، گلستان، هرمزگان، ایلام، کرمانشاه، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، مازندران، خراسان شمالی و سیستان و بلوچستان گزارش شده است (۴).



تصویر شماره ۶: نقشه پراکنندگی آنوفل دتالی



تصویر شماره ۷: نقشه پراکنندگی آنوفل فلوویاتلیس



تصویر شماره ۸: نقشه پراکنندگی آنوفل سوپریکتوس

هر چند برنامه‌های مبارزه با ناقلین که در صده اخیر در کشور اجرا شد، انتشار بیماری مالاریا در کشور را محدود نمود، ولی به دلایل مختلفی این بیماری در ایران ریشه کن نگردید و در حال حاضر هر ساله در مناطقی از جنوب و جنوب شرق کشور (خصوصاً استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان) مواردی از بیماری مالاریا مشاهده می‌شود (۲۸).

#### ۱- بررسی مقاومت آنوفل استفسنی

یکی از مهم‌ترین دلایل عدم موفقیت برنامه ریشه کنی مالاریا در ایران، بروز مقاومت ناقلین در برابر حشره کش‌های موثر می‌باشد (۲۹). پدیده مقاومت در برابر حشره کش‌ها، از اواخر سال ۱۳۳۶ یعنی همان سال آغازین برنامه ریشه کنی مالاریا در ایران، با بروز مقاومت آنوفل استفسنی در برابر حشره کش ددت در مناطق جنوبی کشور شامل استان‌های فارس، خوزستان و کرمان آغاز گردید. بررسی‌ها و مطالعات صورت گرفته در سال‌های بعد نشان داد که افزایش فعالیت آنزیم گلوکاتیون-اس-ترانسفراز در بدن آنوفل استفسنی، عامل اصلی مقاومت نسبت به ددت بوده است (۳۰). بروز مقاومت در برابر ددت و از طرف دیگر بروز اپیدمی بیماری مالاریا در بعضی از مناطق جنوبی کشور مانند آبادان، شادگان، بهبهان، بوشهر، بندرلنگه و بندرعباس سبب شد تا با نظر کارشناسان ایرانی و کارشناسان سازمان جهانی بهداشت، در مناطق جنوبی کشور، حشره کش دیلدرین، جایگزین حشره کش ددت گردد، ولی متأسفانه سه سال بعد از کاربرد دیلدرین، در سال ۱۳۳۹، مواردی از مقاومت به دیلدرین در مناطق تحت سم پاشی این حشره کش مشاهده گردید و آنوفل استفسنی به دیلدرین نیز مقاومت نشان داد (۳۱، ۱۰). در مطالعات و بررسی‌های انجام شده در سال‌های بعد مشخص شد که مقاومت آنوفل استفسنی در مقابل دیلدرین، از نوع تغییر محل اثر GABA می‌باشد. بروز مقاومت جدید، استراتژی‌های برنامه ریشه کنی بیماری مالاریا را دچار مشکل نمود، تا

این که شورای عالی بیماری مالاریا مجبور شد در سال ۱۳۴۰ در استراتژی‌های برنامه ریشه کنی تجدید نظر نموده و در برنامه ریزی جدید مناطق کشور که در برنامه اول به ۴ منطقه تقسیم شده بودند، را به ۳ منطقه ذیل تقسیم نماید (۳۲، ۳۳):

۱- مناطق دارای آنوفل حساس به حشره کش ددت: این مناطق شامل استان‌های گیلان، مازندران، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خراسان، استان مرکزی، شمال استان‌های همدان، کرمانشاه، اصفهان و کرمان بودند که سم‌پاشی با ددت، هم‌چنان یکی از استراتژی‌های به کار رفته در این مناطق بود (۳۳).

۲- مناطق دارای آنوفل حساس به ددت ولی دارای مشکل: این گروه شامل مناطق جنوبی کرمانشاه، اصفهان، همدان و شمال استان‌های خوزستان و سیستان و بلوچستان بودند که هنوز پدیده مقاومت بروز مقاومت به حشره کش‌های ددت و دیلدرین، این سموم فاقد اثر کافی بر علیه ناقل بودند و لذا عملاً سم پاشی در این مناطق متوقف گردید و فقط از اقدامات درمانی آن هم به صورت پراکنده برای مبارزه با بیماری استفاده می‌شد (۳۳).

۳- مناطق دارای آنوفل غیر حساس به ددت و حشره کش‌های آلی کلره: در این مناطق که شامل استان‌های خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، هرمزگان و بوشهر بود، به دلیل بروز مقاومت حشره کش‌های ددت و دیلدرین، دیگر اثر کافی را نداشت، لذا عملاً سم پاشی در این مناطق متوقف گردید و فقط از اقدامات درمانی آن هم به صورت پراکنده برای مبارزه با بیماری استفاده می‌شد (۱۴).

بین سال‌های ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۷، برنامه مبارزه با مالاریا معطوف به سم‌پاشی با حشره کش ددت و سایر اقدامات مراقبتی در مناطق حساس و اقدامات درمانی بدون سم پاشی در مناطق غیر حساس بود. از طرف دیگر، مطالعات و بررسی‌های گسترده‌ای برای یافتن حشره کش موثر برای مبارزه با ناقل بیماری در مناطق غیر حساس، توسط کارشناسان سازمان ریشه کنی مالاریا و ایستگاه‌های

بر اساس مطالعات انجام شده در سال‌های اخیر در سایر نقاط ایران، آنوفل استفسنی به ۳ حشره کش ددت، دیلدرین و مالاتیون مقاوم و یا متحمل می‌باشد (۱۳) و عملاً حشره کش‌های فوق در بیش تر قسمت‌های ایران علیه این ناقل کارایی لازم را از دست داده است، ولی با مطالعات و بررسی‌های صورت گرفته در بیش تر قسمت‌های جنوبی ایران و سایر نقاط مالاریاخیز، حساسیت آنوفل استفسنی به حشره کش دلتامترین و بندپوکارب به اثبات رسیده است و خوشبختانه در حال حاضر حشره کش دلتامترین در بیش تر نقاط مالاریاخیز ایران هنوز علیه آنوفل استفسنی از کارایی لازم برخوردار می‌باشد (۳۸). موید این موضوع، مطالعه‌ای است که سال ۲۰۱۰ در چابهار در جنوب استان سیستان و بلوچستان در خصوص بررسی وضعیت بیماری مالاریا و سنجش حساسیت ناقلین این منطقه نسبت به حشره کش‌ها انجام گردید و حساسیت آنوفل استفسنی به حشره کش دلتامترین را تایید نمود و مشخص گردید که حشره کش فوق علیه این ناقل هنوز از کارایی لازم و قابل قبول برخوردار است (۳۹). هر چند که در مطالعات سال‌های اخیر استان هرمزگان، نشانه‌هایی مبنی بر این که آنوفل استفسنی در مناطق بشاگرد و سیاهو در برابر حشره کش دلتامترین به سمت مقاومت پیش می‌رود، نیز گزارش شده است. هم چنین در سایر نقاط دنیا مانند هند نیز گزارشاتی مبنی بر مقاومت آنوفل استفسنی به حشره کش‌های پایروتروئیدها منتشر شده است (۴۱، ۴۲، ۴۰) که این می‌تواند هشدار برای مسئولین و برنامه ریزان برنامه حذف بیماری مالاریا در کشور محسوب گردد (جدول شماره ۱).

انستیتو تحقیقات بهداشت در حال انجام بود. در مهرماه سال ۱۳۴۳، سم پاشی شهرستان بندرعباس با مالاتیون آغاز گردید تا این که بعد از کسب نتایج مطلوب و قابل قبول، در نهایت در سال ۱۳۴۷، حشره کش مالاتیون به عنوان حشره کش موثر برای مناطق غیر حساس انتخاب گردید و عملیات سم پاشی در این مناطق با استفاده از حشره کش‌های مالاتیون (برای آنوفل استفسنی) و ددت (برای سایر آنوفل‌های ناقل) به صورت متناوب انجام گردید و نتایج خیلی خوب و قابل قبولی در زمینه کاهش موارد بیماری مالاریا در این مناطق به دست آمد (۳۴، ۳۳، ۳۹). استفاده از مالاتیون تا سال ۱۳۵۶، در مناطق جنوبی ادامه داشت تا این که مقاومت آنوفل استفسنی به مالاتیون در سال ۱۳۵۶ در بندرعباس اتفاق افتاد. با مطالعات صورت گرفته در زمینه بررسی مکانیسم مقاومت، استرازاها به عنوان عامل اصلی و اکسیدازها به عنوان عامل کمکی در بروز مقاومت آنوفل استفسنی به مالاتیون معرفی شدند (۳۵). به دنبال بروز مقاومت، حشره کش پروپوکسور (بایگون)، جایگزین مالاتیون در بندرعباس و میناب گردید. استفاده از حشره کش پروپوکسور تا سال ۱۳۷۵ در مناطق جنوبی ادامه داشت. در سال ۱۳۷۳ با سم پاشی ۶۰ درصد از مناطق استان هرمزگان با حشره کش لامبداسی هالوترین، این حشره کش مورد آزمایش قرار گرفت و به دلیل نتایج قابل قبول، در نهایت در نیمه دوم سال ۱۳۷۵، پروپوکسور از برنامه مبارزه با مالاریای بندرعباس حذف و حشره کش لامبداسی هالوترین جایگزین پروپوکسور گردید (۳۵). سم پاشی این مناطق با حشره کش لامبداسی هالوترین به مدت ۶ سال ادامه یافت تا این که در سال ۱۳۸۱، دلتامترین جایگزین حشره کش لامبداسی هالوترین گردید (۱۹، ۱۸).

جدول شماره ۱: لیست حشره کش‌های مورد استفاده علیه آنوفل استفسنی جنوب ایران از سال ۱۳۳۶

ردیف	حشره کش	نوع حشره کش	سال شروع	سال مقاومت	حشره کش جایگزین	مکانیسم مقاومت	رفرنس
۱	ددت	آلی کلره	۱۳۳۶	۱۳۳۶	دیلدرین	افزایش فعالیت آتریم گلاتاتون اس ترانسفراز	(۲۲)
۲	دیلدرین	آلی کلره	۱۳۳۷	۱۳۳۹	مالاتیون	تغییر در گیرنده GABA	(۱۴)
۳	مالاتیون	آلی فسفره	۱۳۴۷	۱۳۵۶	پروپوکسور	استرازاها	(۱۷)
۴	پروپوکسور	کاربنامات	۱۳۵۶	-	لامبداسی هالوترین		(۳۵)
۵	لامبداسی هالوترین	پیروتروئید	۱۳۷۵	-	دلتامترین		(۳۶، ۳۷)
۶	دلتامترین	پیروتروئید	۱۳۸۱	-			

## ۲- بررسی مقاومت آنوفل ماکولی پنیس

اولین گزارش در خصوص مقاومت این ناقل بوسیله منوچهری و همکاران در سال ۱۹۷۶ انجام شد. بر اساس این گزارش استفاده از حشره کش ددت در مزارع پنبه در شمال ایران منجر به بروز مقاومت به حشره کش مذکور در آنوفل ماکولی پنیس گردید (۴۳). مجدداً در مطالعه‌ای که در سال ۲۰۱۳ توسط چاوشین و همکارانش در آذربایجان غربی انجام گردید، سطح حساسیت آنوفل ماکولی پنیس نسبت به شش حشره کش از چهار گروه اصلی شامل پرمترین و دلتامترین از گروه پایروثروئیدها، پروپوکسور و بندیوکارب از گروه کاربامات‌ها، مالاتیون از ارگانوفسفره و دیلدیرین از گروه ارگانوکلره مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت که نتایج به دست آمده حاکی از پیش رفتن به سمت مقاومت این ناقل به سه حشره کش پرمترین، دلتامترین و دیلدیرین و مقاومت به سه حشره کش پروپوکسور، بندیوکارب و مالاتیون می‌باشد (۴۴).

## ۳- بررسی مقاومت آنوفل فلویاتلیس

طی مطالعات و بررسی‌های صورت گرفته در استان هرمزگان در سال ۱۳۶۱، آنوفل فلویاتلیس برخلاف آنوفل استفسنی، نسبت به سموم ددت، دیلدیرین و مالاتیون حساس بوده است (۴۵). همچنین عدالت و همکاران در مطالعاتی که در سال ۱۳۷۸ انجام دادند، گزارش کردند که آنوفل فلویاتلیس نسبت به حشره کش‌های ددت، دیلدیرین، مالاتیون، پروپوکسور، پرمترین و لامبداسی هالوترین کاملاً حساس می‌باشد، به طوری که یک ساعت تماس موجب مرگ و میر ۱۰۰ درصد آن‌ها می‌شود (۴۶). در ادامه این بررسی‌ها، در سال ۱۳۸۲ شاهی و همکاران، مطالعه‌ای در شهرستان بندرعباس انجام دادند که موید حساسیت آنوفل فلویاتلیس نسبت به حشره کش‌های ددت، دیلدیرین، مالاتیون، فنیترون، پروپوکسور، بندیوکارب، پرمترین، دلتامترین و سیفلوترین بود. خوشبختانه در حال حاضر این ناقل نسبت به کلیه

حشره کش‌های مصرف شده در برنامه مبارزه با مالاریا در ایران حساس بوده و تاکنون هیچ‌گونه گزارشی مبنی بر وجود مقاومت در آنوفل فلویاتلیس ایران به حشره کش‌ها ارائه نشده است (۴۷).

## ۴- بررسی مقاومت آنوفل سوپریکتوس:

مطالعات و بررسی‌ها در خصوص وضعیت حساسیت این ناقل در ایران با انجام مطالعه‌ای در سال ۱۳۶۱ در استان هرمزگان شروع شد. در این مطالعه حساسیت آنوفل سوپریکتوس نسبت به سموم ددت، دیلدیرین و مالاتیون نشان داده شد (۴۵). مطالعه‌ای دیگری در سال ۱۳۷۹ در استان ایلام نشان داد که آنوفل سوپریکتوس نسبت به ددت، مالاتیون و لامبداسی هالوترین حساس می‌باشد (۴۸).

## ۵- بررسی مقاومت آنوفل دتالی:

در سال ۱۳۶۱ در استان هرمزگان مطالعه‌ای انجام شد که نشان داد آنوفل دتالی نسبت به سموم ددت، دیلدیرین و مالاتیون حساس بوده است (۴۵). در ادامه این بررسی‌ها، مطالعه‌ای در سال ۲۰۱۰، در چابهار در جنوب استان سیستان و بلوچستان در خصوص بررسی وضعیت بیماری مالاریا و سنجش حساسیت ناقلین منطقه نسبت به حشره کش‌ها انجام گردید و نتایجی که به دست آمد حاکی از این بود که این ناقل نسبت به ددت مقاوم، به دلتامترین حساس و به بقیه سموم شامل مالاتیون، پروپوکسور، لامبداسی هالوترین و سی فلوترین به سمت مقاومت پیش می‌رود (۳۹). مشابه این مطالعه در همان سال (۲۰۱۰) در بشاگرد هرمزگان در جنوب ایران انجام شد و مشخص شد که این ناقل نسبت به حشره کش‌های ددت، بندیوکارب و پروپوکسور حساس، ولی نسبت به حشره کش‌های مالاتیون و دلتامترین به سمت مقاومت پیش می‌رود (۴۰).

## ۶- بررسی مقاومت آنوفل ساکارووی:

مطالعات صورت گرفته در زمینه بررسی سطح

جدول شماره ۲: نتایج حاصل از بررسی مقاومت آنوفل های ناقل بیماری مالاریا نسبت به حشره کش ها در ایران-۱۳۹۴

Species	DDT	Dieldrin*	Malathion	Deltamethrin
An. stephensi	مقاوم	مقاوم	مقاوم	به سمت مقاومت
An. maculipennis	مقاوم	به سمت مقاومت	مقاوم	به سمت مقاومت
An. sacharovi	حساس	حساس	حساس	حساس
An. dthali	مقاوم	حساس	به سمت مقاومت	به سمت مقاومت
An. culicifacies	مقاوم	حساس	حساس	به سمت مقاومت
An. fluviatilis	حساس	حساس	حساس	حساس
An. superpictus	حساس	حساس	حساس	حساس

از آنجایی که بروز مقاومت در ناقلین، امری اجتناب ناپذیر می باشد، نکته حائز اهمیت به کار بردن استراتژی هایی برای به تاخیر انداختن آن و یا به حداقل رساندن تبعات ناشی از مقاومت می باشد که به طور اختصار به شرح ذیل می باشد (۵۷):

۱- استفاده از روش های مدیریت تلفیقی آفات: در این استراتژی، همزمان از چندین روش کنترل آفات یا ناقلین در یک منطقه استفاده می گردد. این روش سبب کاهش فشار گزینشی ناشی از حشره کش ها و در نتیجه به تعویق افتادن مقاومت می گردد (۵۸، ۱۲).

۲- مدیریت مصرف حشره کش ها: جلوگیری از استفاده غیر ضروری و غیر اصولی (عدم رعایت دوز، زمان و مکان توصیه شده) از حشره کش ها منجر به تأخیر در ایجاد مقاومت در ناقلین خواهد شد (۵۹، ۱۲).

۳- استفاده از روش های سم پاشی چرخشی (تغییر نوع حشره کش مصرفی در منطقه در هر فصل یا سال)، روش مخلوط (استفاده از ترکیب حشره کش های مختلف) و روش موزائیک (استفاده از حشره کش های مختلف در مناطق همجوار) از دیگر روش های مدیریت مقاومت است (۶۰، ۵۹، ۱۲).

۴- استفاده از وسایل سالم و استاندارد سم پاشی و رعایت استانداردهای لازم در هنگام سم پاشی (۱۲).

۵- انجام تست حساسیت قبل و در پایان فصل فعالیت ناقلین (۱۲).

حساسیت پشه های آنوفل ساکارووی در استان فارس در سال ۱۳۷۶ نشان داد که این گونه نسبت به حشره کش های مالاتیون ۵ درصد (آلی فسفره)، فنیتروتیون ۱ درصد (آلی فسفره) و د.د.ت ۴ درصد (آلی کلره) از حساسیت لازم برخوردار می باشد (۴۹).

#### ۴- بررسی مقاومت آنوفل کولیسفاسیس

بر اساس گزارش زعیم در سال ۱۹۸۷، آنوفل کولیسفاسیس نسبت به حشره کش ددت مقاوم ولی نسبت به دیلدترین حساس بوده است (۲۹). در سال ۱۳۷۸ وطن دوست و برهانی، در استان سیستان و بلوچستان سطح حساسیت و تحریک پذیری ناقلین مهم مالاریا را مورد ارزیابی قرار دادند. نتایج نشان داد که گونه آنوفل کولیسفاسیس نسبت به سموم پایروترئیدی تست شده حساس می باشد (۵۰). مشابه این مطالعه، در سال ۲۰۱۰، در چابهار در جنوب استان سیستان و بلوچستان در خصوص بررسی وضعیت بیماری مالاریا و سنجش حساسیت ناقلین منطقه نسبت به حشره کش ها انجام گردید و نتایجی که به دست آمد حاکی از پیش رفتن این ناقل به سمت مقاومت (تحمل) در مقابل سموم ددت، مالاتیون، پروپوکسور و حساسیت آن نسبت به دلتامترین، لامبداسی هالوترین و سی فلوترین می باشد (۵۲، ۵۱). ولی در مطالعه ای که در همان سال (۲۰۱۰) در زمینه بررسی مقاومت آنوفل های منطقه بشاگرد هرمزگان در جنوب ایران انجام شد، نشان داد که آنوفل کولیسفاسیس در این منطقه به کلیه سموم تست شده شامل ددت، بندیوکارب، پروپوکسور، مالاتیون و دلتامترین حساس می باشد (۴۰، ۵۳).

#### بحث

نظریه بررسی های صورت گرفته در خصوص مقاومت ناقلین بیماری مالاریا در ایران، می توان نتایج حاصل از مقاومت را در قالب جدول شماره ۲ ارائه نمود (۵۶، ۵۵، ۵۴).

## References

- Ghavami MB, Medical Entomology for student. Zangan: Zanjan University of Medical Sciences. 1985; p. 43-50.
- Sedaghat MM, Harbach RE. An annotated checklist of the Anopheles mosquitoes (Diptera: Culicidae) in Iran. Journal of Vector Ecology. 2005; 30(2): 272-276.
- World Health Organization. World Malaria Report 2012. Geneva: World Health Organization; 2012.
- Hanafi-Bojd AA, Azari-Hamidian S, Vatandoost H, Charrahy Z. Spatio-temporal distribution of malaria vectors (Diptera: Culicidae) across different climatic zones of Iran. Asian Pacific Journal of Tropical Medicine. 2011; 4(6):498-504.
- Faqyh MA (1955). Malaria identifies and eradication of malaria, Tehran: University of Medical Sci Pub; 1257. (Persian).
- Abu Ali Sina, (401-358). Law in Medicine, translated by Sharafkandi Abdurrahman, Fourth book, Tehran: Soroush; 1991. p. 105.
- Jalali Muslim G. History study and combating malaria of Iran, Institute of Parasitology and Malariology (Up to 1955). University of Thehran (Reports). 1955; p.191 (Persian).
- Nahrovanian H, Asmar M, Reiesi A, Farahmand M, Farzanenejad Z, Arshi SH, et al. Seroparasitological evaluation of Plasmodium vivax malaria and stability of the anti-plasmodial antibodies in Parsabad Ardabil province. Journal of Shahrekord University of Medical Sciences 2009; 11(4): 56-72 (Persian).
- Edrissian G. Review the status of malaria in Iran. Journal of School of Public and Institute of Health Research 2002; 1(1): 50-61.
- Zulueta J, Joliver P. Seasonal variation in susceptibility to DDT of An. maculipennis in Iran. Bulletin of the World Health Organization (WHO) 1957; 16: 475-479.
- Zare'nejad A, Akbari M. Three decades of efforts in the arena of health care system. Published by the Ministry of Health and Medical Education of Iran. 2008; p. 69. (Persian).
- Enayati AA, Askarian F. Pesticides and their application in health publication. Shalfin Publications Assistance Research and Technology Mazandaran University of Medical Sciences (2711) ISBN (131 611 211 11) 2012.
- Gorouhi MA, Vatandoost H, Oshaghi MA, Enayati AA, Mirhendi H, Hanafi Bojd AA, et al. Current susceptibility status of Anopheles stephensi (Diptera: Culicidae) to different imagicides in a malarious area, southeastern Iran. Journal of Arthropod-Borne Diseases 2015; 2322-2271.
- Taji A. Cross resistance to DDT and determining the effects pyrethroid cross resistance in Anopheles stephensi, the main vector of malaria in southern Iran. Isfahan University Research Journal 1989; 9(1-2): 87-94.
- Nadaf Dezfooli SR, Ladonni H. Laboratory selection Anopheles stephensi (strain Bandar Abbas) with Malathion and investigate spectrum crossresistance with Pirimiphos-methyl. Master Thesis. Tehran University of Medical Sciences 1990. (Persian).
- Limoe M, Enayati AA, Ladonni H, Vatandoost H, Baseri MA, Oshaghi MA. Various mechanisms responsible for permethrin metabolic resistance in seven

---

field-collected strains of the German cockroach from Iran, *Blattella germanica* (L.) (Dictyoptera: Blattellidae. *Pesticide Biochemistry and Physiology* 2007; 87(2): 138-146.

17. Enayati AA, Ladonni H. Mixed function oxidases and insecticide resistance in medically important insects. *Journal of Mazandaran University of Medical Sciences* 2006; 16(50): 139-151.
18. Enayati AA, Ranson H, Hemingway J. Insect glutathione transferases and insecticide resistance. *Insect Molecular Biology* 2005; 14(1): 3-8.
19. Enayati AA. Glutathione transferases and insecticide resistance in disease vectors insects. *J Mazandaran University of Medical Sciences* 2005; 15(47): 98-112.
20. Limoe M, Ladonni H, Enayati H, Vatandoost H, Abolhasani M. Detection of pyrethroid resistance and cross-resistance to DDT in seven field-collected strains of the German cockroach, *Blattella germanica* (L.) (Dictyoptera: Blattellidae). *Journal of Biological Sciences* 2006; 6(2): 382-387.
21. Enayati AA, Vatandoost H, Ladonni H, Townson H, Hemingway J. Molecular evidence for a kdr-like pyrethroid resistance mechanism in the malaria vector mosquito *Anopheles stephensi*. *Medical and Veterinary Entomology* 2003; 17(2): 138-144.
22. Soltani A, Vatandoost H, Oshaghi M, Maleki Ravasan N, Enayati AA, Asgarian F. Resistance Mechanisms of *Anopheles stephensi* (Diptera: Culicidae) to temephos. *Journal of Arthropod-Borne Diseases* 2015; 9(1): 71-83.
23. Enayati AA, Ladonni H. Biochemical assay baseline data of permethrin resistance in *Anopheles stephensi* (Diptera, Culicidae) from Iran. *Pakistan Journal of Biological Sciences* 2006; 9(7): 1265-1270.
24. Davari B, Vatandoost H, Oshaghi MA, Enayati AA, Ladonni H, Shaeghi M. Biochemical analyses of insecticides resistance in *Anopheles stephensi* in Iran. *Tropical Medicine and International Health* 2007; 12: 248-249.
25. Davari B, Vatandoost H, Oshaghi MA, Ladonni H, Enayati AA, Shaeghi M, et al. Selection of *Anopheles stephensi* with DDT and dieldrin and cross-resistance spectrum to pyrethroids and fipronil. *Pesticide Biochemistry and Physiology* 2007; 89(2): 97-103.
26. Enayati AA, Motevalli Haghi F. Biochemistry of pyrethroid resistance in German cockroach (Dictyoptera, Blattellidae) from hospitals of Sari, Iran. *Iranian Biomedical Journal* 2007; 11(4): 251-258.
27. Enayati AA, Hemingway J. Malaria management: past, present, and future. *Annual Review of Entomology* 2010; 55: 569-591.
28. Amani H, Yagobi Ershadi M, Kachiri H. Fauna, Abundance, Distribution and Seasonal Activity of *Anopheles* Mosquitoes (Diptera: Culicidae) in larval habitats Aligoudarz city, West of Iran. *Hormozgan Medical Journal* 2013; 17(2): 133-143.
29. Zaim M. Malaria control in Iran-present and future. *Journal of the American Mosquito Control Association* 1987; 3(3): 392-396.
30. Enayati AA. Cross resistance between DDT and permethrin in *Anophles stephensi* from Iran. Master Thesis. Tarbiat Modarress University, Faculty of Medicine: Tehran. 1992; p. 213.
31. Mofidi ch.M.H. Resistance of. *An. stephensi* to dieldrin in Iran.presented at the WHO

- Regional Conference on ME, Addis Ababa IPM 650. 1959.
32. Davari B, Vatandoost H, Oshaghi MA, Ladonni H, Enayati AA, Shaeghi M, et al. Selection of *Anopheles stephensi* with DDT and dieldrin and cross-resistance spectrum to pyrethroids and fipronil. *Pesticide Biochemistry and Physiology*. 2007; 89(2): 97-103.
  33. Tayyeb Zadeh I. The progress of malaria eradication program 1984, government reports, Tehran, Iran Archive center of documentation, code 15706-1968.
  34. Manoochehri A, Ghiassedini M, Shahgudian ER. *Anopheles dthali* Patton, 1905, a new secondary vector in southern Iran. *Annals of tropical medicine and parasitology*. 1972; 66(4): 537-538.
  35. Ladonni, Baniardalani M, Nadaf Dezfulli SR, Bani-Ardalan M. Genetics and mechanism of malathion resistance in *Anopheles stephensi* from Bandar-Abbas and its cross resistance spectrum to DDT, dieldrin and pirimiphos-methyl. *Iranian Journal of Public Health*. 1992; 21(1-4): 39-52.
  36. Manucehri A. A review of the ecology of malaria in Iran of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, 1985; p. 12.
  37. Bandar Abbas Health Center. Annual performance reports of malaria in the health center in Bandar Abbas city. 1996 to 2002 years. Bandar Abbas Health Center. (In Persian). <http://vista.ir/article/312682>.
  38. Azizi K, Soltani A, Poodat A, Khodadadi M, Yaran M, Hasanvand B. Susceptibility of *Anopheles stephensi* against five current chemical insecticides. *Hormozgan Medical Journal* 2011; 14 (4):305-311 (Persian).
  39. Fathian M, Vatandoost H, Moosa- Kazemi SH, Raeisi A, Yaghoobi-Ershadi MR, Oshaghi MA, et al. Susceptibility of *Culicidae* mosquitoes to some insecticides recommended by WHO in a malaria endemic area of Southeastern Iran. *Journal of Arthropod-Borne Diseases* 2015; 9(1): 22-34.
  40. Hanafi-Bojd AA, Vatandoost H, Oshaghi MA, Haghdoost AA, Shahi M, Sedaghat MM, et al. Entomological and epidemiological attributes for malaria transmission and implementation of vector control in southern Iran. *Acta Tropica*. 2012; 121(2): 85-92.
  41. Shahi M, Hanafi Bojd AA, Vatandoost H, Solymani A. Sensitivity mode *Anopheles stephensi* the main malaria vector to insecticides deltamethrin and *Bacillus thuringiensis* triflumuron in the malarious areas of Hormozgan province, Southern Iran. *Journal of Kerman University of Medical Sciences*. 2013; 20(1): 87-95 (Persian).
  42. Soltani A, Vatandoost H, Oshaghi MA, Raeisi A, Eshraghian MR, Soltan Dallal MM. et al. Baseline susceptibility of different geographical strains of *Anopheles stephensi* (Diptera: Culicidae) to temephos in malarious areas of Iran. *Journal of Arthropod-Borne Diseases*. 2013; 7(1): 56-65.
  43. Manouchchri AV, Zaini A, Motaghi M. Susceptibility of *Anopheles maculipennis* to insecticides in northern Iran. *Mosquito News*. 1976; 36(1): 51-55.
  44. Chavshin AR, Dabiri F, Vatandoost H, Mohammadi Bavani M. Susceptibility of *Anopheles maculipennis* to different classes of insecticides in West Azarbaijan Province, Northwestern Iran. *Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine* 2015; 5(5): 403-406.
  45. Yaghoobi Ershadi A, Manochri M, Zaim M. Evaluation of anti-malaria operations in the Hormozgan Province in 1982. Tehran: Aftab Newspaper, 1987, Monday.
  46. Edalat H. Ecology of *Anopheles fluviatilis*



---

vectors of malaria in areas of southern Iran and its role in the epidemics of 1997. School of Health, Tehran University of Medical Sciences. 1999. No. 2860.

47. Shahi M, Vatandost H, Abaie MR, Hanafi Bojd AA. Susceptibility of *Anopheles fluviatilis* James to different insecticides in the city of Bandar Abbas, in 2003. *Hormozgan Medical Journal* 2006; 10(4): 321-328.
48. Vatandost M, Jalilians M. Study of Susceptibility and resistance of malaria vectors to pesticides: DDT, Malathion and Lambda-cyhalothrin in Ilam Province. Master Thesis, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran Scientific Documents and information center, code 30239. 1998. Master Thesis. (Persian).
49. Ladonni H, Gavami S. Determine the susceptibility level of *Anopheles sacharovi* mosquitoes collected from Arjan plain in Fars province to different insecticides: malathion, fenitrothion and DDT (Diptera-Culicidae). *Iran Health Journal* 2009; 28(1-4): 145-150. (Persian).
50. Borhani N, Vatandoost H. Determine the level of sensitivity and excitability of *Anopheles stephensi* and *An. culicifacies* to different Pyrethroids insecticides in Sistan and Baluchestan province. The Ministry of Health, Treatment and Medical Education-Tehran University of Medical Sciences and Health Services. 1999; Master Thesis. (Persian).
51. Azizi K, Poudat A, Soltani A, Mehranzade M. Fauna and some biologic characteristics of *Anopheles* mosquitoes (Diptera: Culicidae) in malaria high risk regions: Hormozgan Province, 2007-2008. *Hormozgan Medical Journal* 2012; 16(4): 273-282 (Persian).
52. Pir Moradi A, Nori Fard M, Salahi Moghaddam A. Ecological Study on Malaria in Bandar Abbas District Using Geospatial Information System (GIS). *Iranian Journal of Army University of Medical Sciences* 2012; 10(1): 35-44 (Persian).
53. Vatandoos H, Oshaghi MA, Abaie MR, Shahi M, Yaaghoobi F, Baghaei M, et al. Bionomics of *Anopheles stephensi* Liston in the malarious area of Hormozgan province, southern Iran, 2002. *Acta Tropica* 2006; 97(2): 196-203.
54. Wondji CS, Dabire RK, Tukur Z, Irving H, Djouaka R, Morgan JC. Identification and distribution of a GABA receptor mutation conferring dieldrin resistance in the malaria vector *Anopheles funestus* in Africa. *Insect Biochemistry and Molecular Biology* 2011; 41(7): 484-491.
55. Jadgal Kh M, Zareban I, Alizadeh Siouki H, Sepehrvand N. The Epidemiological features of malaria in Konarak during the years 2007-2011. *Journal of Torbat Heydarieh Medical Science University* 2014; 2(1): 54-60.
56. Oshaghi MA, Yaaghoobi F, Abaie MR. Pattern of mitochondrial DNA variation between and within *Anopheles stephensi* (Diptera: Culicidae) biological forms suggests extensive gene flow. *Acta Tropica*. 2006; 99(2-3): 226-233.
57. Vatandoost H, Hanafi-Bojd AA. Current resistant status of *Anopheles stephensi* Liston to different larvicides in Hormozgan province, southeastern Iran. *Pakistan Journal of Boiological Sciences* 2005; 8(11): 1568-1570.
58. Fekri S, Vatandoost H, Daryanavard A, Shahi M, Safari R, Raeisi A, et al. Malaria situation in an endemic area, southeastern

- Iran. Journal of Arthropod-Borne Diseases. 2014; 8(1): 82-90.
59. Enayati AA, Ladonni H. Oxidase and resistance to insecticides pyrethroid, important insects Medicine. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. 2005; 15(50): 139-142.
60. Dehghani R, Limoui M, Zarghi I. Investigate the effect of pesticide hazards with emphasis on insecticide resistance in arthropods of health risk importance (review article). Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences 2012; 17: 84-100 (Persian).