

## CASE REPORT

# ***Management of Periapical Lesions due to Foreign Body Reaction: A Case Report***

Salma Omidi<sup>1</sup>,  
Jamilah Ghoddusi<sup>2</sup>,  
Siavash Mushakhian<sup>3</sup>,  
Azadeh Harandi<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Assistant Professor, Department of Endodontics, Faculty of Dentistry, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

<sup>2</sup> Professor, Dental Material Research Center, Department of Endodontics, Dental School, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

<sup>3</sup> Assistant Professor, Dental Material Research Center, Department of Endodontics, Dental School, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

<sup>4</sup> Assistant Professor, Dental Material Research Center, Institute of Health, Department of Endodontics, Faculty of Dentistry, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran

(Received August 2, 2017 Accepted December 3, 2017)

### **Abstract**

**Background and purpose:** Foreign bodies may be deposited in the periapical tissues either by traumatic injury or iatrogenically. The presence of an external object in the periapical tissue by creating a foreign body reaction can lead to endodontic failure. This article describes the treatment of an unusual impaction of three foreign bodies into the periapical tissues.

**Case report:** Three foreign bodies in periapical space of an adolescent was accidentally detected. He had trauma history in the anterior teeth. Non-surgical and surgical treatment was performed. After two years follow up, clinical signs showed improvements and the bone was repaired.

**Conclusion:** Foreign body reaction in the periapical tissue and the delay in its detection cause extensive destruction of the bony structure. Therefore, surgical treatment for their fast removal is necessary.

**Keywords:** Foreign Bodies, Tooth Injuries, Endodontics, surgery

J Mazandaran Univ Med Sci 2018; 27 (156): 211 - 217 (Persian).

## درمان ضایعه پری اپیکال ناشی از واکنش جسم خارجی: گزارش مورد

سلما امیدی<sup>۱</sup>

جمیله قدوسی<sup>۲</sup>

سیاوش موشخیان<sup>۳</sup>

آزاده هرندی<sup>۴</sup>

### چکیده

**سابقه و هدف:** اجسام خارجی ممکن است بر اثر آسیب‌های ناشی از ضربه یا به صورت ایاتر و زئینیک در فضای پری اپیکال دندان کاشته شوند. آن‌ها می‌توانند با ایجاد واکنش التهابی ناشی از جسم خارجی، موجب بروز یک ضایعه اندودنیک و شکست درمان ریشه دندان شود. این مقاله درمان یک ضایعه اندودنیک ناشی از قرارگیری عجیب سه جسم خارجی در فضای پری اپیکال دندان را شرح می‌دهد.

**گزارش مورد:** پس از تشخیص اتفاقی وجود سه جسم خارجی در فضای پری اپیکال یک نوجوان که سابقه ترومما در دندان‌های قدامی داشت، درمان به صورت غیر جراحی و جراحی انجام شد. پس از دو سال معاینات پیگیری عالیم بالینی بهبود یافت و ترمیم استخوان صورت گرفت.

**استنتاج:** واکنش التهابی ناشی از اجسام خارجی در فضای پری اپیکال دندان و تاخیر در تشخیص آن موجب تخریب وسیع ساختار استخوانی می‌شود که درمان جراحی و خروج هرچه زودتر آن، ضروری می‌باشد.

**واژه‌های کلیدی:** اجسام خارجی، صدمات دندانی، درمان ریشه دندان، جراحی

### مقدمه

خود پنهان کنند<sup>(۱،۲)</sup>. اجسام خارجی ممکن است توسط خود فرد وارد بدن گردیده یا به علت آسیب ایاتر و زئینیک یا ناشی از ترومما در بافت‌ها فرو رفته باشند. احتمال ورود این اجسام به دندان در موقعی که حفره پالپ باز است (به علت آسیب ناشی از ترومما یا پوسیدگی وسیع دندان)، بیشتر خواهد بود<sup>(۳)</sup>. خارج کردن جسم خارجی از دندان یکی از مسائل چالش‌برانگیز در حیطه دندان پزشکی کودکان است<sup>(۴)</sup>. خارج کردن این اجسام در صورتی که درون حفره پالپ قرار داشته باشند، آسان است ولی در مواردی که به علت باز بودن اپیکس دندان یا ناشی از ضربه به قسمت

کشف جسم خارجی در محیط دهان یا دندان‌ها یک موقعیت ویژه است که اغلب به صورت تصادفی تشخیص داده می‌شود. برای رسیدن به جمع‌بندی در مورد ماهیت، اندازه و مکان یک جسم خارجی و تعیین دشواری خارج کردن آن، لازم است که شرح حال منفصلی گرفته شود و معاینه بالینی و رادیوگرافیک کاملی انجام شود<sup>(۱،۲)</sup>. بروز این مشکل در کودکان شایع‌تر است زیرا کودکان غالباً عادت دارند که اشیاء را به داخل دهان خود ببرند و موجب فرورفتن اشیاء به داخل مخاط دهان یا کانال ریشه دندان شوند که ممکن است به علت ترس، بروز چنین مشکلی را از والدین

Email: salmaomidi@yahoo.com

**مؤلف مسئول:** سلما امیدی - ساری، دانشکده دندان پزشکی، بخش اندو

۱. استادیار، گروه اندو، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
  ۲. استادیار، گروه اندو، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
  ۳. استادیار، مرکز تحقیقات مواد دندانی، گروه اندو، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
  ۴. استادیار، مرکز تحقیقات مواد دندانی، اتحمن سلامت، گروه اندو دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
- ۱۳۹۶/۹/۱۲ تاریخ دریافت: ۱۳۹۶/۵/۱۱ تاریخ ارجاع جهت اصلاحات: ۱۳۹۶/۶/۱۴ تاریخ تصویب: ۱۳۹۶/۹/۱۲

ارجاع شد. در زمان مراجعه به کلینیک تخصصی بیمار از نظر سیستمیک سالم بودو در طی معاینات بالینی پوسیدگی شدید در سانترال و شکستگی تاج Ellis class III در دندان‌های سانترال راست بالا دیده شد. علایمی از تورم در مخاط باکال دیده نشد. دندان‌های سانترال و لاترال تغییر رنگ خاکستری شکل نشان می‌دادند. دندان‌ها به تست سرما و الکتریکی پاسخ منفی دادند. رادیوگرافی پری اپیکال از دندان‌های ۱۱ و ۱۲ تهیه شد و رادیولوستنسی پری اپیکال به همراه وجود سه جسم خارجی رادیوپاک در مشاهده شد (تصویر شماره ۱). زمانی که درباره علت آن از بیمار سوال شد چیزی به خاطر نمی‌آورد اما سابقه‌ای از فروبردن خلال دندان یا اجسام تیز به داخل دندان جهت خارج کردن بقایای غذا از تاج دندان ذکر کرد.



تصویرشماره ۱: رادیوگرافی قبل از کار که سه جسم خارجی در پری اپیکال دندان ۱۲ مشاهده شد.

علت وجود اجسام خارجی در بافت پری اپیکال، کاشته شدن اجسام توسط خود شخص به علت پوسیدگی وسیع و با زیبودن اپکس دندان ۱۲ یا با احتمال کمتر فشرده شدن در اثر ترومما تشخیص داده شد. به هر صورت دندان‌های مذکور جهت درمان ریشه معمولی و چراحتی پری اپیکال تحت درمان قرار گرفتند.

#### درمان ریشه اورتوفلگرید

جلسه اول: بدون تزریق بی‌حسی، تهیه حفره دسترسی و برداشتن پوسیدگی برای دندان‌های ۱۱ و ۱۲

آپیکال رانده شده باشند، پیچیدگی‌های بیشتری رخ می‌دهد<sup>(۶)</sup>. به طور کلی یک جسم خارجی در فضای دهان می‌تواند مدت‌ها بدون علامت بماند و تنها یک نمای رادیولوستنسی در رادیوگرافی داشته باشد یا موجب عفونت، درد، تورم و آبسه‌ای عودکننده شود که وجود جسم خارجی با بروز چنین علایمی در فضای پری اپیکال دندان موجب تخریب استخوان پری اپیکال، تشکیل گرانولوم و نهایتاً شکست درمان ریشه می‌شود<sup>(۷، ۹)</sup>. در چنین مواردی درمان‌های متعدد جهت ریشه دندان صورت می‌گیرد و به علت عدم تشخیص جسم خارجی در فضای پری اپیکال، ضایعه پری اپیکال بهبود نمی‌یابد و تخریب استخوان پیشرفت می‌کند. در مواردی که جسم خارجی به فضای پری اپیکال رانده می‌شود انجام جراحی‌های آپیکال نیاز خواهد بود<sup>(۳)</sup>. هدف از گزارش مورد حاضر شرح درمان جراحی و غیر جراحی یک ضایعه اندودنتیک ناشی از قرارگیری عجیب سه جسم خارجی در فضای پری اپیکال دندان می‌باشد که از نظر رادیوگرافیک و کلینیکی تا دو سال مورد پیگیری قرار گرفته است.

## گزارش مورد

نوجوانی ۱۶ ساله با شکایت اصلی شکستگی در دندان‌های قدامی بالا و در دست داشتن نامه ارجاع از کلینیک دندانپزشکی عمومی به کلینیک تخصصی درمان ریشه مراجعه کرد. بیمار سه سال قبل در طی سانحه سقوط از روی دوچرخه دچار شکستگی در دندان‌های سانترال و لاترال راست فک بالا شده است. در طی این مدت درمانی برروی دندان‌ها انجام نگرفته ولی بیمار سابقه‌ای از تورم عودکننده در مخاط لایال دندان‌های فوق ذکر کرد. در زمان تورم به کلینیک دندانپزشکی عمومی مراجعه کرده بود و به دنبال تهیه رادیوگرافی از دندان‌های درگیر اجسام رادیوپاک در بافت پری اپیکال مشاهده کردند و به بخش تخصصی

داده شد و ( MTA plug ( Angelus,Londrina,Brazil به صورت اورتوگرید قرار داده شد. سپس تاج دندان پانسمان شد و بعد از تهیه رادیوگرافی و اطمینان از قرارگیری صحیح MTA، ممبران در ناحیه جراحی قرارداده شده و فلپ بر گردانده و بخیه زده شد ( تصاویر شماره ۲ تا ۶).



تصویرشماره ۲: کورتیکال پلیت باکال دندان های سترال و لاترال از دست رفته است.



تصویرشماره ۳: خارج کردن اجسام خارجی



تصویرشماره ۴: سه جسم خارجی از فضای پری اپیکال خارج شد.

انجام شد. تعیین طول به وسیله K فایل شماره ۱۵ (DENTSPLY Maillefer, Ballaigues, Switzerland) برای دندان ۱۱ و ۵۵ برای دندان ۱۲ انجام گرفت. پاکسازی و شکل دهی کانال ها با استفاده از فایل دستی و تکنیک step back همراه با شستشو با نرمال سالین و هیبوکلریت سدیوم ۲/۵ درصد انجام شد. نهایتاً خمیرهیدروکسید کلسیوم داخل کانال ها گذاشته شد و دندان ها با استفاده از خمیر پانسمان cavisol (golchay.tehran. IRAN ترمیم موقت شدند.

جلسه سوم ( روز ۱۴ ) : تا حدودی بهبودی در بافت نرم اطراف دندان ها مشاهده شد. پر کردن کانال ریشه دندان سانترال با تکنیک تراکم جانبی و با استفاده از سیلر ( Iran, AH26 Densply,Germany ) و گوتا ( Tehran, Ariadent استاندارد انجام شد و دندان ها ترمیم موقت شدند.

#### جراحی پری اپیکال

جلسه چهارم ( روز ۲۳ ) : در این جلسه بعد از مشاهده بهبودی بیش تر در بافت لثه ای و مخاطی اطراف دندان ها، جهت خارج کردن اجسام خارجی و کورتاز ضایعه پری اپیکال تصمیم به انجام جراحتی پری اپیکال گرفته شد. ابتدا منطقه جراحی با لیدو کائین ۲ درصد و آپی نفرین ۰/۸۰۰۰ ( Iran, Karaj, Daropakhsh ) و با استفاده از تکنیک انفیلتراسیون و بلاک اینفرا اریتال بی حس شد. پس از کنار زدن فلپ موکوپریوسیال مثلثی در ناحیه قدام فک بالا مشخص شد که پلیت کورتیکال باکال دندان های سترال و لاترال از بین رفته است. بعد از حذف بافت گرانولیشن نوک اجسام خارجی مشاهده شد ( دو جسم فلزی و یک جسم چوبی ). اجسام خارجی به آرامی خارج شد و بعد از کورتاز و شستشوی نهایی ، یک پنبه در اپیکال دندان لاترال قرار



تصویر شماره ۸: رادیوگرافی بعداز جای گذاری مجدد MTA  
به صورت اورتوگرید



تصویر شماره ۵: قراردادن MTA از کرونا در حین جراحی



تصویر شماره ۶: قراردادن ممبران

معاینات پیگیری بعد از ۷ و ۲۴ ماه انجام شد ( تصاویر شماره ۹ و ۱۰ ) . معاینات بالینی بهبودی در بافت نرم و عمق نرممال پاکت را نشان داد. در رادیوگرافی نیز ترمیم ضایعه استخوانی مشخص بود.



تصویر شماره ۹: بعد از ۷ ماه پیگیری



تصویر شماره ۱۰: بعداز ۲ سال پیگیری

جلسه پنجم ( روز ۳۰ ): بعد از خارج کردن بخه ها یک رادیوگرافی ارزیابی تهیه شد و مشخص شد MTA موجود در کanal دندان لاترال شسته شده است ( تصویر شماره ۷ ) . با توجه به کیفیت خوب MTA plug شسته شدن آن عجیب به نظر می رسید ولی احتمالاً به علت شدت التهاب در ناحیه پری ایکس و عدم وجود تنگه پری ایکال این اتفاق رخ داد. در هر صورت MTA plug دوباره قرارداده شد ( تصویر شماره ۸ ) و سپس Internal Bleaching با استفاده از پریورات سدیوم در طی دو جلسه برای دندان لاترال انجام شد و سپس رستوریشن نهایی گذاشته شد.



تصویر شماره ۷: شسته شدن MTA

وجود جسم خارجی در بافت پری ایکال اتفاق ناخوشایندی است که می تواند به طور ایاتروژنیک (۱) یا ناشی از صدمه (۹) یا ناشی از عادات غلط توسط خود

## بحث

وجود جسم خارجی در بافت پری ایکال اتفاق ناخوشایندی است که می تواند به طور ایاتروژنیک (۱) یا ناشی از صدمه (۹) یا ناشی از عادات غلط توسط خود

گرفه شد و به علت تخريب شدید استخوان باکال ممبران نيز گذاشته شد و آتشي بيوتيك نيز تجويز شد Sawhney و همكاران در سال ۲۰۱۶ وجود ۲ جسم فلزي در فضاي پري اپيكال يك خانم ۱۷ ساله را گزارش کردند که طي يك حادثه تروماتيک در ۸ سال قبل به فضاي اطراف اپكس وارد شده بود که شکستگي دندان سترال راست بالا همراه با تخريب استخوان را به همراه داشت. درمان ريشه غير جراحی به همراه جراحی پري اپيكال موجب بهبود علائم شد(۱۳).

Plascencia و همكاران در سال ۲۰۱۴ وجود جسم خارجي فلزي در پري اپيكال دندان قدامی جوان ۲۵ ساله گزارش کردند که حدود ۱۵ سال پيش طي يك حادثه تروماتيک به فضاي پري اپيكال انسیزور چپ بالا فرو رفته بود. اگرچه دندان بدون علامت بوداما تخريب استخوان پري اپيكال و تغيير رنگ تاج دиде می شد که به دنبال درمان جراحی و خارج کردن جسم خارجي بهبودی حاصل شد(۱۴).

گزارشاتي از مشاهده اجسام خارجي در دندان (۶، ۹، ۲، و مخاط دهان (۱۶، ۱۴، ۱۱، ۱۰، ۳) وجود دارد که در تمام اين موارد اگر چه تشخيص با چالش همراه بوداما با خارج کردن اين اجسام بهبودی حاصل شد.

چنان چه مشابه اين مورد، بين زمان آسيب ناشي از ترومما يا ورود جسم خارجي و درمان فاصله يافتند ميزان آسيب و تخريب به بافت نرم و سخت زياد می شود و درمان پيچiedه تر می گردد. طرح درمان برای مورد اخير که شامل درمان ريشه دندان و جراحی پري اپيكال همراه با گذاشتن ممبران بود با توجه به پيگيري هاي باليني و راديوجرافيك دو ساله موفقیت آميز بود.

فرد (۱۰، ۴، ۳) وارد بافت شوند که می توانند با آغاز روند التهابي و واکنش جسم خارجي (Foreign Body Reaction) موجب شکست درمان ريشه دندان شوند(۷). از طرف ديگر صدمات به دندانها می تواند به طور مستقيم یا غيرمستقيم موجب آسيب به استخوان آلتوئول و دندانها شود. در صورتی که دندان آسيب دیده سريعاً درمان نشود، نکروز پالپ همراه با پريودنتيت اپيكال مزن و تغيرات كيسitic شائع ترين عارضه می باشد(۸). در مورد حاضر قبل از اين که دندان لاترال بالغ شود طي آسيب دچار شکستگي تاج شده و به علل باز بودن پالپ و ناکامل بودن اپكس احتمال وارد شدن اجسام خارجي به داخل پالپ و بافت پري اپكس وجود داشت. از آنجابي که بيمار سابقه ای از انجام درمان دندانپزشكی در دندانهاي مورد ذكر نداشت و به اين نكته اشاره داشت که برای تميز کردن دندان از بقائي غذا از اجسام تيز يا خالل دندان استفاده می کرد احتمالاً اجسام خارجي از طريق دستکاري توسط خودفرد يا به احتمال کم تر به دنبال تروما به فضاي پري اپيكال فرستاده شد. اغلب اوقات يافتن اجسام خارجي وارد شده از نظر باليني مشكل می باشد و می تواند موجب مشكلات تشخيصي شود. دیده شدن اجسام خارجي در راديوجرافی وابسته به راديوسنسیتی آنها ونژدیکی اجسام به بافتی است که در آن مدفون شده اند(۱۱، ۱۲). در بيمار حاضر سه جسم خارجي طي يك راديوجرافی پري اپيكال به طور تصادفي يافت شد که وجود اين اجسام در ناحيه پري اپيكال بيمار موجب بروز آبسه هاي عود كننده و تحليل استخوان وسیع شده بود. درمان ريشه معمولی به همراه جراحی پري اپيكال جهت خارج کردن اجسام خارجي برای درمان در نظر

## References

1. Plascencia H, Cruz A, Solis R, Diaz M, Vazquez J. Iatrogenic displacement of a

foreign body into the periapical tissues.  
Case Rep Dent. 2014; 2014:698538.

2. Shashidhar J, Chandrashekhar S. Foreign Body in the Root Canal and Its Management. *J Dent* • 2013;3(1):32-36.
3. Passi S, Sharma N. Unusual foreign bodies in the orofacial region. *Case Reports in Dentistry*. 2012;2012:191873.
4. Mahesh R, Waseem H, Siva Kumar M. Unusual behavior in children--foreign object in tooth: a report of two cases. *Ethiop J Health Sci*. 2014;24(4):369-373.
5. Srivastava N, Vineeta N. Foreign body in the periradicular area. *J Endod*. 2001;27(9):593-594.
6. Aduri R, Reddy RE, Kiran K. Foreign objects in teeth: Retrieval and management. *J Ind Soc Pedod Prev*. 2009;27(1):179-183.
7. Mukherjee CG, Mukhopadhyay M, Mukherjee U. Unusual Endodontic Treatment: A Surprise. *Int J Dent Health*. 2015;1(1):28-31.
8. Nair PN. On the causes of persistent apical periodontitis: a review. *Int Endod J*. 2006;39(4):249-281.
9. Angrish P, Haldar S, Saha S, SenGupta A. Foreign Body in a Traumatized Tooth: Identification and Management. *Int J Oral Health Med Res*. 2016;2(5):103-105.
10. Vinayagam R, Gita B, Chandrasekaran S, Nazer AI. Traumatic impaction of foreign body in the mucobuccal fold of lower anterior region in the oral cavity: A chance finding. *J Indian Soc Periodontol*. 2015;19(3):339-341.
11. Lauritano D, Petrucci M, Sacco G, Campus G, Carinci F, Milillo L. Dental fragment embedded in the lower lip after facial trauma: Brief review literature and report of a case. *Dent Res J*. 2012;9(Suppl 2):S237-S241.
12. Karam Genno N, Assaf A. Impression material mass retained in the mucobuccal fold. *Case Reports in Dentistry*. 2014;2014:416965.
13. Sawhney S, Shetty N, Sharma N, Poojary D. Endo-surgical management of foreign bodies in the periapical region. *Journal of Orofacial Sciences*. 2016;8(1):74-76.
14. Serrano TL, Pauna HF, Hazboun IM, Dal Rio AC, Correa ME, Nicola EM. Foreign Body in Jugal Mucosa. *Int Arch Otorhinolaryngol*. 2015;19(4):364-366.
15. Puliyel D, Balouch A, Ram S, Sedghizadeh PP. Foreign body in the oral cavity mimicking a benign connective tissue tumor. *Case Rep Dent*. 2013;2013:369510.
16. Joyce S, Rao Sripathi BH, Mampilly MO, Firdoose Nyer CS. Foreign body granuloma. *Journal of Maxillofacial and Oral Surgery*. 2014;13(3):351-354.