

## ***Geographical Distribution of Five Major Tick Vectors of Crimean Congo Hemorrhagic Fever in Iran, 2003-2017 (A review article)***

Arezo Elyasi<sup>1</sup>,  
Elham Jahanifard<sup>2</sup>,  
Mona Shariffard<sup>2</sup>,  
Fatemeh Rajaei<sup>1</sup>,  
Nasibeh Hosseini-Vasoukolaei<sup>3</sup>,  
Hoda Ghofleh Maramazi<sup>1</sup>

<sup>1</sup> MSc Student in Medical Entomology, Student Research Committee, Faculty of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

<sup>2</sup> Assistant Professor, Department of Medical Entomology and Vector Control, School of Public Health, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

<sup>3</sup> Assistant Professor, Department of Medical Entomology and Vector Control, Health Sciences Research Center, Addiction Institute, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

(Received March 17, 2017 ; Accepted July 25, 2018)

### ***Abstract***

**Background and purpose:** Crimean Congo Hemorrhagic Fever (CCHF) is a dangerous viral zoonotic disease. Ticks are the main vector which transmit CCHF virus from livestock to human. The present study was done to provide a comprehensive database on major ticks in the CCHF virus transmission and their geographical dispersal in Iran. This would be of great benefit in planning for intelligent control of the disease based on the budget and personnel in areas where the incidence of the disease is high.

**Materials and methods:** In this study, the articles published (2003-2017) on five important vectors of the CCHF in Iran were reviewed in electronic databases, including PubMed, Google scholar, SID, Iran Medex, Elsevier, and Scopus, using the following keywords: Tick Fauna, Iran, Ixodidae, CCHF, detection of CCHF and Tick distribution. Then, the data in Excel was exported to ArcGIS 9.3 to provide geographic dispersion and vector infection map.

**Results:** Distribution map of five important tick species in transmission of CCHF virus including *Hyalomma marginatum*, *Hy.anatolicum*, *Hy.asiaticum*, *Hy.dromedarii*, and *Rhipicephalus sanguineus* were drawn. The distribution map of these five tick species and molecular methods indicated that in 8 of 31 provinces CCHF virus was identified in two species, including *Hy. marginatum* and *Hy.anatolicum*.

**Conclusion:** More extensive studies are needed to detect the fauna and distribution of ticks. Also, isolation of disease agents from samples in areas where the disease was reported should be done. Current findings could be used to update the database for prediction and modeling of CCHF based on the effective factors.

**Keywords:** hard tick, Crimean Congo Hemorrhagic Fever, *Hyalomma Rhipicephalus*, Geographic Information System

**J Mazandaran Univ Med Sci 2018; 28 (166): 231-245 (Persian).**

\* **Corresponding Author:** Elham Jahanifard - School of Public Health, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran (E-mail: jahanifardelham2017@gmail.com)



گونه‌های دیگر از جمله *Boophilus dxodes*، *Rhipicephalus* و *Dermacentor* نیز می‌توانند ناقل بیماری باشند (۹، ۱۰). این کنه‌ها از مهم‌ترین انگل‌های خارجی در دام‌ها می‌باشند که در تمامی قسمت‌های بدن دام دیده می‌شوند، ولی بیش‌تر به نواحی کم‌مو و پوست نازک بدن مانند کشاله ران، بیضه‌ها، پستان‌ها، زیر شکم، زیر دم و داخل گوش حمله می‌کنند. معمولاً فصل فعالیت کنه‌ها مصادف با زمان شیوع برخی از بیماری‌های خطرناک دامی است (۱۱). کنه‌ها نقش مهمی در بقای ویروس در طبیعت دارند. رفتار انگلی کنه‌ها در طی تمام مراحل زندگی‌شان، خونخواری بیش از حد روی میزبان، تغذیه از محدوده وسیعی از میزبان‌های مهره دار، قدرت تولید مثل زیاد، طول عمر زیاد و سازگاری با شرایط سخت، ویژگی‌های قابل توجهی هستند که کنه‌ها را می‌توان به عنوان ناقل بخش وسیعی از عوامل بیماری‌زا معرفی کرد (۱۲). با توجه به گزارشاتی مبنی بر حضور این ویروس، بیماری ناشی از آن و اپیدمی‌های رخ داده در ایران و همچنین آلودگی کشورهای هم‌جوار ایران مانند ترکیه، افغانستان، عراق، قزاقستان، کویت، عمان، عربستان سعودی، تاجیکستان و امارات متحده عربی تعیین عامل بیماری در کنه‌های ناقل بیماری، پراکندگی ناقلین و میزان آلودگی آن‌ها در مناطق مختلف ایران برای برنامه‌ریزی جهت کنترل این بیماری خطرناک ضروری به نظر می‌رسد (۲، ۱۳). هدف از این مطالعه، تهیه بانک اطلاعاتی مبتنی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی و ترسیم نقشه پراکندگی مکانی و فراوانی ۵ گونه مهم کنه ناقل تب خونریزی‌دهنده کریمه کنگو بر اساس تحقیقات قبلی در ایران است (۵، ۶، ۱۴). این نقشه‌ها به مسئولین بهداشتی کمک خواهد کرد تا با آگاهی از پراکندگی کنه‌های مهم ناقل در جهت کاهش جمعیت آن‌ها و کنترل بیماری اقدام کنند. همچنین با توجه به این که تب هموراژیک کریمه-کنگو به‌عنوان یک مسئله مهم بهداشتی در کشور مطرح شده است، با ایجاد این نقشه‌ها و قرار دادن آن‌ها بر روی

دهنده شناخته می‌شوند. علایم معمولاً با سندروم بالینی تب، درد عضلانی، ضعف، بی‌حالی، خونریزی و در بعضی موارد با افت فشارخون، شوک و مرگ مشخص می‌شوند (۲۰۱). این بیماری یکی از گسترده‌ترین بیماری‌های ویروسی در آفریقا، آسیا و بخش‌هایی از اروپا می‌باشد که برای اولین بار در سال ۱۹۴۴ در کریمه اوکرائین شناسایی شد و سپس در سال ۱۹۵۶ مشخص شد که عامل آن با عامل بیماری در کنگو یکسان است و از آن پس این بیماری به نام کریمه-کنگو خوانده شد (۳، ۴). در ایران اولین بار آنتی‌بادی علیه ویروس تب هموراژیک کریمه-کنگو از نمونه دامی در سال ۱۹۷۰ گزارش، و در سال ۱۹۷۸ ویروس از کنه‌ها جداسازی گردید. هم‌چنین در سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۸، تعداد ۵۲۸ مورد انسانی از این بیماری گزارش شد. در حال حاضر این بیماری در ۲۶ استان از ۳۱ استان ایران با میزان مرگ و میر ۱۷/۶ درصد مشاهده شده است. عامل این بیماری ویروسی از گروه آربوویروس‌ها، خانواده بنیاوریده و جنس نایروویروس است. ویروس مولد بیماری در چرخه انتقال افقی و عمودی در بین کنه‌ها و طیفی از مهره داران اهلی و وحشی در حال گسترش می‌باشد که شیوع آن در انسان بیش‌تر گزارش شده است (۵). کنه‌ها بند پایانی هستند که شامل کنه‌های سخت و کنه‌های نرم می‌باشند. ۲۶ گونه از کنه‌های ایران به جنس‌های *Rhipicephalus*، *Hyalomma*، *Dermacentor*، *Boophilus*، *Haemaphysalis*، *Argas* و *Ornithodoros* تعلق دارند (۶). تعدادی از کنه‌ها قادر به انتقال تعدادی از پاتوژن‌ها می‌باشد که می‌توان به *Francisella*، *Coxiella*، *Anaplasma*، *Borrelia*، *Rickettsia*، *Thieleria*، *Ehrlichia*، *Babesia* اشاره کرد. هم‌چنین آنسفالیت‌های منتقله توسط کنه‌ها و تب هموراژیک کریمه-کنگو از دیگر بیماری‌های ویروسی هستند که ناقل آن‌ها کنه می‌باشد (۷). کنه جنس هیالوما که پراکندگی آن محدود به دنیای قدیم است دارای گونه‌های مهم اقتصادی است و گونه‌های این جنس قادر به انتقال ویروس تب کریمه کنگو می‌باشند (۸). اما

نقشه فاکتورهای محیطی و اکولوژیک می‌توان محل احتمال وجود ناقلین را پیش‌بینی کرد که این امر به برنامه‌ریزی صحیح در جهت کنترل ناقلین و کاهش موارد بیماری کمک خواهد کرد.

## مواد و روش‌ها

منطقه مورد مطالعه ایران هجدهمین کشور بزرگ جهان است، که مساحتی حدود ۱۶۴۸۱۹۵ کیلو متر مربع دارد و بین عرض‌های ۲۵ درجه و ۳ دقیقه تا ۳۹ درجه و ۴۷ دقیقه شمالی و ۴۴ درجه و ۵ دقیقه تا ۶۳ درجه و ۱۸ دقیقه شرقی قرار دارد. بر اساس سالنامه آماری کشور در سال ۱۳۹۵، جمعیت ایران ۷۹۹۲۶۲۷۰ نفر می‌باشد (۱۷). این کشور از شمال با ارمنستان و آذربایجان و ترکمنستان و از شرق با افغانستان و پاکستان و از جنوب با خلیج فارس و خلیج عمان و از غرب با عراق هم‌جوار است.

### جمع‌آوری و آنالیز داده‌ها

در این مطالعه، که یک مطالعه مروری می‌باشد، اطلاعات سال‌های ۱۳۹۶-۱۳۸۲ با استفاده از موتورهای جستجو و پایگاه‌های داده PubMed، Google scholar، Scopus، Elsevier، SID، Iran Medex و کلیدواژه‌های انگلیسی (Detection of CCHF، CCHF، Ixodidae، Iran، Tick Fauna) و همچنین کلیدواژه‌های فارسی (کنه سخت، پراکنندگی کنه) ۵۲۹ مطالعه استخراج گردید که بعد از حذف مطالعات تکراری، حذف مطالعاتی که سایر بیماری‌های منتقله توسط کنه‌ها را بررسی نموده و حذف مطالعات فونستیک‌کی که سایر گونه‌ها را گزارش کرده بودند، ۲۵ مطالعه انتخاب گردید. لازم به ذکر است که معیار ورود شامل مطالعاتی که فون کنه‌های مهم ناقل تب کریمه‌کنگو در ایران را گزارش کرده و مطالعاتی که ویروس تب کریمه‌کنگو را در گونه‌های مورد نظر این مطالعه به روش مولکولی شناسایی نموده بودند، بوده است. همچنین از اطلاعات ۲ پایان‌نامه ارشد






نیز استفاده شد (۱۸، ۱۹). پایگاه اطلاعاتی مورد نظر در فرمت فایل Excel و بر اساس پنج گونه‌ای که بیش‌ترین موارد مثبت را برای تب کریمه‌کنگو داشته‌اند آماده شد. در این پایگاه اطلاعاتی، تعداد جمع‌آوری شده گونه‌های مورد نظر و فراوانی آن‌ها در محل‌های مورد مطالعه ثبت گردید. همچنین مطالعات فونستیک و تنوع زیستی کنه‌ها و مطالعات مولکولی جهت تعیین ناقلین تب خونریزی دهنده کریمه‌کنگو برای این منظور استفاده شد. لازم به ذکر است برای جلوگیری از استفاده از داده‌های اشتباه، مطالعاتی که توسط افراد شناخته شده در این زمینه انجام شده بود انتخاب گردید. فایل اکسل مورد نظر به نرم‌افزار ArcGIS 9.3 انتقال داده شد و نقشه‌های پراکنندگی مکانی گونه‌های مهم تب هموراژیک کریمه‌کنگو ترسیم گردید.

## یافته‌ها

بر اساس مطالعات انجام شده کنه نرم *Ornithodoros lahorensis* و کنه‌های سخت *Hyalomma anatolicum*، *Dermacentor marginatus*، *H. asiaticum*، *H. dromedarii*، *H. detritum*، *Haemaphysalis inermis*، *H. schulzei*، *H. marginatum*، *R. sanguinus* و *Rhipicephalus bursa punctata* به عنوان ناقلین تب خونریزی‌دهنده کریمه‌کنگو در ایران معرفی شده‌اند (۶). در این مطالعه ۵ گونه مهم کنه که در انتقال بیماری نقش عمده‌ای دارند، مورد بررسی قرار گرفت.

### کنه *Hyalomma* Genus

کنه‌ای دو یا سه میزبان می‌باشد که انحصاراً پستانداران و پرندگان اهلی و وحشی را پارازیت می‌کند (۲۰). این جنس شامل ۳ زیرجنس *Hyalommast*، *Hyalommina* و *Hyalomma* می‌باشد (۲۱). تشخیص گونه‌های جنس هیالوما بر اساس خصوصیات مرفومتریک پیچیده و بحث برانگیز است که از بین ۹ گونه‌ای که از



تصویر شماره ۱: وفور پنج گونه مهم کنه های ناقل تب کریمه کنگو در ایران، سال های ۱۳۹۶-۱۳۸۲






این جنس در ایران وجود دارد، ۴ گونه از آن‌ها و *Hy. asiaticum*, *Hy. anatolicum*, *Hy. marginatum* و *Hy. dromedarii* در انتقال تب کریمه کنگو نقش بسزایی دارند. لازم به ذکر است که *Hy. detritum* و *Hy. Schulzei* از سایر گونه‌های جنس هیالوما می‌باشند که عامل بیماری به روش مولکولی در آن‌ها شناسایی شده است (۶).

#### کنه *Hy. marginatum* Koch 1844

این کنه پراکنندگی وسیعی در آفریقای شمالی و آسیا دارد که از کشورهایمانند الجزایر، ارمنستان، آذربایجان، مصر، اتیوپی، ایران، عراق، اسرائیل، مراکش، سوئد، سوریه، تونس و ترکیه گزارش شده است (۲۲). این گونه در ایران پراکنندگی وسیعی دارد (۲۳، ۲۴). بیشترین تعداد کنه‌های این گونه از استان همدان صید شده است و استان‌های دیگر مانند ایلام، کردستان، اردبیل و گلستان نیز پس از این استان قرار دارند (تصویر شماره ۱) (۱۶). بر اساس مطالعات انجام شده این گونه بیشترین وفور را در فصل تابستان داشته است (۱۱، ۲۹-۲۵). هیالوما مارژیناتوم در مرحله لاروی به جوندگان کوچک، خرگوش‌های صحرایی و پرندگان کوچک می‌چسبد و در تمام مراحل لاروی و نطفی از میزبان جدا نمی‌شود ولی کنه بالغ از حیوانات اهلی و انسان خونخواری می‌کند (۳۰).

نصیری و همکاران در سال ۲۰۱۰ میزان آلودگی گوسفندان را به *Hy. marginatum* ۴۴/۶۸ درصد گزارش کردند. هم‌چنین این کنه از روی میزبان‌های حیوانی دیگری مانند گاو، شتر و سایر احشام نیز صید شده است (۲۶، ۳۱، ۳۲). بر اساس مطالعاتی که در جهت شناسایی ویروس تب کریمه کنگو بر روی این کنه انجام شد، نمونه‌های جمع‌آوری شده از استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی، گلستان، همدان، ایلام، خراسان جنوبی، قم و یزد مثبت گزارش شده است (تصویر شماره ۲) (۶، ۱۹، ۳۳).






*Hyalomma asiaticum* Schulze & Schlotke, 1930 که این کنه به خوبی در Inner Mongolia, Xinjiang, Ningxia در چین و مرکز آسیا پراکنده شده است (۳۴). این گونه سه میزبان، پراکنندگی وسیعی در ایران دارد اما Mazlum در سال‌های ۱۹۶۸ و ۱۹۷۱ ادعا کرد که این گونه در تمام ایران به جز نواحی ساحلی دریای خزر یافت شده است (۳۶،۳۵). کنه *Hyalommamarginatum* به تعداد زیاد از استان‌های خراسان رضوی، خوزستان و ایلام صید شده است (تصویر شماره ۱). لازم به ذکر است نقشه پراکنندگی مکانی این کنه در ایران ترسیم شده است (تصویر شماره ۳). با توجه به مطالعات انجام شده این گونه در فصول بهار و تابستان به تعداد بیش‌تری صید شده است (۲۸-۲۵،۳۱). گزارشاتی مبنی بر مثبت بودن این کنه از استان‌های کرمانشاه، ایلام، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، تهران و یزد وجود دارد (تصویر شماره ۲) (۳۸،۳۷،۱۵،۶). این گونه بر روی طیف وسیعی از میزبان‌ها زندگی می‌کند اما به میزان زیادی در روی گاو و گوسفند مشاهده شده است (۴۰،۳۹،۲۸،۲۶،۱۱). به دلیل این که تشخیص دقیق دو گونه *Hy.asiaticum* و *Hy.anatolicum* همواره با مشکل همراه بوده است و این گونه‌ها به درستی در کلید شناسایی کنه‌های ایران توصیف نشده‌اند، حسینی چگنی و دلیمی در سال ۱۳۹۱ اندام هالر را به عنوان یک صفت تاکسونومیک جهت جداسازی این دو گونه معرفی کرده‌اند (۴۱). این گونه علاوه بر انتقال تب خونریزی‌دهنده کریمه کنگو قادر است به عنوان ناقل و مخزن تب کیو و تب خونریزی‌دهنده Xingiang عمل کند (۴۲).



تصویر شماره ۲: نقشه پراکنندگی آلودگی به ویروس تب کریمه کنگو در پنج گونه مهم کنه در ایران، سال‌های ۱۳۸۲-۱۳۹۶

*Hyalomma anatolicum Koch, 1844* کنه

این گونه فراوان ترین پراکنندگی را در بین گونه‌های جنس هیالوما در ایران دارد (۴۳). پراکنندگی مکانی این گونه نشان می‌دهد که بیش تر در نواحی غربی، شرقی و شمالی ایران مشاهده شده است (تصویر شماره ۳). مطالعات گذشته نشان داد که بیش ترین وفور این گونه مربوط به فصول تابستان و بهار بوده است (۳۱، ۴۰، ۲۸، ۲۶). تصویر شماره ۱ نشان می‌دهد که بیش ترین تعداد این گونه از استان خوزستان جمع‌آوری شده است. استان‌های ایلام، کردستان، خراسان جنوبی و گلستان نیز از نظر وفور این گونه بعد از استان خوزستان در درجه دوم اهمیت قرار دارند (۳۱). میزبان این گونه پستانداران بزرگ و کوچک اهلی و وحشی است، اما این گونه به فراوانی از گاو، گوسفند و احشام جمع‌آوری شده است (۴۴، ۳۱، ۲۸، ۲۶، ۲۳). لازم به ذکر است که انتقال از طریق تخم در این کنه رخ نداده و کنه توسط پرندگان انتقال نمی‌یابد، لذا بیماری به صورت تک گیر و غیر فصلی بین افرادی که با احشام سر و کار دارند رخ می‌دهد (۴۵). به دلیل شباهت این گونه با گونه‌هایی مانند *Hy. excavatum* و *Hy. asiaticum* امکان عدم تفریق آن‌ها از یکدیگر وجود دارد. حسینی چگنی در سال ۲۰۱۲ طول شیار جانبی اسکوتوم را به عنوان یک کاراکتر قابل اعتماد در تشخیص بین گونه‌ای هیالوما آناتولیکوم معرفی کرد و علاوه بر این عمق شیار گردنی اسکوتوم را به عنوان صفت تاکسونومیک افتراقی دو گونه نزدیک به هم هیالوما آناتولیکوم و هیالوما آسیاتیکوم گزارش کرد (۴۳). از این کنه به عنوان ناقل احتمالی *Trypanosoma theileri*، هم‌چنین ناقل *Theileria lestoquardi* و *T. annulata* گزارش شده است و نیز این کنه می‌تواند ارلیشیوز گاوی، تب کیو و Eperythrozoonosis احشام را انتقال دهد (۴۶-۴۹). هیالوما آناتولیکوم به عنوان یکی از گونه‌های مثبت برای تب خونریزی دهنده کریمه-کنگو معرفی شده است (۶). مطالعات مولکولی که بر روی هیالوما مارژیناتوم در



تصویر شماره ۲: پراکنندگی مکانی پنج گونه مهم کنه‌های ناقل تب کریمه کنگو در ایران، سال‌های ۱۳۹۶-۱۳۸۲

سال ۲۰۱۵ کنه *R. sanguineus* را به عنوان یکی از گونه‌های غالب در انتقال تب خونریزی دهنده کریمه-کنگو معرفی کرد (۶).

#### کنه *Rhipicephalus sanguineus* Latreille, 1806

این گونه پراکندگی وسیعی در جهان دارد و کنه‌ای سه میزبانه است که اساساً روی سگ‌ها و گاهی اوقات روی میزبان‌های دیگر از جمله انسان تغذیه می‌کند (۵۵،۵۴). گزارشاتی از آلودگی انسان به این کنه در نواحی مدیترانه، آمریکای مرکزی، اروپا و آفریقا وجود دارد (۵۶). گزارشاتی از صید کنه *R. sanguineus* از روی گوسفند، بز و گاو وجود دارد (۲۸-۲۶، ۳۱، ۵۷، ۵۸). پراکندگی مکانی *R. sanguineus* در ایران نشان داده شده است (تصویر شماره ۳) (۵۷). مطالعات گذشته نشان می‌دهد که این گونه در فصل بهار فعالیت بیشتری دارد (۲۶، ۲۷، ۳۱، ۵۹). تصویر شماره ۱ نشان می‌دهد که این کنه به تعداد بیش‌تری از استان خوزستان صید شده است، اما به وفور قابل توجهی از این کنه در استان‌های لرستان، همدان، گلستان و فارس می‌توان اشاره کرد. این کنه می‌تواند گروهی از آلفا باکتری‌ها مانند *Rickettsia rickettsi*، *Ehrlichia canis*، *Coxiella burnetii* و *Rickettsia conorii* را انتقال دهد (۵۵، ۵۹). در بخش‌هایی از ایران عامل بیماری تب خونریزی دهنده کریمه-کنگو به روش مولکولی در این کنه مثبت گزارش شده است (تصویر شماره ۱) (۵، ۶، ۶۰).

## بحث

در دهه گذشته ایران یکی از کشورهای بوده که بیش‌ترین شیوع CCHF در جهان را داشته است (۶۱). گونه‌هایی که پراکندگی گسترده‌ای ندارند، بعید است نقش مهمی در انتقال انزوتیک (enzootic) بیماری داشته باشند. در این مطالعه ۵ گونه از مهم‌ترین کنه‌های ناقل تب هموراژیک کریمه-کنگو مورد بررسی قرار گرفته است و در این مطالعه پراکندگی و فراوانی این

استان‌های کرمانشاه، ایلام، گلستان، همدان، خراسان جنوبی، خراسان شمالی فارس و یزد انجام گرفت، این گونه را برای تب خونریزی دهنده کریمه-کنگو مثبت گزارش کردند (تصویر شماره ۲) (۵، ۶، ۱۵، ۳۷، ۳۸).

#### کنه *Hyalomma dromedarii* Koch, 1844

این کنه در شمال آفریقا، ناحیه شمالی غرب، مرکز و شرق آفریقا، مدیترانه، مرکز و جنوب آسیا پراکنده شده است (۵۰). حسینی چگنی در سال ۲۰۱۳ به پراکندگی این گونه در سراسر ایران اشاره کرد (۲۳، ۲۹). نقشه پراکندگی مکانی این گونه بر اساس مطالعات انجام شده در ایران ترسیم شده است (تصویر شماره ۳). کنه *Hyalommodromedarii* را می‌توان به عنوان کنه‌ای یک، دو و سه میزبانه نام برد اما ظاهراً سیکل دو میزبانه آن شایع است (۵۰). در اکثر مطالعات شتر را به عنوان میزبان اصلی این گونه معرفی کرده‌اند. لازم به ذکر است که، فصول بهار و تابستان به عنوان فصل فعالیت این گونه ذکر شده است (۲۶، ۲۹، ۳۱). بیش‌ترین تعداد کنه از استان‌های خراسان جنوبی و کرمان صید شده است (تصویر شماره ۱). هم‌چنین این کنه به تعداد بالایی از استان قزوین گزارش شده است و کنه‌های صید شده از استان‌های آذربایجان شرقی، همدان، یزد و گلستان برای تب خونریزی دهنده کریمه-کنگو با روش مولکولی مثبت گزارش شدند (تصویر شماره ۲) (۱۴، ۱۵، ۵۱، ۵۲). علاوه بر این *Spotted Fever group Rickettsia sp.* و *Theileria annulata* از این کنه با روش مولکولی در امارات متحده عربی جدا شدند (۵۳). خصوصیات مرفولوژیک *Hy.dromedarii* به خوبی در کلید شناسایی شرح داده شده است، لذا شناسایی این گونه از سایر جنس‌های هیالوما امکان‌پذیر است (۲۳).

#### کنه *Genus Rhipicephalus*

این جنس در ایران دارای دو گونه *R.sanguineus* و *R.bursa* می‌باشد. تلماده‌ای و همکاران در

۵ گونه در ایران به صورت نقشه‌ها و پایگاه داده مشخص شده است. لازم به ذکر است که داده‌ها از مقالاتی استخراج شد که برای تشخیص از کلیدهای معتبر استفاده کرده و مقالات توسط افراد متخصص در این زمینه نگارش شده بود. نقشه پراکندگی مکانی کنه‌ها بر اساس محدوده سیاسی شهرها ارائه گردید. ایران شامل ۴ اقلیم متنوع شامل معتدل و مرطوب، گرم و خشک، سرد و کوهستانی و گرم و مرطوب می‌باشد، لذا از لحاظ آب و هوایی بسیار متنوع است به طوری که از شمال تا جنوب کشور به تدریج با مناطق آب و هوایی متفاوت مواجهه می‌شویم. تغییرات شرایط آب و هوایی روی پراکندگی جغرافیایی کنه‌ها همچنین روی گسترش بیماری‌های منتقله توسط کنه‌ها و بروز آن‌ها تاثیر می‌گذارد (۶۲).

در مطالعه Ogden & Lindsay گزارش شد که در روی پراکندگی جغرافیایی، فصل فعالیت، طول دوره فعالیت ناقل در روز تاثیر دارد (۶۳). مطالعات قبلی تغییر شرایط آب و هوایی را علت گرم شدن جهانی و به دنبال آن تغییر شرایط اکولوژیک را دلیل تفاوت در پراکندگی ناقلین معرفی کرده است (۶۴). در مطالعه حاضر علت تفاوت در پراکندگی و فراوانی این ۵ گونه مهم در استان‌ها و شهرهای مختلف ممکن است به دلیل اختلاف در شرایط آب و هوایی و انتخاب نوع میزبان جهت جمع‌آوری نمونه باشد. ثبت کردن اطلاعات مربوط به فون گونه‌های ناقل و پراکندگی آن‌ها یک سیستم هشدار برای پایش آن‌ها در موقع لزوم می‌باشد (۶۵). در سایت vectormap ([www.vectormap.si.edu](http://www.vectormap.si.edu)) با پایگاه داده ای تحت عنوان tickmap روبرو می‌شویم، که یک منبع قابل دسترس و ارزشمند حاوی اطلاعات مفیدی است که در مورد گونه‌های ناقل بیماری، مدل‌های پراکندگی ناقلین در اختیار کاربران قرار می‌دهند. لازم است که تهیه و ایجاد این پایگاه اطلاعاتی به طور ویژه مورد توجه کشورهای که در معرض بیماری‌های منتقله توسط کنه‌ها هستند قرار بگیرد. با استفاده از لایه پراکندگی کنه‌های مهم ناقل تب کریمه

کنگو که در پایگاه داده کشور ایجاد شده است امکان ارزیابی خطر احتمال تب خونریزی دهنده کریمه کنگو وجود دارد و باید به انجام مطالعات بیش‌تر در مورد پراکندگی کنه‌ها در کشور تاکید کرد زیرا این اطلاعات دیجیتال می‌تواند نقش مهمی در تصمیم‌گیری مسئولین جهت کنترل تب خونریزی دهنده کریمه-کنگو و سایر بیماری‌های باکتریایی توسط کنه‌ها ایفا کند. با توجه به افزایش تکنولوژی DNA نو ترکیب، محققین زیادی قادرند تا با تشخیص ملکولی، بیماری‌های منتقله توسط ناقلین را شناسایی کنند (۶۶). تاکنون مطالعات اندکی برای شناسایی ویروس تب کریمه-کنگو از کنه‌ها انجام گرفته است. امروزه مطالعات مولکولی، جهت تشخیص آلودگی کنه‌ها به ویروس تب خونریزی دهنده کریمه کنگو به کار می‌رود. فکور زیبا و همکاران در سال ۲۰۱۲، در استان کردستان، جنس هیالوما را برای ویروس تب کریمه کنگو مثبت گزارش کردند (۶۷). همچنین در استان قم دو گونه *Hy. marginatum* و *Hy. dromedarii* به روش مولکولی مثبت گزارش شدند (۶۸). در مطالعه‌ای دیگر که در استان خراسان انجام شد، ۳/۸ درصد از جمعیت کنه‌های مورد بررسی برای ویروس CCHF مثبت گزارش شدند که این گونه‌ها شامل *Hy. asiaticum*، *Rh. appendiculatus* و *Rh. turanicus* *Hy. marginatum* می‌باشند. لازم به ذکر است که ۵۰ درصد از گونه‌های آلوده جزء ۵ گونه مورد بررسی در این مطالعه می‌باشند (۶۹). اگر چه مطالعه تلامدره ای و همکاران در سال ۲۰۱۵، کنه‌های *R. sanguineus*، *Hy. anatolicum*، *Hy. anatolicum* و *Hy. dromedarii* *Hy. asiaticum* را به عنوان فراوان‌ترین کنه‌های حامل ویروس تب کریمه کنگو معرفی کردند، اما کنه *Ornithodros lahorensis* از کنه‌های نرم نیز به عنوان کنه نرم آلوده به CCHF از شمال شرقی و مرکز ایران گزارش گردید (۶، ۷۰). از مجموع ۲۶ گونه کنه سخت و نرمی که از ایران گزارش شده، دوازده گونه کنه (۱۱ گونه کنه نرم و یک گونه کنه سخت) به ویروس تب کریمه کنگو آلوده بودند (۶).

پایگاه اطلاعاتی تهیه می شوند، می توانند آگاهی کلی از وضعیت پراکندگی ناقلین مهم برای مسئولین بهداشتی ایجاد کند تا در هنگام کنترل ناقلین بیماری بر اساس هزینه و پرسنل اقدام نمایند. هم چنین بهتر است مطالعات مبسوطی برای تعیین آلودگی کنه ها در نواحی مرزی کشور که در آنجا تبادل دام با کشورهای همسایه انجام می گیرد، انجام گیرد. لازم به ذکر است که باید به پراکندگی مکانی و زمانی گونه های مهم بیماری و کنترل آن ها در مناطقی که موارد بیماری بالا است توجه نمود.

### سپاسگزاری

این مقاله نتایج طرح مصوب در کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز به شماره IR.AJUMS.REC.1395.468 می باشد.

### References

- Spengler JR, Bergeron É, Rollin PE. Seroepidemiological studies of Crimean-Congo hemorrhagic fever virus in domestic and wild animals. *PLoS Negl Trop Dis* 2016; 10(1): e0004210.
- Mostafavi E, Bagheri Amiri F, Khakifirouz S, Esmaeili S, Kazemi-Lomedasht F. Serologic Survey of Crimean-Congo Haemorrhagic Fever among Sheep in Ardabil Province, Northwest Iran. *Journal of Medical Microbiology and Infectious Diseases (JOMMID)* 2016; 4(1): 16-19.
- Chinikar S, Ghiasi SM, Hewson R, Moradi M, Haeri A. Crimean-Congo hemorrhagic fever in Iran and neighboring countries. *J Clin Virol* 2010; 47(2): 110-114.
- Keshtkar-Jahromi M, Sajadi MM, Ansari H, Mardani M, Holakouie-Naieni K. Crimean-Congo hemorrhagic fever in Iran. *Antiviral Res* 2013;100(1): 20-28.
- Farhadpour F, Telmadarraiy Z, Chinikar S, Akbarzadeh K, Fakoorziba M, MoemenbellahFard M. Molecular detection of Crimean-Congo Hemorrhagic Fever (CCHF) Virus in tick species collected from livestock in Marvdasht, Fars province during 2012-2013. *Armaghane-Danesh* 2015; 19(12): 1049-1057 (Persian).
- Telmadarraiy Z, Chinikar S, Vatandoost H, Faghihi F, Hosseini-Chegeni A. Vectors of Crimean Congo hemorrhagic fever virus in Iran. *Journal of Arthropod-Borne Diseases* 2015; 9(2): 137-147 (Persian).
- Walker AR, Bouattour A, Camics JL, Estrada- Pena A, Horak IG, Latif AA, et al. Ticks of domestic animals in Africa: a guide to identification of species. UK: Edinburgh University; 2003.
- Sonenshine DE, Lane RS, Nicholson WL. Ticks (Ixodida). *Medical and veterinary*

- entomology. 2<sup>nd</sup> ed; Elsevier, 2002. p. 517-558.
9. Chinikar S, Ghiasi S, Ghalyanchi-Langeroudi A, Goya M, Shirzadi M, Zeinali M, et al. An overview of Crimean-Congo hemorrhagic fever in Iran. *Iran J Microb* 2009; 1(1): 7-12 (Persian).
  10. Shirzadi M. Crimean-Congo hemorrhagic fever and other viral hemorrhagic fevers. Seda pub, Tehran Iran, 2003.(Persian)
  11. Kayedi MH, Taherian MR, Hosseini-Chegeni A, Chegeni-Sharafi A, Mokhayeri H, Khorramabad I. The identification of genus, species and distribution of hard and soft ticks collected from livestock and fowl bodies in Aleshtar and Aligodarz counties, Lorestan Province, Iran. *Life Sci*. 2016;13(1s):1-6.
  12. Linthicum KJ, Bailey CL. Ecology of Crimean-Congo hemorrhagic fever. Ecological dynamics of tick-borne zoonoses. New York: Oxford University Press, 1994: 392-437.
  13. Maghsood H, Nabian S, Chini Kar S, Shayan P. Determination of Crimean Congo Hemorrhagic fever (CCHF) in four provinces of Khorasan Razavi province. *Journal of Veterinary Laboratory Research* 2012; 4(1): 57 (Persian).
  14. Telmadarraiy Z, Moradi A, Vatandoost H, Mostafavi E, Oshaghi M, Zahirnia A, et al. Crimean-Congo hemorrhagic fever: a seroepidemiological and molecular survey in Bahar, Hamadan province of Iran. *Asian J Anim Vet Adv* 2008; 3(5): 321-327 (Persian).
  15. Yaser SA, Sadegh C, Zakkyeh T, Hassan V, Maryam M, Ali OM, et al. Crimean-Congo hemorrhagic fever: a molecular survey on hard ticks (Ixodidae) in Yazd province, Iran. *Asian Pacific Journal of Tropical Medicine* 2011; 4(1): 61-63.
  16. Moradi A TZ. Study of tick infection in sheep and determination of tick distribution in Bahar County. *Nashrieh Dampezheshki* 2009; 83: 26-28 (Persian).
  17. Salname Amari. Iran: Statistical Center of Iran, Office of the Head, Public Relations and International Cooperation. 2018: 935 pages.
  18. Karimi F. Determination of contamination rate of hard ticks with Crimean-Congo hemorrhagic fever virus and their distribution patterns using GIS in Kashan city, Isfahan province. Tehran: Tehran University of Medical Sciences; School of Public Health. 2012; 12(9): 733-738 (Persian).
  19. Mehrabad ST. Investigation of RT-PCR-induced agaric and anxiogenic ticks with respect to CCHF virus infection and determination of IgG antibody against the Crimean-Congo hemorrhagic fever virus in endangered sheep and human cases in Bonab and Sarab East Azarbaijan province. Tehran, Iran School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences; 2006. (Persian).
  20. Abdigoudarzi M. Biology of ticks (Acari: Ixodidae) including introduction of Iranian mites (identification key) Tehran: payvand mehr; 2013. (Persian).
  21. Kaiser M, Hoogstraal H. The Hyalomma ticks (Ixodoidea, Ixodidae) of Pakistan, India, and Ceylon, with keys to subgenera and species. *Acarologia* 1964; 6(2): 257-286.
  22. Hoogstraal H. The epidemiology of tick-borne Crimean-Congo hemorrhagic fever in Asia, Europe, and Africa. *J Med Entomol* 1979; 15(4): 307-417.
  23. Hosseini-Chegeni A, Hosseini R, Tavakoli M, Telmadarraiy Z, Abdigoudarzi M. The Iranian Hyalomma (Acari: Ixodidae) with a key to the identification of male species. *Persian Journal of Acarology* 2013; 2(3): 503-529(Persian).

24. Agriculture Research Education & Extension Organization (AREEO). Abundance, diversity, and seasonal dynamics of hard ticks infesting cattle in Isfahan Province, Iran. Archives of Razi Institute 2017; 72(1): 15-21 (Persian).
25. Nasiri A, Telmadarraiy Z, Vatandoost H, Chinikar S, Moradi M, Oshaghi M, et al. Tick infestation rate of sheep and their distribution in Abdanan County, Ilam Province, Iran, 2007–2008. Iran J Arthropod Borne Dis 2010; 4(2): 56-60 (Persian).
26. Telmadarraiy Z, Vatandoost H, Chinikar S, Oshaghi M, Moradi M, Ardakan EM, et al. Hard ticks on domestic ruminants and their seasonal population dynamics in Yazd Province, Iran. Iran J Arthropod Borne Dis 2010; 4(1): 66-71 (Persian).
27. Daftari M, Nourmohamadi Z, Chinikar S, Telmadarraiy Z. Seasonal distribution of CCHF vectors in Khuzistan province, Iran during 2013-2014. Arch Med Lab Sci 2015; 1(2): 56-60 (Persian).
28. Sarani M, Telmadarraiy Z, Moghaddam AS, Azam K, Sedaghat MM. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine 2014; 4: S246- S251.
29. Ganjali M, Dabirzadeh M, Sargolzaie M. Species diversity and distribution of ticks (Acari: Ixodidae) in Zabol County, eastern Iran. J Arthropod Borne Dis 2014; 8(2): 219-223.
30. Zeller HG, Cornet JP, Camicas JL. Experimental transmission of Crimean-Congo hemorrhagic fever virus by west African wild ground-feeding birds to *Hyalomma marginatum rufipes* ticks. Am J Trop Med Hyg 1994; 50(6): 676-681.
31. Sofizadeh A, Telmadarraiy Z, Rahnema A, Gorganli-Davaji A, Hosseini-Chegeni A. Hard tick species of livestock and their bioecology in Golestan province, north of Iran. J Arthropod Borne Dis 2014; 8(1): 108-116.
32. Sohrabi S, Yakhchali M, Ghashghai O. Hard ticks (Acarina: Ixodidae) diversity in the natural habitat of Iranian domestic ruminants: a provincial study in Kermanshah. J Vet Res 2013; 68(1): 39-46.
33. Sedaghat MM, Sarani M, Chinikar S, Telmadarraiy Z, Moghaddam AS, Azam K, et al. Vector prevalence and detection of Crimean-Congo haemorrhagic fever virus in Golestan Province, Iran. J Vector Borne Dis 2017; 54(4): 353-357.
34. Liu ZQ, Xia J, Wang GL, Kuermanali N. Cloning and expression of the 4D8 gene from *Hyalomma asiaticum* tick. Genet Mol Res (GMR) 2016; 15(2).
35. Mazlum Z. *Hyalomma asiaticum asiaticum* Schülze and Schlottke, 1929. Its distribution, hosts, seasonal activity, life cycle, and role in transmission of bovine theileriosis in Iran. Acarologia 1968; 10(3): 437-442.
36. Mazloun Z. Ticks of domestic animals in Iran: geographical distribution, host relation and seasonal activity. Food and Agriculture Organization of the United Nations. 1971.
37. Sharifinia N, Rafinejad J, Hanafi-Bojd AA, Chinikar S, Piazak N, Baniardalan M, et al. Hard ticks (Ixodidae) and Crimean-Congo hemorrhagic fever virus in south west of Iran. Acta Med Iran 2015; 53(3): 177-181 (Persian).
38. Mohammadian M, Chinikar S, Telmadarraiy Z, Vatandoost H, Oshaghi MA, Hanafi-Bojd AA, et al. Molecular Assay on Crimean Congo Hemorrhagic Fever Virus in Ticks (Ixodidae) Collected from Kermanshah Province, Western Iran. J Arthropod Borne Dis 2016; 10(3): 381-391.

39. Dehghani R, Talary SA, Piazek N. Ticks fauna (Acari:Metastigmata) of Kashan-Iran. Veterinary Research Biological Products (Pajouhesh va Sazandegi) 2005; 3(65): 19-23 (Persian).
40. Talamadareh Z, Rafinejad J, Mohabali M, Tavakoli M, Abdi Goodarzi M, Faghihi F, et al. Frequency of Argasidaeh and Ixodide ticks and determination of their susceptibility to cypermethrin in Meshginshahr. J Ardabil Univ Med Sci Health Serv 2010; 9(2): 127-123 (Persian).
41. Hosseini CA, Dalimi A. Haller's organ: A taxonomic character for differentiating Hyalomma asiaticum and Hyalomma anatolicum ticks (Acari: Ixodidae). Veterinary Research Biological Products (Pajouhesh-va-Sazandegi) 2012; 25(3)(96): 14-21 (Persian).
42. Wu X-B, Na R-H, Wei S-S, Zhu J-S, Peng H-J. Distribution of tick-borne diseases in China. Parasit Vectors 2013; 6(1): 119.
43. Hosseini Chegini Asadollah A, Deilami Asl A, Abdi Goudarzi M. Quantitative study on morphologic characters in five population of hard tick Hyalomma anatolicum (Acari: Ixodidae) in Iran. Plant Pest Research 2012; 1(1): 24-37 (Persian).
44. Riabi H, Atarodi A. Faunistic study of hard ticks (Ixodidae) of domestic ruminants in the Southern Khorasan-e-Razavi in comparing with other regions of the province in 2012 Iran. J Vet Adv 2014; 4(5): 508-515.
45. Williams R, Al-Busaidy S, Mehta F, Maupin G, Wagoner K, Al-Awaidy S, et al. Crimean-Congo haemorrhagic fever: a seroepidemiological and tick survey in the Sultanate of Oman. Trop Med Int Health 2000; 5(2): 99-106.
46. Shastri UV, Deshpande PD. Hyalomma anatolicum anatolicum (Koch, 1844) as a possible vector for transmission of Trypanosoma theileri, Laveran, 1902 in cattle. Vet Parasitol 1981; 9(2): 151-155.
47. Abdigoudarzi M. Detection of naturally infected vector ticks (Acari: Ixodidae) by different species of Babesia and Theileria agents from three different enzootic parts of Iran. J Arthropod Borne Dis 2013; 7(2): 164-172 (Persian).
48. Haque M, Singh N, Rath S. Prevalence of Theileria annulata infection in Hyalomma anatolicum anatolicum in Punjab state, India. J Parasit Dis 2010; 34(1): 48-51.
49. Rafyi A, Rak H. Parasitology of arthropods (entomology). Tehran University Perss. Tehran Iran: 1985 (Persian).
50. Apanaskevich DA, Schuster AL, Horak IG. The genus Hyalomma: VII. Redescription of all parasitic stages of H.(Euhyalomma) dromedarii and H.(E.) schulzei (Acari: Ixodidae). J Med Entomol 2008; 45(5): 817-831.
51. Shemshad M, Shemshad K, Sedaghat MM, Shokri M, Barmaki A, Baniardalani M, et al. First survey of hard ticks (Acari: Ixodidae) on cattle, sheep and goats in Boeen Zahra and Takistan counties, Iran. Asian Pac J Trop Biomed 2012; 2(6): 489-492.
52. Mehravaran A, Moradi M, Telmadarraiy Z, Mostafavi E, Moradi AR, Khakifirouz S, et al. Molecular detection of Crimean-Congo haemorrhagic fever (CCHF) virus in ticks from southeastern Iran. Ticks and Tick-borne Diseases 2013; 4(1-2): 35-38.
53. Al-Deeb MA, Muzaffar SB, Abu-Zeid YA, Enan MR, Karim S. First record of a spotted fever group Rickettsia sp. and Theileria annulata in Hyalomma dromedarii (Acari: Ixodidae) ticks in the United Arab Emirates. Florida Entomologist 2015; 98(1): 135-139.
54. Dantas-Torres F. Biology and ecology of the brown dog tick, Rhipicephalus sanguineus.

- Parasit Vectors. 2010;3(1):26.
55. Dantas-Torres F. The brown dog tick, *Rhipicephalus sanguineus* (Latreille, 1806) (Acari: Ixodidae): from taxonomy to control. *Vet Parasitol* 2008; 152(3-4): 173-185.
  56. Dantas-Torres F, Figueredo LA, Brandão-Filho SP. *Rhipicephalus sanguineus* (Acari: Ixodidae), the brown dog tick, parasitizing humans in Brazil. *Rev Soc Bras Med Trop* 2006; 39(1): 64-67.
  57. Nasibeh HV, Zakkyeh T, Hassan V, Reza YEM, Morteza HV, Ali OM. Survey of tick species parasiting domestic ruminants in Ghaemshahr county, Mazandaran province, Iran. *Asian Pacific Journal of Tropical Medicine* 2010; 3(10): 804-806.
  58. Farhadpour F, Telmadarraiy Z, Chinikar S, Akbarzadeh K, Moemenbellah-Fard M, Faghihi F, et al. Molecular detection of Crimean-Congo haemorrhagic fever virus in ticks collected from infested livestock populations in a New Endemic Area, South of Iran. *Trop Med Int Health* 2016; 21(3): 340-347.
  59. Hosseini-Vasoukolaei N, Oshaghi MA, Shayan P, Vatandoost H, Babamahmoudi F, Yaghoobi-Ershadi MR, et al. Anaplasma infection in ticks, livestock and human in Ghaemshahr, Mazandaran Province, Iran. *J Arthropod-borne Dis* 2014; 8(2): 204-211 (Persian).
  60. Hosseini-Vasoukolaei N, Chinikar S, Telmadarraiy Z, Faghihi F, Hosseini-Vasoukolaei M. Serological and molecular epidemiology of Crimean-Congo hemorrhagic fever in Ghaemshahr county in Mazandaran province; Iran. *Tropical Biomedicine* 2016; 33(4): 807-813.
  61. Chinikar S, Shah-Hosseini N, Khakifirooz S, Rafigh M, Hasanzehi A. Serological and molecular evaluation of Crimean-Congo Haemorrhagic Fever in Iranian probable patients. *Int J Infect Dis* 2012; 16: e250.
  62. Ostfeld RS, Brunner JL. Climate change and Ixodes tick-borne diseases of humans. *Philos Trans R Soc Lond Biol Sci* 2015; 370(1665): 20140051.
  63. Ogden NH, Lindsay LR. Effects of climate and climate change on vectors and vector-borne diseases: ticks are different. *Trends Parasitol* 2016; 32(8): 646-656.
  64. Franke CR, Ziller M, Staubach C, Latif M. Impact of El Niño/Southern Oscillation on Visceral Leishmaniasis, Brazil. *Emerg Infect Dis* 2002; 8(9): 914-917.
  65. Gálvez R, Descalzo MA, Guerrero I, Miró G, Molina R. Mapping the current distribution and predicted spread of the leishmaniosis sand fly vector in the madrid region (Spain) based on environmental variables and expected climate change. *Vector Borne Zoonotic Dis* 2011; 11(7): 799-806.
  66. Hernández C, Ramírez J. Molecular diagnosis of vector-borne parasitic diseases. *Air & Water Borne Diseases* 2013; 2: 110.
  67. Fakoorziba MR, Golmohammadi P, Moradzadeh R, Moemenbellah-Fard MD, Azizi K, Davari B, et al. Reverse transcription PCR-based detection of Crimean-Congo hemorrhagic fever virus isolated from ticks of domestic ruminants in Kurdistan province of Iran. *Vector Borne Zoonotic Dis* 2012; 12(9): 794-799.
  68. Telmadarraiy Z, Saghafipour A, Farzinnia B, Chinikar S. Molecular Detection of Crimean-Congo Hemorrhagic Fever Virus in Ticks in Qom Province, Iran, 2011-2012. *Iran J Virol* 2012; 6(3): 13-18 (Persian).
  69. Fakoorziba MR, Naddaf-Sani AA, Moemenbellah-Fard MD, Azizi K, Ahmadnia S, Chinikar S. First phylogenetic analysis of a Crimean-Congo hemorrhagic fever virus

- genome in naturally infected *Rhipicephalus appendiculatus* ticks (Acari: Ixodidae). *Arch Virol* 2015; 160(5): 1197-1209.
70. Shirani M, Asmar M, Chinikar S, Mirahmadi R, Piazak N, Mazaheri V. Detection of CCHF virus in soft ticks (Argasidae) by RT-PCR method. *J Infect Dis Trop Med* 2004; 9: 11-15.
71. Whitehouse CA. Crimean-Congo hemorrhagic fever. *Antivir Res* 2004; 64(3): 145-160.