

The role of counseling Interventions on different dimensions of Infertile Couples' Health: A Systematic Review

Zeinab Hamzehgardeshi^{1,2,3},
Zohreh Shahhosseini^{1,2},
Maedeh Rezaei^{4,5}

¹ Sexual and Reproductive Health Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

² Associate Professor, Department of Reproductive Health and Midwifery, Nasibe Faculty of Nursing and Midwifery, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

³Traditional and Complementary Medicine Research Centre, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

⁴MSc in Counseling in Midwifery, Student Research Committee, Faculty of Nursing and Midwifery,Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

⁵ Department of Midwifery, Islamic Azad University, Gorgan Branch, Gorgan, Iran

(Received Jul 30, 2018; Accepted January 21, 2018)

Abstract

Background and purpose: Infertility affects different aspects of life such as physical, psychological, social, and economic wellness, thereby leading to tension in personal and interpersonal relationships of couples. On the other hand, stress, conflicts between infertile couples, and sexual problems are among the factors that reduce marital life satisfaction. Counseling is of great benefit in identifying the couples' problems and helps them in making the right decision. The aim of this study was to investigate the role of counseling in improving different dimensions of health of infertile couples.

Methods & Materials: A systematic review was conducted using both electronic databases and hard copy resources. Electronic databases included Google Scholar, SID, Magiran, Irandoc, Barekat, Web of Science, Science Direct, Cochrane Library, ProQuest, Scopus, PubMed (Medline), and Springer using appropriate keywords. Relevant articles published between 1979 and 2016 were studied.

Results: A total of 450 studies was identified of which 44 were selected after final revision. The study resulted in two classifications: primary (different methods of counselling and the effect of intervention) and secondary (type of intervention, frequency of sessions, and content of sessions) classifications.

Conclusion: Counseling techniques (group consultation, cognitive behavioral therapy, and group psychotherapy) and applied methods could be helpful in changing thoughts, attitudes, and beliefs. Therefore, counseling methods could be useful for the health of individuals alongside other infertility treatments.

Keywords: infertility, counseling interventions, life promotion, group counseling, cognitive behavioral therapy, coaching counseling

J Mazandaran Univ Med Sci 2019; 28 (170):225-236 (Persian).

* Corresponding Author: Maedeh Rezaei - Faculty of Nursing and Midwifery, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran (E-mail: Mrezaei332@gmail.com)

نقش مداخلات مشاوره‌ای در ابعاد مختلف سلامت زوجین نابارور:

مرور ساختار یافته

زنیب حمزه گردشی^۱

زهره شاه حسینی^۲

مائده رضایی^۳

چکیده

سابقه و هدف: ناباروری با آسیب به ابعاد مختلف فیزیکی، روانی، اجتماعی و اقتصادی منجر به بروز تنفس در روابط فردی و بین فردی زوجین می‌شود. هم‌چنین بروز استرس، افزایش درگیری‌های بین زن و شوهر و مشکلات در مسائل جنسی از جمله عواملی هستند که در درازمدت زمینه را برای کاهش رضایت از زندگی مشترک ایجاد می‌کنند اما به نظر می‌رسد. مشاوره می‌تواند نقش مهمی در شناسایی مشکلات افراد داشته باشد و در تصمیم برای بهترین انتخاب، کمک کننده باشد. لذا هدف از مطالعه حاضر نقش مداخلات مشاوره در ابعاد مختلف سلامت زوجین نابارور است.

مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر یک مطالعه مرور ساختار یافته بوده که پژوهش‌گران به دو شیوه سرج الکترونیک و سرج از منابع دیگر (کتاب و سرج دستی)، جست و جو را آغاز کردند. پایگاه عمومی جستجو توسط پژوهش‌گران شامل Google scholar و سپس پایگاه‌های اختصاصی‌تر در دسترس نظری SID، Magiran، Irandac، ProQuest، Cochrane Library، Science Direct، Web of Science، Samaneh Danesh Gostar Barekat، Springer و PubMed [including Medline] با استفاده از کلمات کلیدی، مقالات مرتبط از سال ۱۹۷۹ تا ۲۰۱۶ مورد جستجو قرار گرفته است.

یافته‌ها: از ۴۵۰ مطالعه سرج شده، ۴۴ مقاله برای نوشتمن مطالعه حاضر انتخاب شده است. نتایج مطالعه حاضر منجر به سازماندهی در دو طبقه اولیه (بررسی شیوه‌های مختلف مشاوره و تاثیر مداخله) و ثانویه (نوع مداخله، تعداد جلسات، محتوای برنامه) گردید.

استنتاج: روش‌های مشاوره‌ای (مشاوره گروهی، درمان شناختی رفتاری، روان درمانی گروهی) و تکنیک‌های کاربردی در تغییر افکار، نگرش و باورها می‌تواند کمک کننده باشد. لذا به نظر می‌رسد به کارگیری روش‌های مشاوره‌ای توسط مشاوران، روان شناسان و متخصصین خبره می‌تواند به عنوان مکمل در کنار درمان‌های ناباروری نقش به سزایی در میزان سلامت افراد داشته باشد.

واژه‌های کلیدی: ناباروری، مداخلات مشاوره‌ای، ارتقا زندگی، مشاوره گروهی، درمان شناختی رفتاری، مشاوره مربی گری

مقدمه

ناباروری، عدم حاملگی به دنبال یک سال نزدیکی پیشگیری از حاملگی) تعریف می‌شود^(۱،۲). میزان ناباروری در دنیا بین ۱۲ تا ۱۵ درصد است^(۳). این رخداد در سراسر

جنسي محافظت نشده (بدون استفاده از روش‌های ناباروری، عدم حاملگی به دنبال یک سال نزدیکی) مولف مسئول: مائده رضایی - گرگان؛ دانشگاه آزاد اسلامی،

E-mail: Mrezaei332@gmail.com

۱. مرکز تحقیقات سلامت جنسی و باروری، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.
۲. دانشیار، گروه بهداشت باروری و مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی نسبیه، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.
۳. مرکز تحقیقات طب سنتی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.
۴. کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی، گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی نسبیه، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.
۵. کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی، گروه مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

۶. تاریخ دریافت: ۱۳۹۷/۴/۹ تاریخ ارجاع جهت اصلاحات: ۱۳۹۷/۴/۱۹ تاریخ تصویب: ۱۳۹۷/۱۱/۱

بهداشتی فراهم می‌سازد؛ بنابراین کیفیت زندگی بیماران تحت این نگرش‌ها و مشکلات قرار می‌گیرد^(۱۵). از این رو برای کاهش مشکلات، افراد باید مهارت‌های لازم را بیاموزند و این آگاهی از طریق مشاوره حاصل می‌شود بنابراین حضور مشاور در ارتقا دانش افراد و ارتقا بهبود سبک زندگی افراد در مراکز درمان ناباروری کمک کننده است^(۱۰)؛ در واقع مشاور به جستجوی مشکلاتی که در این مسیر ایجاد شده می‌پردازد و برای حل آن‌ها راه حل‌هایی را اتخاذ می‌کند^(۱۶). از آنجایی که در مسیر درمان ناباروری، تمرکز بر فرزندآوری و درمان فیزیکی مد نظر است و با توجه به تاثیرات منفی که در افراد ایجاد می‌شود توجه به روح هم کمک کننده است تا افراد را از شرایط استرس زا دور سازد^(۱۵). به عنوان مثال در مطالعه خیرخواه و پاک گوهر به ترتیب توصیه به پیاده روی و راه کارهایی جهت رضایت جنسی شده که نتیجه مداخله، کاهش استرس و بهبود رضایت جنسی بوده است^(۱۷، ۱۰). از آنجایی که مطالعات مختلف انجام شده تنها به تاثیر یک رویکرد مشاوره‌ای اشاره داشته است^(۱۵) و مطالعاتی که به صورت مرواری یا سیستماتیک به نقش مشاوره در ارتقا سلامت زوجین اشاره کند، محدود بوده است و نتایج این مطالعه نشان داده است مطالعات روان شناختی بررسی شده در بهبود روابط زناشویی، باروری و مسائل روان شناختی موثر بوده است^(۱۸). لذا مطالعه حاضر با هدف مرور ساختاریافته بر نقش مداخلات مشاوره‌ای در ابعاد مختلف سلامت زوجین نابارور انجام شده است. امید است تا گامی در جهت ارتقا سلامت زوجین صورت گیرد.

مواد و روش‌ها

مطالعه مرور ساختاریافته با جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی، ژورنال‌ها و کتاب‌های حاضر از سال ۱۹۷۹ تا ۲۰۱۶ با استفاده از کلید واژه‌های ناباروری، زوجین، مداخلات مشاوره‌ای، ارتقا زندگی، ارتقا سلامت، مشاوره گروهی، درمان شناختی رفتاری، مشاوره مربی گری، به

جهان و در همه فرهنگ‌ها به عنوان یک تجربه استرس زا و بحرانی که تهدید کننده ثبات فردی، خانوادگی، زناشویی و اجتماعی است شناخته می‌شود^(۴). مفهومی چند بعدی و پیچیده دارد و در برگیرنده عوامل ذهنی و عینی است و غالب به عنوان درک شخصی از رضایت در زندگی، سلامت جسمی، سلامت اجتماعی و خانوادگی، امیدواری، آداب معاشرت و سلامت روانی بیمار می‌باشد^(۶، ۵). مطالعات نشان داده یکی از اهداف مهم در کشورهای در حال توسعه، بارداری است^(۸، ۷). بنابراین ناباروری به عنوان عاملی برای آسیب به پیکره بهداشت باروری افراد قلداد می‌شود^(۹). ناباروری با مشکلات جسمی و روحی مانند احساس گناه^(۱۰)، انسروا^(۹)، افسردگی^(۱۱)، اختلال عملکرد جنسی^(۱۲) همراه است. به دنبال این واقعه مشکلات روان‌شناختی که ایجاد می‌شود عاملی برای تشدید ناباروری است^(۱۰).

پیشرفت‌های سریع علمی و پژوهشی در فن کمک باروری و رشد درمانگاه‌های باروری در سراسر جهان انجام شده است و این رشد به منظور درک بیشتر و توجه به نگرانی‌های روانی و نیازهای عاطفی افرادی که از ناباروری رنج می‌برند، صورت گرفته است^(۱۰). رنج ناباروری و تلاش برای رسیدن به اهداف با ناراحتی توأم است^(۱۳) و این رخداد از جنبه‌های مختلف سبب ایجاد فاصله در زوجین شده و در نهایت منجر به کاهش کیفیت زندگی می‌شود^(۱۰). از آنجایی که کیفیت زندگی سالم، جریانی پویا است که در زندگی فرد رخ داده ایجاد می‌شود^(۱۴). لذا عوامل مختلفی در تقلیل کیفیت زندگی موثر است. یکی از آن عوامل، ناباروری می‌باشد که با توجه به بررسی‌های پژوهشی و درمانی و از سویی مشکلاتی مانند مشکلات اقتصادی و درمان طولانی مدت، تاثیر بر جسم، روح، روان و عاطفه، سبب تنش در بیماران می‌شود. هم‌چنین فشار روانی ناشی از مقصر بودن، سبب حاد شدن مشکل در این شرایط شده و زمینه را برای مواردی چون مشکلات اجتماعی و

۳- انتخاب مقالات

مطالعه حاضر یک مطالعه مرور ساختار یافته بوده است. جهت ارائه مقاله حاضر دو پژوهش گر به طور مستقل به جست و جو در پایگاه های اطلاعاتی عمومی همانند Google scholar و سپس پایگاه های اختصاصی تر در دسترس نظری SID، Magiran، Irandac، Web of Science، Danesh Gostar Barekat، ProQuest، Cochrane Library، Science Direct، Springer و PubMed [including Medline] و با استفاده از کلمات کلیدی ناباروری، زوجین، مداخلات مشاوره ای، ارتقا زندگی، ارتقا سلامت، مشاوره گروهی، درمان شناختی رفتاری، مشاوره مربی گری و استراتژی بولین ("Sterility" یا "Reproductive" یا "Health Care Category" و "Couples" و "Infertility" و "Group counseling" یا "Counseling interventions" یا "Life promotion" و "Cognitive behavioral therapy" یا "Cognitive behavioral therapy") مقالات مرتبط از سال ۱۹۷۹ تا ۲۰۱۶ را از آوریل ۲۰۱۸ به مدت سه هفته جست و جو کردند. روش سرج از منابع دیگر نیز به این صورت بوده است که پژوهش گران لیست رفرنس مطالعات جست و جو شده را برای شناسایی مطالعات بیشتر سرج می کردند. سپس دو نویسنده به طور مستقل مقالات را براساس معیارهای ورود ارزیابی کرده، در صورتی که هر گونه مخالفتی پیش می آمد، با بحث سعی می کردند آن را حل کنند و در غیر این صورت از نفر سوم کمک می گرفتند. ابتدا ۴۵۰ مطالعه با توجه به سوال مطالعه و با استفاده از استراتژی بولین جستجو شد و سپس ۵۰ مطالعه پس از محدود کردن استراتژی جستجو و حذف موارد تکراری خارج شد. با استفاده از سرج دستی ۵ مطالعه اضافه شد. پس از بررسی عنوان و خلاصه مقالات، ۱۰۰ مطالعه نامربوط حذف و در نهایت از ۱۰۵ مقاله باقی مانده، ۴۴ مطالعه برای نوشتمن مقاله حاضر استفاده شد (نمودار شماره ۱).

۱-۳- معیار ورود و خروج

مقالاتی که به سلامت زوجین و بررسی مشاوره بر

دو زبان فارسی و انگلیسی انجام گرفته است. سپس با در نظر گرفتن ۴ معیار، مقالات انتخاب و مطالعه مرور ساختار یافته حاضر تدوین شد.

- ۱- شناسایی سوال پژوهش
- ۲- جستجو در پایگاه های اطلاعاتی برای انتخاب مقالات
- ۳- انتخاب مقالات
- ۴- ترسیم نمودار و جدول (۱۹).

۱- شناسایی سوال پژوهش
پس از شناسایی PICOTDS مطالعه حاضر، سوال پژوهشی " انواع مشاوره ناباروری در ارتقای سلامت زوجین نابارور کدامند؟ " جهت جستجو مطالعات نوشته شده است.

P = زوجین نابارور
I = مداخلات مشاوره ای برسلامت زوجین
C = زنان با باروری سالم
O = سلامت زوجین
D = مطالعات کارآزمایی تصادفی شاهددار
TS = Time Study (۲۰۱۶-۱۹۷۹)

S(Study) = مطالعات مداخله ای، مطالعاتی به سبک مشاوره ای، مطالعات مرتبط با سلامت زوجین نابارور

۲- روش جستجو در پایگاه های اطلاعاتی برای انتخاب مقالات پژوهش گران با استفاده از پایگاه های اطلاعاتی Samane، Irandac، Magiran، SID، Google Scholar، Web Of Science، Danesh Gostar Barekat، ProQuest، Cochrane library، Science Direct، Elsevier، Springer، Medline و PubMed و در ژورنال های Subject Heading و مطالعه کتب مرتبط با استفاده از Text word کلید واژه هایی شامل (Mesh) و روش نقش مشاوره ناباروری در ارتقای سلامت زوجین نابارور و با ترکیب آنان با استفاده از استراتژی بولین به جستجوی مقالات پرداختند. مقالات از سال ۱۹۷۹ تا ۲۰۱۶ انتخاب شدند.

یافته ها

مطالعه حاضر به استخراج مطالعات با شیوه مشاوره ای پرداخته است. برای تدوین مطالعه حاضر ابتدا ۴۵۰ مطالعه با توجه به سوال مطالعه جستجو شد و سپس ۵۰ مطالعه پس از محدود کردن استراتژی جستجو و حذف موارد تکراری خارج شد. با استفاده از سرج دستی ۵ مطالعه اضافه شد. پس از بررسی عنوان و خلاصه مقالات، ۱۰۰ مطالعه غیر مرتبط حذف و در نهایت از ۱۰۵ مقاله باقی مانده، ۴۴ مطالعه برای نوشتمن مقاله حاضر استفاده شد. در نهایت ۴۴ مطالعه وارد مطالعه حاضر شدند که ۱۰ مطالعه به صورت مداخله بودند. از این بین ۳ مطالعه به صورت مشاوره گروهی، ۲ مطالعه به درمان شناختی رفتاری، ۱ مطالعه به روان درمانی گروهی، ۱ مطالعه به معنادرمانی و لوگوتراپی، ۲ مطالعه به تمرکز درمانی احساسی و ۱ مطالعه به ذهن درمانی پرداختند.

زوجین نابارور می‌پرداخت وارد شدند. مقالاتی که به صورت مداخله‌ای نبودند یا به بررسی عوامل دیگر نظری اضطراب، افسردگی و عواملی غیر از سلامت زوجین و مشاوره پرداختند از مطالعه حاضر خارج شدند.

۳-۲- جمع آوری داده‌ها

در جستجو مقالات غربالگری عنوان، خلاصه و متن کامل مقالات، صورت گرفت. سپس با استفاده از معیار ورود و خروج مقالات انتخاب و در طبقات مختلف سازمان دهی شدند (جدول شماره ۱).

۴- جداول و نمودار

اطلاعات بصورت جدول و نمودار جمع آوری شده است. اطلاعات در جدول شماره ۱ و ۲ به صورت خلاصه در نمودار شماره ۱ نشان داده شده است.

جدول شماره ۱: توصیف مطالعات وارد شده به مطالعه ساختار یافته

نوسنده	سال	روش مطالعه	شرکت کنندگان	مداخله	پرستشمه	نتجه
پاک گوهر (۱۰)	۲۰۰۸	کارآزمایی بالینی	زنان نابارور	مشاوره	جمعیت شناختی	مشاوره جنسی منجر به بهبود رضایت جنسی زنان گردید.
چوب فروشزاده (۲۰)	۲۰۱۰	نیمه تجزیی	زنان نابارور	درمان شناختی رفتاری	رضایت زناشویی از زیج	اثریخشی درمان مدببریت نتش به شیوه ی
چوب فروشزاده (۲۳)	۲۰۱۱	نیمه تجزیی	زنان نابارور	درمان شناختی رفتاری	ویژگیهای جمعیت شناختی	شناختی رفتاری بر میزان رضایت زناشویی
ویژه (۲۱)	۲۰۱۲	کارآزمایی بالینی	زنان نابارور	مشاوره	جمعیت شناختی	حرایت از جلسات مشاوره ناباروری باعث افزایش رضایت جنسی و زناشویی در زنان نابارور
جلیلی (۲۴)	۲۰۱۵	نیمه تجزیی	زنان نابارور	روان درمانی	رضیت جنسی و زناشویی	روان درمانی وجودی و مداخلات مبتنی بر این رویکرد منجر به بهبود سلامت روان
(۲۵) Mosalanejad	۲۰۱۳	کارآزمایی بالینی	زنان نابارور	معادرنامی گروهی	پرستشمه تگرانی پن است	تائیر رویکرد مداخله ای در بهبود حل مشکلات بیماران و بهبود سلامت روان
سلطانی (۲۶)	۲۰۱۴	مطالعه نیمه تجزیی	زنان نابارور	درمان با تمرکز احساسی	اضطراب و استرس (آس)	درمان با تمرکز احساسی توان میزان استرس را کاهش دهد
مک کوئینی (۲۷)	۱۹۹۷	کارآزمایی بالینی	زنان نابارور	درمان با تمرکز احساسی	احساسی	هر دو مداخله هیجان محور و مسئله محور تغییر تعادل زنان است.
شرق (۲۸)	۲۰۱۶	کارآزمایی بالینی	زنان نابارور	ذهن آگاهی	غنی سازی از زیج	سلامت روانی و رضایت زناشویی را بهبود بخشد.
خبرخواه (۱۷)	۲۰۱۴	کارآزمایی بالینی نصفانی	زنان نابارور	مشاوره گروهی	رضایت زناشویی	تائیر مداخله مشاوره گروهی بر افزایش سازگاری زنان نابارور

جدول شماره ۲: توصیف سایر مطالعات ناباروری

نوسنده	سال	روش مطالعه	شرکت کنندگان	مداخله	پرستشمه	نتجه
شیخان (۷)	۲۰۱۱	توصیفی مقاطعی	زنان نابارور	-	دموگرافیک	دانش در مورد درمان های ناباروری، توانستن سازی زنان، روابط صمیمی می تواند به زوج های نابارور کمک و خشونت را کاهش دهد.
گلی (۲۹)	۲۰۱۲	مقاطعی	زنان نابارور	-	اطلاعات دموگرافیک و سوالات مربوطه به	خشونت جنسی فرزند دار شدن بر زنان و کیفیت زندگی آنان اهمیت فراوان دارد.
سرگلزاری (۱۱)	۲۰۰۴	مقاطعی	زنان نابارور	-	پرستشمه عملکرد کلی جنسی	بین نمره افسردگی و اختلال عملکرد جنسی رابطه ای وجود نداشت که نشان می دهد اختلال عملکرد جنسی در آنان مستقل از افسردگی است.
پونسی (۴)	۲۰۰۲	مورد شاهدی	زنان نابارور	-	پرستشمه سنجش تصویر ذهنی از جسم	تصویر ذهنی از خود یا بدن خود می تواند با اضطراب و علامت افسردگی همراه باشد . در این زینه روشن و تکنکیهای شناختی رفتاری، تا حد زیادی علامت را کنترل می نمایند.
پوندی (۳۰)	۲۰۱۱	توصیفی	زنان نابارور	-	اضطراب افسردگی رضایت مندی زناشویی	تائیر حضور روانشناسان بالینی و مخصوصان در مراکز ناباروری برای سازگاری افراد با استرس ناشی از نازایی


با فواصل یک هفته‌ای و مدت زمان یک ساعته برگزار شد. محتوای جلسات شامل تعریف ناباروری، روش‌های درمانی، تاثیرات ناباروری بر زندگی، روش‌های مقابله‌ای، کمک جهت افزایش رضایت جنسی، آموزش مهارت حل مشکل، عوامل موثر در افزایش رضایت جنسی بود. نتایج در پس آزمون و فالوآپ سه ماهه نشان داد افراد نابارور به مرحله‌ای از سلامتی و سازش بین فردی می‌رسند. هم‌چنین رضایت جنسی و رضایت زناشویی در آنان افزایش یافته است (۲۱، ۱۷، ۱۰).

۱-۲- درمان شناختی رفتاری (Cognitive Behavioral Therapy: CBT)

این تکنیک به بیماران کمک می‌کند تا نگرش منفی خود را شناسایی کنند و رفتارهای جدید توسعه یابد و زمینه برای احساس بهتر شدن فراهم شود. از طریق این تکنیک استراتژی کاربردی برای درمان و زندگی بهتر مهیا می‌شود این شیوه تنها به افکار و نگرش محدود می‌شود (۲۲)، در صورت ترکیب این شیوه با روش‌های آرمیدگی، تصویر سازی ذهنی مدیریت تنش، به شیوه شناختی رفتاری نام می‌گیرد. هم‌چنین انجام روش‌هایی برای کاهش اضطراب با رویکرد شناختی رفتاری مانند بازسازی شناختی، آموزش اثر بخشی مقابله‌ای، مدیریت خشم در این تکنیک استفاده می‌شود که به طور هم‌زمان به عوامل فیزیکی و روان شناختی توجه می‌شود (۲۰). دو مطالعه با محتوای فوق با تعداد جلسات ۱۰ جلسه و مدت زمان دو ساعته به استفاده از این تکنیک در بیماران نابارور پرداختند و نتایج نشان داد که تغییر نگرش و باورها در بهبود رضایت زناشویی و کیفیت زندگی افراد می‌تواند مفید واقع شود (۲۳، ۲۰).

۱-۳- روان درمانی گروهی

در سبک گروهی درمانی حضور اعضای خانواده، همسر فرد نابارور و دوستان می‌توانند مفید واقع شود (۹). در این جلسات راه کارهایی را در سه طبقه به زوجین، فرد نابارور و به خانواده، دوستان و آشنایان ارائه



نمودار شماره ۱: فرآیند ورود و خروج مطالعات

۱- یافته‌های مطالعه (انواع مطالعات و توصیف آن)

۱-۱- مشاوره گروهی

در روند مشاوره گروهی، موقعیتی ایجاد می‌شود تا افرادی که مشکلات مشابه دارند حضور داشته باشند تا به بحث درباره مشکلات خود پردازنند و از تجارت دیگر اعضا استفاده کنند (۱۰). بیماران زمانی از گروه درمانی سود می‌برند که رابطه اعتماد آمیز توان با احترام و پذیرش بین آنها و درمان گر تشکیل شود (۳۱). چنین گروه مشاوره‌ای می‌تواند موجب اشتراک گذاری تجربیات، دریافت اطلاعات، بهبود مهارت‌های ارتباطی، یادگیری تکنیک‌های آرام سازی و یا ارائه سایر اشکال حمایت روانی شود (۳۲).

از این‌رو در سه مطالعه جلسات مداخله‌ای به صورت گروهی و مشاوره به شکل فردی در سه جلسه

در دو مطالعه، جلسات به صورت ۶ و ۱۰ جلسه با محتوای شناسایی الگوهای ارتباطی، بازسازی پیوند زوج، فعال‌سازی، راه حل‌های جدید برای مشکلات قدیمی و غیره برگزار شد. نتایج نشان داد حال روحی بیماران بعد از مداخله بهتر بوده است و استرس کاهش یافته است (۲۷، ۲۶).

۱-۶- برنامه مبتنی بر ذهن آگاهی برای ناباروری
Mindfulness-Based Program for Infertility (MBPI)

این سبک درمانی به ارتقای روان شناختی با شیوه سازش و انعطاف‌پذیری اشاره دارد. محتوای این روش شامل آگاهی از احساسات، افکار، توجه به بدن و حرکات آن، کشش بدن به دنبال آرام‌سازی مانند یوگا صورت می‌گیرد و فرد به مرحله‌ای از آگاهی و تعادل می‌رسد. نکته قابل توجه این است که در تمام طول مدت تمرین، به فرد آموزش مهربانی (loving kindness) داده می‌شود و فرد در طول تنفس آن را تکرار می‌کند. این سبک با توجه به تمرکز بر آگاهی از احساسات بدن، افکار و هم چنین ابزار مقابله‌ای رفتاری منجر به کاهش علائم روان در بیماران می‌شود (۳۴-۳۹). این برنامه در یک مطالعه شامل ۱۰ جلسه دو ساعته با محتوای مراقبه ذهن آگاهی (mindfulness meditation)، مدیتیشن، عوامل روان شناسی در مورد سبک زندگی سالم (ورزش، تغذیه، کافین)، تجربیات ناباروری و اهداف زندگی ارزشمند و غیره بوده است. نتایج نشان داد بیماران از احساس بهتری نسبت به مسائل روان و جنسی برخوردارند (۲۸).

بحث

با رعایت سبک نگارش به شیوه مرور ساختار یافته و قرار گیری مطالعات مداخله‌ای مبتنی بر مشاوره، ۱۰ مطالعه در کنار هم قرار داده شد. ۸ مطالعه در ایران و ۲ مطالعه دیگر در کشورهای دیگر انجام شد. مطالعه مرور ساختار یافته حاضر به شناسایی انواع مداخلات مرتبط به شیوه مشاوره پرداخته است.

می‌شود. در بخش راه کار، به زوجین، در مورد صمیمت در ارتباط، سوال کردن نیازهای همدیگر، شناخت تفاوت بین زنان و مردان، مشارکت در درمان، آشنایی با مهارت‌های لازم آموزش داده می‌شود.

در بخش توصیه، به افراد نابارور، ارائه راه کارهایی هم چون شرکت در کلاس‌های ناباروری، حضور در گروه‌های حمایتی، پرداختن به کارهای مورد علاقه خود، ملاقات افراد جدید و کتاب خوانی توصیه می‌شود. در بعد آگاهی به خانواده و اطرافیان گفته می‌شود که مهم‌ترین رویکرد، درک و حمایت آنان نسبت به افراد نابارور است (۳۳). در یک مطالعه روان درمانی گروهی که در ۸ جلسه گروهی و با محتوای افزایش خود آگاهی، پرداختن به معنای زندگی، آگاهی از متناهی بودن، بحث در مورد تنهایی برگزار شد. نتایج نشان داد برگزاری جلسات در تاب آوری افراد و سلامت روان آنان مفید بوده است (۲۴).

۱-۴- معنا درمانی یا لوگوتروپی

برای کاهش علائم روانی و نگرانی زوجین نابارور از تکنیک لوگوتروپی برای کاهش استرس استفاده می‌شود. روان درمانی وجودی برای افراد با اختلالات روانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این رویکرد، باعث افزایش حس هدف و توانایی برای مقابله با درد و رنج و استرس می‌شود. در مطالعه‌ای که با این سبک در ۱۲ جلسه دو ساعته انجام شده است نشان داده شد علائم سایکیاتریک بیماران کاهش یافته است (۲۵).

۱-۵- درمان هیجان محور (EFT)

در این روش از زوجین خواسته می‌شود تا احساسات خود را بازگو کنند و به بحث در مورد موضوع در هر جلسه پردازنند و درنهایت تاکید به بازسازی احساسات بین زوجین برای ارتباط بهتر و بیشتر می‌شود. پاسخ‌های عاطفی می‌تواند به تحقق نیازهای فرد منجر شود و بر این اساس، بهبود آگاهی فرد نسبت به احساسات اساسی ترین هدف این درمان است.

گروه مورد زنان رضایت جنسی در سطح متوسط، ۳۴/۹ درصد در سطح ضعیف و ۱۱/۶ درصد رضایت جنسی در سطح خوب را بیان کردند اما ۳ ماه پس از مداخله رضایت جنسی، رضایت متوسط (۲۷/۹ درصد)، ضعیف (۲۵/۶ درصد) و خوب (۴۶/۵ درصد) گزارش شد. بنابراین تفاوت آماری در گروه مداخله و کنترل مشاهده شد (۱۰). این نتایج نشان می‌دهد حضور افراد متخصص برای آموزش مهارت‌های لازم در زمینه حل تعارضات و سازگاری موثر و مفید می‌باشد (۳۰). بنابراین مشاوره بر روابط زناشویی زنان نابارور در طی ۳ جلسه یک ساعته و با فاصله یک هفته به شیوه سخنرانی، بحث، پرسش و پاسخ نشان داد که رضایت زناشویی در گروه مشاوره در قبل و بعد از مداخله از سطح متوسط به خوب تغییر کننده است و این امر نشانه‌ای از بهبود سلامت در زمینه روان و مسائل جنسی است (۴۴، ۲۱). اما نکته حائز اهمیت وجود مشکلات بین فردی در بین زوجین است. بنابراین استفاده از سبک روان درمانی گروهی که با بحث و ارائه اطلاعات به اعضا و هم‌چنین شناسایی تفاوت‌های بین فردی منجر به درک و شناخت متقابل زوجین می‌شود، می‌تواند در کاهش تنفس و افزایش تاب‌آوری بیماران موثر باشد. مطالعه جلیلی و همکاران با این سبک فوق هم‌سو است (۲۴). علاوه‌براین؛ مطالعات نشان داده است ناباروری بروز نش و مشکلات جسمی و روحی را در بین زوجین به وجود می‌آورد (۱۰)، بنابراین توجه به هر دو بعد جسم و روان می‌تواند علاوه بر بهبود شرایط باروری، منجر به بهبود ارتباط بین فردی و در نهایت سلامت زوجین شود که در سبک MBPI با استفاده از محتوای جلسات در قالب توجه به جسم و روان، به این موضوع پرداخته است. در این سبک، ارتقای آگاهی بیمار به احساسات خود و توجه به آن از عواملی است که به آن پرداخته است، چرا که این آگاهی می‌تواند نقش به سزاگی در تصمیم بیمار در زمان مشکلات داشته باشد. هم‌چنین استفاده از ورزش‌هایی مانند یوگا می‌تواند در آرامش افراد نقش موثری داشته باشد. مطالعه

مطالعات مختلف نشان داده است به دلیل ایجاد بحران‌هایی که فرد نابارور دچار می‌شود (۴۰)، و از جمله موقعیت استرس‌زاگی که سبب کاهش کنترل احساس درونی در فرد می‌شود (۱۰) اعتماد به نفس فرد متزلزل شده و افراد در تنفس با خود و دیگران قرار می‌گیرند (۴۱). لذا حضور مشاور یا روان‌شناس و یک فرد متخصص در این زمینه سبب فراهم آوردن سازگاری افراد با پدیده ناباروری می‌شود. در واقع در این شیوه از سه عامل کنترل ادراک، استراتژی مقابله و حمایت اجتماعی استفاده شده و با استفاده از این سه عامل به جلوگیری از استرس در افراد می‌پردازد (۴۲). هم‌چنین عاملی که افراد را در چالش این قضیه پای بند می‌کند بازه‌های افکار منفی است که در فرد تداعی می‌شود. بنابراین اقدامات درمانی در جهت آموزش افکار برای کاهش خودآسیبی در افراد نابارور مناسب است. در واقع بیان احساسات، هیجانات و پاسخ به آن در کاهش استرس بیماران نقش دارد که مطالعه Soltani و McQueeney با سبک فوق که بر پایه درمان هیجان محور است هم‌سو می‌باشد (۲۷، ۲۶).

در واقع استفاده از روش‌های درمانی آموزشی افکار، آموزش شیوه حل مساله و روش‌های آموزشی مساله گشا مانند تکنیک شناختی رفتاری (۴۳) سبب جایگزین کردن افکار سازگار در افراد می‌شود (۴۲) که با مطالعه چوبفروش و همکاران هم راستا است (۲۰). از سویی مشاوره در ایجاد قدرت سازش نقش بهسزاگی دارد زیرا افراد را با بحران‌های بیماری و شرایط ایجادی آشنا و راه‌های مناسب را برای حل آن اتخاذ می‌کند. یکی از محتوای برنامه، توصیه به پیاده روی و دوری از استرس‌های غیرضرری و هم‌چنین جایگزین کردن موقعیت‌های مناسب بوده است. مطالعه خیرخواه و همکاران با این سبک از مطالعه هم‌سو است (۱۷).

اما در مطالعه پاک گوهر که به تاثیر مشاوره بر رضایت جنسی بیماران پرداخته بود؛ در طی ۲ جلسه با فاصله هفتگی برای افراد راه کارهای رضایت جنسی ارائه می‌شد. نتایج نشان داد که در قبل از مداخله در

کاربرد در بالین

مطالعه حاضر به نقش مداخلات مشاوره‌ای در ابعاد مختلف سلامت زوجین نابارور پرداخته است. با توجه به اثرات روحی و جسمی مشکلاتی که در مسیر درمان برای افراد ایجاد می‌شود، بیان و کاربرد شیوه‌های مشاوره‌ای برای بیماران از دو جهت مهم به نظر می‌رسد که شامل سلامت روحی-روان و کاهش مشکلات بین فردی افراد می‌شود لذا استفاده از تکنیک‌های مشاوره‌ای و افراد دارای فن در این زمینه مانند مشاورین در مراکز درمانی ناباروری مناسب می‌باشد.

کاربرد در پژوهش

این مطالعه مژوری به شناسایی انواع مداخلات مشاوره‌ای در ابعاد مختلف سلامت زوجین نابارور پرداخته است. از یافته‌های این مطالعه می‌توان برای طراحی، اجرا و ارزشیابی مداخلات با کیفیت استفاده کرد. علاوه بر این توصیه به انجام مطالعه متا آنالیز مرتبط با انواع مداخلات مشاوره‌ای در ابعاد مختلف سلامت زوجین نابارور می‌شود.

سپاسگزاری

این پژوهه توسط دانشگاه علوم پزشکی مازندران حمایت شده است. این مطالعه مژور ساختاریافته در کمیته دانشجویی با کد طرح ۹۵/۳۴۸ و کد اخلاقی به شماره IR.MAZUMS.REC.95.S.348 مصوب شد. ما از کمیته دانشجویی تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی مازندران برای حمایت از این مقاله تشکر می‌کنیم. همچنین از خانم فرشته یزدانی به پاس مساعدتشان تشکر می‌کنیم.

References

1. Berek JS. Berek & Novak Gynecology. Translate by; Ghazijahani B, Zonuzi A, Bahrami N. Tehran: Golban; 2007. p. 471-501 (Persian).
2. Sohrabvand F, Nazem E, Tansaz M, Keshavarz M, Hashem Dabaghian F, Nikbakht Nasrabad A, et al. Investigation of

Shargh و همکاران هم سو با سبک فوق است و نتایج نشان داد بیماران از شرایط روان بهتری برخوردارند(۲۸). در نهایت نتایج مطالعه حاضر هم نشان داده است حضور مداخلات مبتنی بر مشاوره که به مقوله مهم سلامت اشاره دارند منجر به سلامت جسم و روان در بیماران می‌شود و تاثیر مثبت مداخلات نه تنها در زندگی فردی، بلکه زندگی بین فردی و اجتماعی بیماران هم مشاهده می‌شود که می‌تواند نقش کلیدی در نتیجه درمان بیماران نیز داشته باشد.

در پایان می‌توان نتیجه گیری کرد که مطالعه حاضر به نقش انواع مداخلات مشاوره‌ای در ابعاد مختلف سلامت زوجین نابارور پرداخته است. یافته‌های این مطالعه نشان داد که حضور مداخلات به شیوه مناسب (نوع مداخله، طول مدت جلسات، محتوای برنامه) در بهبود رضایت جنسی، سازش بین فردی، بهبود کیفیت زندگی، کاهش استرس و بهبود سلامت روان نقش دارد. لذا با توجه به اهمیت ابعاد مختلف سلامت در زوجین نابارور، مطالعات مداخله‌ای بیشتری با روش مناسب و ادغام سبک‌های مداخله‌ای در کنار درمان پیشنهاد می‌شود.

از نقاط قوت مطالعه حاضر بررسی مقالات مختلف مشاوره‌ای در ناباروری بوده است که تیم تحقیق سعی داشته است به جزئیات مهم، نظری نوع مداخله، محتوا و نتایج پردازد. هم‌چنین تیم تحقیق جداولی را جهت معرفی مقالات مختلف به سبک سیتماتیک طراحی کرده است. مطالعاتی که قابل خرید و دانلود نبودند از مطالعه حاضر خارج شده‌اند.

the Personal and Uterine Humor in infertile women referred to Vali-E-As Hospital of Tehran, Iran in 2012. Iran J Obstetr Gynecol Infert 2014; 17(94): 10-19 (Persian).

3. Hamzehgardeshi Z, Shahhosseini Z, Samadaee Gelehkolae K. Lifestyle and Outcomes of

- Assisted Reproductive Techniques: A Narrative Review. *Glob J Health Sci* 2015; 7(5): 11-22.
4. Latifnejad RR, Rasolzadeh BM, Mousavifar N, Modarres GM. The effect of collaborative counseling on perceived infertility-related stress in infertile women undergoing IVF. *Iran J Obstet Gynecol Infert* 2011; 14(4): 22-31 (Persian).
 5. Baljani E, Kazemi M, Amanpour E, Tizfahm T. A survey on relationship between religion, spiritual wellbeing, hope and quality of life in patients with cancer. *Evidence Based Care Journal* 2011; 1(1): 51-62 (Persian).
 6. Karimi FZ, Taghipour A, Latifnejad Roudsari R, Kimiae SA, Mazloum SR, Amirian M. Psycho-social effects of male infertility in Iranian women: a qualitative study. *Iran J Obst Gynecol Infert* 2016; 19(10): 20-32 (Persian).
 7. Sheikhan Z, Ozgoli G, Azar M, Hosseini F, Nasiri M, Amirii S. Prevalence of sexual violence among infertile women. *Advanc in Nursing & Midwifery* 2014; 23(81): 5836.
 8. Amirian M, Mazloum SR, Laal Ahangar M. Comparison of marital satisfaction in fertile and infertile couples and its relationship with sexual problems. *Iran J Obstetr Gynecol Infert* 2015; 18(143): 1-10.
 9. Uonesi J, Salajagheh A. Body image of body in fertile and infertile women. *J Reprod Infert (JRI)* 2002; 2(4): 14-21 (Persian).
 10. Pakgohar M, Vizheh M, Babaee G, Ramezan-zadeh F, Abedinia N. Effect of counseling on sexual satisfaction among infertile women referred to Tehran fertility center. *Hayat* 2008; 14(1): 21-30. (Persian)
 11. Sar Golzaee M, Arshadi H, Javidi K, Karimi S, Fayazi bordbar M, Moharari F. psychosexual disorders and depression in women infertillity to Mashhad Infertility Treatment Center. *Journal Reproduction and infertillity* 1380; 2(4)(8): 46-51. (Persain)
 12. Tabrizi G, Tabrizi S, Vatankhah M. Female infertility resulting in sexual disorders and wife abuse. *Pazhuheshname-ye Zanan* 1389; 1(2): 1-9.(Persian)
 13. Hasanpoor Azghdy SB, Simbar M, Vedadhir A, Rashid BH. Psychological impact of infertility among infertile women. *Advances in Nursing & Midwifery* 2014; 23(83): 801 (Persian).
 14. Nourani S, Joneidy E, Shakeri MT, Mokhber N. Comparison of Quality of life in Fertile and Infertile Women Referred to the Public Clinics in Mashhad. *Iran J Obstetr Gynecol Infert* 2012; 15(7): 24-31 (Persian).
 15. Choobforoushzade A, Kalantari M, Molavi H. The effectiveness of cognitive behavioral stress management therapy on quality of life in infertile women. *Iran J obstet Gynecol Infertil* 2011; 14(1): 14-20 (Persian).
 16. Valiani M, Abediyan S, Ahmadi SM, Pahlavanzadeh S, Hassanzadeh A. The effect of relaxation techniques to ease the stress in infertile women. *Iran J Nurs Midwif Res* 2010; 15(4): 259-264 (Persian).
 17. Kheirkhah M, Vahedi M, Jenani P. The Effect of Group Counseling on Infertility Adjustment of infertile women in Tabriz Al-Zahra clinic. *Iran J Obstetr Gynecol Infertil* 2014; 17(113): 7-14 (Persian).
 18. Chow KM, Cheung MC, Cheung IK. Psychosocial interventions for infertile couples: a critical review. *J Clin Nurs* 2016; 25(15-16): 2101-2113.
 19. Rezaei M, Elyasi F, Janbabai G, Moosazadeh M, Hamzehgardeshi Z. Factors Influencing Body Image in Women with Breast Cancer: A Comprehensive Literature Review. *Iran Red Crescent Med J* 2016; 18(10):

- e39465 (Persian).
20. Choobforoushzadeh A, Kalantari M, Molavi H. The effectiveness of cognitive behavioral stress management therapy on marital satisfaction in infertile women. *J Fundam Ment Health* 2010; 12(3)(47): 596-603 (Persian).
 21. Vizheh M, Pak Gohar M. The effect of Infertility consultation sessions on the Marital relationship among infertile women. *Nurs Dev Health.* 2012; 1(1): 76-89 (Persian)
 22. Beck JS. Cognitive therapy: Wiley Online Library; 1979.
 23. Choobforoushzadeh A, Kalantari M, Molavi H. The Effectiveness of Cognitive Behavioral Therapy Management on the Quality of Life of Infertile Women (persian). *J Fundam Ment Health* 2011; 14(1): 14-21 (Persian).
 24. Jalili N, Rezaie Z, Nejati Nezhad N, Ghasemi Jobaneh R, Nooryan k. Effectiveness of Existential Psychotherapy in Increasing the Resiliency of Infertile Women. *Armaghan-Danesh* 2015; 2(5): 453-459 (Persian).
 25. Mosalanejad L, Khodabakshi Koolee A. Looking at Infertility Treatment through The Lens of The Meaning of Life: The Effect of Group Logotherapy on Psychological Distress in Infertile Women. *Int J Fertil Steril* 2013; 6(4): 224-231 (Persian).
 26. Soltani M, Shairi MR, Roshan R, Rahimi CR. The impact of emotionally focused therapy on emotional distress in infertile couples. *Int J Fertil Steril* 2014; 7(4): 337-344 (Persian).
 27. McQueeney DA, Stanton AL, Sigmon S. Efficacy of emotion-focused and problem-focused group therapies for women with fertility problems. *J Behav Med* 1997; 20(4): 313-331.
 28. Sharq N, Bakhshani NM, Mohebbi MD, Mahmudian K, Ahavan M, Mokhtari M, et al. The Effectiveness of Mindfulness-Based Cognitive Group Therapy on Marital Satisfaction and General Health in Woman With Infertility. *Glob J Health Sci* 2016; 8(3): 230-235.
 29. Goli M, Firozeh F, Ahmadi S. Quality of Life and Its Related Factors in Infertile Women of Isfahan 2008. *J Ilam Univ Med Sci* 2012; 20(3): 63-70 (Persian).
 30. Peyvandi S, Hosseini SH, Daneshpour MM, Mohammadpour RA, Qolami N. The Prevalence of depression, anxiety and marital satisfaction and related factors in infertile women referred to infertility clinics of Sari city in 2008. *J Mazandaran Univ Med Sci* 2011; 20(80): 26-32 (Persian).
 31. Kaplan H, Sadock B. Synopsis of Psychiatry: Behavioral Sciences Clinical psychiatry. Williams and Wilkins Co, 2007.
 32. Van den Broeck U, Emery M, Wischmann T, Thorn P. Counselling in infertility: individual, couple and group interventions. *Patient Educ Couns.* 2010; 81(3): 422-428.
 33. Mohammadi MR, Khalajabadi Farahani F. Emotional and psychological problems of infertility and strategies to overcome them. *J Reprod Infert* 2001; 2(4)(8): 33-39 (Persian).
 34. Shapiro SL, Bootzin RR, Figueiredo AJ, Lopez AM, Schwartz GE. The efficacy of mindfulness-based stress reduction in the treatment of sleep disturbance in women with breast cancer: an exploratory study. *J Psychosom Res* 2003; 54(1): 85-91.
 35. Shapiro SL, Schwartz GE, Bonner G. Effects of mindfulness-based stress reduction on medical and premedical students. *J Behav Med* 1998; 21(6): 581-599.
 36. Carlson LE, Speca M, Patel KD, Goodey E. Mindfulness- based stress reduction in relation to quality of life, mood, symptoms of stress, and immune parameters in breast and prostate cancer outpatients. *Psychosom Med*

- 2003; 65(4): 571-581.
37. Cramer H, Lauche R, Paul A, Dobos G. Mindfulness-based stress reduction for breast cancer—a systematic review and meta-analysis. *Curr Oncol* 2012; 19(5): e343-e343.
38. Grossman P, Niemann L, Schmidt S, Walach H. Mindfulness-based stress reduction and health benefits: A meta-analysis. *J Psychosom Res* 2004; 57(1): 35-43.
39. Huang J, Shi L. The effectiveness of mindfulness-based stress reduction (MBSR) for survivors of breast cancer: study protocol for a randomized controlled trial. *Trials* 2016; 17(1): 209.
40. Faramarzi M, Pasha H, Esmailzadeh S, Kheirkhah F, Heidary S, Afshar Z. The effect of the cognitive behavioral therapy and pharmacotherapy on infertility stress: a randomized controlled trial. *Int J Fertil Steril* 2013; 7(3): 199-206 (Persian).
41. Karami Nori R, Akhondi MM, Behjati Ardakani Z. Socio-psychological aspects of the infertility from the perspective of Iranian physicians. *J Reprod Infert* 2002; 2(3): 13-25 (Persian).
42. Farahani M, Zarei Masoumeh. Psychological aspects of dealing and coping with infertility and the role of psychologist (in persian). *J Reprod Infertil* 2002; 14(4): 202-206 (Persian).
43. Mazaher MA, Kayghobadi F, GHashang N, Pato M, Faghihi Imani Z. Problem solving strategies and marital adjustment in infertile couples. *J Reproduc Infertil* 2001; 2(4)(8): 22-32 (Persian).
44. Yazdani F, Elyasi F, Peyvandi S, Moosazadeh M, Galekolae KS, Kalantari F, et al. Counseling-supportive interventions to decrease infertile women's perceived stress: A systematic review. *Electron Physician* 2017; 9(6): 4694-4702.