

مقایسه مقادیر اسپرومتری اندازه گیری شده افراد سالم بالای ۱۸ سال با استانداردهای جهانی در ساکنین شهر ساری، سال ۱۳۸۰

احمد علیزاده (M.Sc.)⁺ سیاوش اعتمادی نژاد (M.D.)^{**} رضا علی محمدپور (Ph.D.)^{***}

چکیده

سابقه و هدف: پیشرفت‌های تکنولوژی اسپرومتری را به یک وسیله قابل اعتماد، نسبتاً ساده و در دسترس جهت تشخیص و پیگیری اختلالات ریوی تبدیل نموده است. یکی از مسائل بنیادین در استفاده از این آزمون، مقایسه مقادیر به دست آمده از شخص با مقادیر استاندارد می‌باشد. مقادیر استاندارد تحت تاثیر فاکتورهای متعددی قرار دارد به طوری که امروزه تاکید می‌شود که هر مرکز این مقادیر را با مطالعه بر روی افراد سالم منطقه خود به دست آورد. بنابراین محققین شاخص‌های مهم اسپرومتری افراد سالم ساکن شهر ساری ($FVC-FEV_1-FEV_{25-75}$) را با چند استاندارد جهانی (ITS-Eccs-Knudson-Morris) مقایسه کرده تامل مشخص گردد با کدام یک از آنها مطابقت بیش‌تری دارد.

مواد و روش‌ها: پس از برآورد تعداد نمونه با روش نمونه‌گیری تصادفی، ۵۰۷ نفر از ساکنین شهر ساری انتخاب شدند. ابتدا مشخصه‌های دموگرافیک نمونه‌ها ثبت و سپس با دستگاه اسپرومتر مدل fukuda sangyo ساخت کشور ژاپن، آزمون اسپرومتری بر اساس معیارهای ATS صورت گرفت. نتایج با استفاده از نرم افزار spss و آزمون‌های زوجی و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شد.

یافته‌ها: نتایج نشان داد میانگین پارامترهای مردان بیش‌تر از زنان و حداکثر مقدار در گروه سنی ۲۰ تا ۳۰ سال بود. هم‌چنین همبستگی شدیدی بین قد با پارامترها وجود داشت به طوری که با افزایش قد پارامترهای اندازه‌گیری شده افزایش می‌یافت. اما این همبستگی در ارتباط با وزن و پارامترها وجود نداشت. هم‌چنین نتایج نشان داد که این پارامترها بیشترین همبستگی را با استاندارد Eccs دارند.

استنتاج: نتایج نشان داد پارامترهای جامعه مورد مطالعه با سطح اطمینان ۹۹ درصد با استاندارد Eccs از همبستگی بالایی برخوردار می‌باشد و استانداردهای دیگر از جمله (ITS-Knudson-Morris) در مراحل بعدی قرار دارند. پیشنهاد می‌شود تحقیقات وسیع‌تری در این خصوص صورت گیرد.

واژه‌های کلیدی: استاندارد، اسپرومتری، بالغین، ساری

⁺ این تحقیق طی شماره ۸۹-۸۳ در شورای پژوهشی دانشگاه ثبت شده و با حمایت مالی دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام شده است.

* کارشناس ارشد بهداشت حرفه‌ای عضو هیات علمی (مری) دانشگاه علوم پزشکی مازندران ⁺ ساری کیلومتر ۱۸ جاده خزر آباد- دانشکده بهداشت

** متخصص طب کار، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

*** دکتر آمار حیاتی، عضو هیات علمی دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی مازندران

تاریخ دریافت: ۸۴/۱۱/۲۳ تاریخ ارجاع جهت اصلاحات: ۸۵/۳/۲۲ تاریخ تصویب: ۸۵/۷/۴

مقدمه

اسپرومتری یک ابزار قوی جهت ارزیابی کارکرد ریه می باشد و نیز در پیگیری درمان و سیر بسیاری از بیماری های ریوی و در بسیاری از موارد در مسائل حقوقی نظیر غرامت ها، میزان نقص عضو، از کار افتادگی و هم چنین تناسب شغلی افراد به کار می رود (۱-۴). یکی از مسائل بنیادین در استفاده از این آزمون، مقایسه مقادیر به دست آمده از شخص با مقادیر استاندارد (پیش بینی شده) می باشد. مقادیر استاندارد تحت تاثیر فاکتورهای متعددی از جمله نژاد، سن، جنس، قد و وزن می باشد (۲-۴). امروزه مشخص شده که فاکتورهای متعدد دیگری نظیر فاکتورهای محیطی (مثل نوع آب و هوا، آلاینده های محیطی و...) نیز بر این مقادیر موثر بوده و باید لحاظ شوند (۴،۳).

لازم به ذکر است که تفاوت های قابل توجهی بین مقادیر استاندارد شده در فرمول های مختلف وجود دارد، که این اختلافات ممکن است حتی به ۲۰ درصد هم برسد (۵).

جهت تعمیم مقادیر به دست آمده، مقادیر استاندارد باید با مطالعه روی جمعیتی که بسیار نزدیک به جمعیت مورد نظر می باشد، تعیین گردد (۳). گرچه توصیه می شود که استانداردها توسط کشورها تعیین گردند (۲)، اما امروزه تاکید شده که هر منطقه این مقادیر را با مطالعه بر روی افراد سالم منطقه خود به دست آورد (۳). نتایج بررسی Castellsague و همکاران (۱۹۹۸) در اسپانیا نشان داد که حتی در میان اروپائیان با نژادهای مختلف، مقادیر پیشنهادی متفاوتی برای حجم های ریوی وجود دارد (۶).

در بررسی که نظریان (۱۳۷۲) بر روی ۴۱ دانشجوی پزشکی مذكر (۲۳ تا ۲۶ سال) دانشگاه زنجان انجام داد، میانگین FVC اندازه گیری شده جامعه مورد مطالعه ۹۰

درصد میانگین حد انتظار بود (۷). نتایج تحقیق گلشن و نعمت بخش (۲۰۰۰) در اصفهان نشان داد که مقادیر استاندارد پیشنهادی حجم های ریوی آمریکائیان و اروپائیان برای بالغین اصفهانی که کمی بیشتر برآورد می شود، مناسب می باشد. اگرچه میزان جریان (flow-rate) در اصفهانی ها با لاتر بوده و می بایست پائین حد تشخیص LLN غیر نرمال در نظر گرفته شود (۸).

در یک مطالعه گسترده طی سال های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۳ در تایوان مشخص شد که مقادیر FEV_1 -FVC در چینی ها نسبت به سفید پوستان با سن و قد مشابه پائین تر می باشد (۹). هم چنین نتایج gore و همکاران بر روی جامعه استرالیائی نشان داد که مقادیر پیشنهادی نژاد قفقازی برای استرالیایی ها مطابقت و کاربرد دارد (۱۰). مطالعه chin Nk و همکاران بر روی ۴۰۶ فرد سالم (۷۹ تا ۲۰ سال) در سه گروه نژادی (هندی، چینی، مالائی) نشان داد که چینی ها از نظر حجم و جریانات هوای ریوی دارای بیشترین و هندی ها کمترین مقادیر می باشند (۱۱).

باتوجه به موارد پیشگفت، فرمول های ریاضی متداول در دنیا که برای محاسبه شاخص های اسپرومتری به کار می رود عموماً براساس اندازه گیری یافته های اسپرومتری در تعداد کمی از افراد سالم اروپایی یا آمریکایی و تعمیم این یافته ها به کل افراد جامعه استوار بوده است از آنجا که تا کنون مطالعه ای فراگیر جهت تعیین مقادیر اسپرومتری افراد سالم این منطقه انجام نگرفته است، لذا شاخص های اسپرومتری افراد سالم ساکن شهر ساری ($FVC-FEV_1-FEV_{1/2}/FVC-FEF_{25-75}$) را با چهار استاندارد جهانی (Eccs-Knudson-Morris^۵-ITS^۶)

2. LIN= lower limit of normal

3. FEV₁=forced expiratory volume in one second

4. FEF=forced expiratory flow over the middle one half of the fvc

5. Eccs=European community for coal and steel

6. ITS=intermountain thoracic society

1. FVC= force vital capacity

مقایسه گردید تا تعیین گردد با کدام یک از آنها مطابقت بیشتری دارد.

مواد و روش ها

تعداد نمونه با استفاده از مطالعات قبلی ($FVC-FEV_1$) و فرمول $n = \frac{Z^2 \times S^2}{d^2}$ و $z = 1/96$ و $s = 1$ و $d = 0/09$ ۵۰۰ نفر برآورد گردید. جامعه مورد مطالعه، افراد سالم بالای ۱۸ سال ساکن شهر ساری، غیر سیگاری، و بدون سابقه هر گونه بیماری تنفسی بود. که با مراجعه به مراکز بهداشت شهری، به طور تصادفی از لیست خانوار و جمعیت تحت پوشش انتخاب گردیدند. پس از تعیین نمونه‌ها، ابتدا مشخصه‌های دموگرافیک؛ سن، جنس، قد و وزن از طریق پرسش و ابزار مناسب (ترازو- متر) جمع آوری شد و به دستگاه اسپرومتر مدل fukuda sangyo ساخت کشور ژاپن (موجود در دانشکده که کالیبره می‌شود) داده شد و پس از آموزش کافی به فرد، با دستگاه اسپرومتر آزمون اسپرومتری در حالت ایستاده انجام شد تا از هر فرد ۳ اسپروگرام قابل قبول با معیارهای ATS (American thoracic society) به دست آید و اسپروگرامی که دارای بیشترین مقادیر برای $FVC-FEV_1$ بوده در تحقیق مورد استفاده قرار گیرد (۱۹، ۱۸، ۴، ۳، ۱).

قابل ذکر است در این بررسی ۱۲ نفر به دلیل عدم همکاری و اسپروگرام غیر قابل قبول از مطالعه خارج شدند.

نتایج به دست آمده از اسپرومتری به صورت جداول تنظیم شد، سپس با در دست داشتن اطلاعات فردی، میزان $FVC-FEV_1-FEV_1/FVC-FEF_{25-75}$ مورد انتظار با توجه به استانداردهای مختلف با همان دستگاه مشخص و ثبت شد. در پایان نتایج اندازه گیری

شده با مقادیر مورد انتظار با استفاده از نرم افزار spss آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون آنالیز شد. هم چنین برای مقایسه میانگین متغیرهای کمی در هر گروه با استاندارد مربوطه اش از t زوجی استفاده گردید.

یافته ها

نتایج به دست آمده از اطلاعات فردی و اسپرومتری بر روی ۵۰۷ نفر از افراد بالای ۱۸ سال ساکن شهر ساری (۲۴۵ مرد و ۲۶۲ زن) نشان داد که میانگین شاخص‌های مورد سنجش در مردان بیش از زنان است، جدول شماره ۱. هم چنین نتایج به دست آمده، در جدول شماره ۲ نشان می‌دهد پارامترهای مورد سنجش در گروه سنی ۲۰ تا ۳۰ سال حداکثر مقدار را دارا بوده باشند و با افزایش سن این مقادیر کاهش می‌یابند.

جدول شماره ۳ نشان می‌دهد که همبستگی قد با شاخص‌ها بالاست و با افزایش قد شاخص‌های اندازه گیری شده افزایش می‌یابند اما در مورد وزن این همبستگی از شدت کمتری برخوردار است. هم چنین نتایج نشان داد که میزان $FVC-FEV_1$ در مردان بیشترین همبستگی را با استاندارد Eccs دارد، در حالی که FEF_{25-75} بیشترین همبستگی را با استاندارد Morris نشان داد، جدول شماره ۴.

هم چنین بر اساس اطلاعات به دست آمده میزان FVC در زنان بیشترین همبستگی را با $Eccs$ و FEV_1 و FEF_{25-75} زنان بیشترین همبستگی را با استاندارد Knudson دارد، جدول شماره ۴.

بر اساس یافته‌های تحقیق، جدول شماره ۵ شاخص‌های اندازه گیری شده در هر دو جنس بیشترین همبستگی را با استاندارد Eccs دارد.

جدول شماره ۱: میانگین و انحراف معیار شاخص‌های اندازه‌گیری شده افراد بالای ۱۸ سال ساکن شهرساری بر حسب جنس، سال ۱۳۸۴

شاخص	جنس	مرد	زن	کل
		میانگین $\pm$ انحراف معیار	میانگین $\pm$ انحراف معیار	میانگین $\pm$ انحراف معیار
قد	(سانتیمتر)	۱۷۱/۲۶ $\pm$ ۷/۰۲	۱۵۷/۸۱ $\pm$ ۵/۲۳	۱۶۴/۳۱ $\pm$ ۹/۱۲
وزن	(کیلوگرم)	۷۶/۹۱ $\pm$ ۱۲/۱۴	۶۸ $\pm$ ۱۲/۴۷	۷۲/۳۱ $\pm$ ۱۳/۰۸
FVC	(لیتر)	۴/۵۸ $\pm$ ۰/۶۸	۳/۲۷ $\pm$ ۰/۵۶	۳/۹۰ $\pm$ ۰/۹۰
FEV ₁	(لیتر)	۴/۱۲ $\pm$ ۰/۶	۲/۹۹ $\pm$ ۰/۵۰	۳/۵۴ $\pm$ ۰/۷۹
FEV ₁ / FVC	(درصد)	۹۰/۲۲ $\pm$ ۴/۴۵	۹۱/۲۳ $\pm$ ۴/۷۹	۹۰/۷۴ $\pm$ ۴/۶۵
FEF ₂₅₋₇₅	(لیتر)	۵/۱۶ $\pm$ ۰/۹۹	۳/۹۵ $\pm$ ۰/۸۹	۴/۵۴ $\pm$ ۱/۱۲

جدول شماره ۲: شاخص‌های اندازه‌گیری شده افراد بالای ۱۸ سال ساکن شهرساری بر حسب سن، سال ۱۳۸۴

سن (سال)	شاخص	فراوانی	FVC	FEV ₁	FEV ₁ / FVC	FEF ₂₅₋₇₅
		تعداد (درصد)	X $\pm$ S	X $\pm$ S	X $\pm$ S	X $\pm$ S
< ۲۰		۲۷ (۵/۳)	۴/۰۷ $\pm$ ۰/۷	۳/۸ $\pm$ ۰/۶	۹۳/۸ $\pm$ ۴/۵۲	۴/۸۹ $\pm$ ۰/۹۲
۲۰-۳۰		۱۷۸ (۳۵/۱)	۴/۲۹ $\pm$ ۰/۸۶	۳/۹ $\pm$ ۰/۷۳	۹۱/۳ $\pm$ ۴/۹	۴/۹۹ $\pm$ ۱/۱۱
۳۰-۴۰		۲۴۷ (۴۸/۷)	۳/۸ $\pm$ ۰/۸۱	۳/۴۲ $\pm$ ۰/۷	۹۰ $\pm$ ۴/۳۴	۴/۳۶ $\pm$ ۰/۹۸
> ۴۰		۵۵ (۱۰/۸)	۲/۹۹ $\pm$ ۰/۷۱	۲/۷۴ $\pm$ ۰/۶۸	۹۰/۶۸ $\pm$ ۴/۴۴	۳/۶۷ $\pm$ ۱/۰۵

جدول شماره ۳: ضریب همبستگی شاخص‌های اندازه‌گیری شده افراد بالای ۱۸ سال ساکن شهرساری با مشخصه‌های دموگرافیک، سال ۱۳۸۴

مشخصه‌های دموگرافیک	شاخص	FVC	FEV ₁	FEV ₁ / FVC	FEF ₂₅₋₇₅
سن		-۰/۴۶۳**	-۰/۴۹**	-۰/۱۱۴**	-۰/۳۸**
قد		۰/۸۴۸**	-۰/۸۳۵**	-۰/۱۳۸**	۰/۵۸۶**
وزن		۰/۲۸۹**	۰/۲۸**	-۰/۰۸۱	۰/۲۲۷**

**سطح اطمینان ۹۹ درصد

جدول شماره ۴: ضریب همبستگی شاخص‌های اندازه‌گیری شده مردان و زنان بالای ۱۸ سال ساکن شهرساری با استانداردهای جهانی، سال ۱۳۸۴

شاخص	Eccs	ITS	Knudson	Morris
	مردان	زنان	مردان	زنان
FVC	۰/۸۳۳**	۰/۷۵۱**	۰/۸۲۳**	۰/۷۳۴**
FEV ₁	۰/۸۴۴**	۰/۷۱۷**	۰/۸۳۵**	۰/۷۱۲**
FEV ₁ / FVC	۰/۰۷	۰/۱۰۴	۰/۱۲	۰/۲۱**
FEF ₂₅₋₇₅	۰/۴۶۹**	۰/۴۶**	۰/۴۵۵**	۰/۴۶**

**سطح اطمینان ۹۹ درصد

**سطح اطمینان ۹۵ درصد

جدول شماره ۵: ضریب همبستگی شاخص‌های اندازه‌گیری شده افراد بالای ۱۸ سال ساکن شهرساری با استانداردهای جهانی

شاخص	Eccs	ITS	Knudson	Morris
FVC	۰/۹۰۹**	۰/۹۰۳**	۰/۸۹۵**	۰/۸۹۶**
FEV ₁	۰/۹۰۴**	۰/۹**	۰/۸۹۶**	۰/۹۰۱**
FEV ₁ / FVC	۰/۱۳۴**	۰/۲۰۵**	۰/۲۱۱**	۰/۲۰۷**
FEF ₂₅₋₇₅	۰/۶۵۳**	۰/۶۳۸**	۰/۲۶۷**	۰/۶۴**

**سطح اطمینان ۹۹ درصد

بحث

چنانچه نتایج نشان داد میانگین پارامترهای اسپرومتری اندازه گیری شده در مردان از زنان بیش تر می باشد با توجه به نقش موثر قد در این پارامترها، مقداری از این اختلاف مربوط به بالا بودن میانگین قد مردان نسبت به زنان است.

هم چنین میانگین پارامترها در گروه های سنی مختلف متفاوت است به گونه ای که گروه سنی ۲۰ تا ۳۰ سال دارای بیش ترین مقدار، و در گروه های سنی پائین تر و بالاتر این میزان کمتر بود به طوری که مقدار پارامترها در ابتدا از یک حد مشخصی شروع شده و با رشد و بلوغ انسان به حداکثر میزان رسیده و پس از آن با افزایش سن کاهش می یابند.

در مطالعه ای که بر روی ۶۰۵۳ فرد سالم (۷۵ تا ۱۶ سال) در انگلستان انجام شد نتایج نشان داد که مقادیر به دست آمده ($FVC-FEV_1-FEV_1/FVC$) به مقدار قابل توجهی از مقادیر Eccs بالاتر بود (۱۲). اما نتایج بررسی حاضر نشان داد که میانگین مقادیر به دست آمده FVC در مردان نسبت به سایر استانداردها پائین تر بود اما در زنان نسبت به استاندارد Knundson و Eccs بالاتر لیکن نسبت به دو استاندارد ITS و Morris پائین تر بود. اما سایر پارامترها ($FEF_{25-75} - FEV_1-FEV_1/FVC$) نسبت به سایر استانداردها در حد بالاتری قرار داشتند. تحقیق، نتایج بررسی گلشن و نعمت بخش (۲۰۰۰) در اصفهان نشان داد که مقادیر استاندارد پیشنهادی حجم های ریوی آمریکاییان و اروپائیان برای بالغین که کمی بیشتر برآورد می شود، مناسب می باشد (۸).

نتایج بررسی بر روی ۳۱۵۷ فرد سالم (۶۰ تا ۱۸ سال) در ۸ ناحیه سوئیس بیانگر این مسئله است که مقدار $FVC-FEV_1$ نسبت به جمعیت اروپایی و آمریکای شمالی بالاتر می باشد، بنابراین (LLN) پائین حد تشخیص، ممکن است بالاتر باشد (۱۳).

مطالعه بر روی ۱۲۹۰۰ فرد (۴۴ تا ۲۰ سال) در ۱۴ کشور اروپایی و مقایسه مقادیر $FVC-FEV_1$ آنها با استاندارد Eccs نشان داد که مقادیر Eccs به طور بارزی کمتر می باشد (۱۴). نتایج یک بررسی در نیوزلند بر روی ۱۰۱ فرد سالم (۶۶ تا ۱۸ سال) نشان داد که حجم های ریوی مشابه سفید پوستان (قفقازی) است و استانداردهای موجود بدون تغییر، قابل استفاده برای این جامعه می باشد (۱۵).

نتایج این تحقیق نشان داد که میزان $FVC-FEV_1$ در مردان بیش ترین همبستگی را با استاندارد Eccs در حالی که در زنان FVC بیش ترین همبستگی را با Eccs و FEV_1 بیش ترین همبستگی را با استاندارد Knundson دارد. هم چنین جامعه مورد مطالعه، همبستگی بیش تری با استاندارد Eccs داشته و سایر استانداردها در مراحل بعدی قرار دارند که تا حدودی مشابه نتایج مطالعه بر روی ۱۵۷۷۲ معدن کار طلای سیاه پوست و ۲۷۵۲ معدن کار طلای سفید پوست در آفریقای جنوبی است که، نشان داده شده استانداردهای Eccs و Knundson برای سفید پوستان و استانداردهای Louw et al برای سیاه پوستان مناسب تر است (۱۶).

نتایج مطالعه بر روی ۱۰۷۰ نفر در برزیل نشان داد که مقادیر به دست آمده FVC در زنان ۴ درصد نسبت به استاندارد Knundson et al کمتر بوده که منجر به میزان بالاتری از اختلال تحدیدی می شود در حالیکه در مردان تفاوت معناداری وجود نداشت. میزان FEV_1 در هر دو جنس نسبت به Knundson et al بیش تر بود. (۴/۷ درصد در مردان و ۵ درصد در زنان) که منجر به حساسیت بیش تر در تشخیص اختلالات انسدادی ریوی می شود. FEF_{25-75} در هر دو جنس تفاوت معناداری را نشان نداد (۱۷).

که در کاربردهای مختلف اسپروستری از این استاندارد استفاده شود. اگر چه تحقیقات بیش تر و وسیع تر جهت تعیین استانداردهای ریوی ضروری می باشد.

سپاسگزاری

از همکاری و تلاش بی دریغ کارکنان زحمتکش مراکز بهداشتی شهرستان ساری که در انجام این مطالعه همکاری نمودند و همچنین از حوزه معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی که در تامین اعتبار مالی مورد نیاز این تحقیق مساعدت نمودند، قدردانی می گردد.

نتایج بررسی نظریان (۱۳۷۲) بر روی ۴۱ دانشجوی مذکر (۲۳ تا ۲۶ سال) دانشگاه زنجان نشان داد که میانگین FVC اندازه گیری شده جامعه مورد مطالعه برابر ۹۰ درصد میانگین حد انتظار بود (۷) لیکن در این بررسی مقادیر اندازه گیری شده، بیش از ۹۰ درصد حد انتظار هر چهار استاندارد مورد مطالعه بود. (حد اکثر ۹۸/۸ درصد استاندارد Eccs و حد اقل ۹۳/۵ درصد استاندارد ITS) نتایج این تحقیق نشان داد که حجم های ریوی و جریانات هوای ریوی در افراد ساکن شهر ساری با استاندارد Eccs قرابت بیش تری داشته و توصیه می شود

فهرست منابع

1. Hankinson JL, Kinsley KB, Wagner GR. Comparison of Spirometric reference values for Caucasian and African American blue-collar workers. J Occup Environ Med. 1996 Feb; 38(2): 137-43.
2. Carl Zenz O, Bruce Dickerson, Edward P, Horvath Jr. Occupational medicine, third ed. Boston Chicago: Mosby; 1994, p: 229-239.
3. William N. Rom. Environmental and occupational medicine, Third ed. Lippincott-raven: publishers Philadelphia; 1998, p: 261-293.
4. Joseph Ladoa, occupational environment medicine, second edition university of California: San Francisco; 1998, p: 307.
5. Glindmeyer HW. Predictable confusion. J Occup Med. 1981; 23: 845-9.
6. Castellsague J, Burgos F, Sunyer J, Barbera JA, Roca J. Prediction equations for forced spirometry from European origin populations. Respire med. 1998 Mar; 92(3): 401-7.
7. نظریان مرتضی. مقایسه اندکس های اسپرومتریک در دانشجویان پزشکی مذکر ۲۳-۲۶ ساله دانشگاه علوم پزشکی زنجان با استانداردها. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زمستان ۷۵، سال چهارم شماره ۱۷: ۲۷-۲۰.
8. Golshan M, Nemat-bakhsh M. Prediction equations of ventilatory function in non smoker adults in Isfahan, Iran. Irn j med sci 2000; 25(3&4): 125-8.
9. Pan WH, et al. reference Spirometric values in healthy Chinese never smokers in two townships of Taiwan. Chin j physiol. 1997 Sep; 40(3): 165-74.
10. Gore CJ, Crockett AJ, Pederson DG, Booth ML, Bauman A, Owen N. Spirometric standards for healthy adult lifetime nonsmokers in Australia. Eur Respire J. 1995 May; 8(5): 773-82.

11. Chin NK, Ng Tp, Hui Kp, Tan Wc. Population based standards for pulmonary function in nonsmoking adults in Singapore. *Respirology*. 1997 Ju; 2(2): 143-9.
12. Falaschtti E, Laiho J, Primates P, Purdon S. Prediction equation for normal and low lung function from the health survey for England. *Eur respire J*. 2004 Mar; 23(3): 456-63.
13. Brandli O, Schindler C, Kunzli N, Keller R, Perruchoud Ap. Lung function in healthy never smoking adults: refrence values and lower limitsof normal of a swiss population. *Thorax*. 1996 Mar; 51 (3): 277-83.
14. Roca J et al. References values for forced spirometry. GROUP OF THE European community respiratory health survevey. *Eur respir J*. 1998 Jun; 11 (6):1354-62.
15. Milivojevic-polekic L, Wells AU, Moody A, Fergusson W, Tukuitonga C, Kolbe J. spirometric lung volumes in the adult pacific islander population: comparison with predicted values in a European population. *Respirology*. 2001 Sep; 6(3): 247-53.
16. Eva Hnizdo, Gavin churchyard, Rob Dowdeswel. Lung function prediction equation derived from healthy South Africa gold miners. *Occup Environ Med*. 2000 Oct; 57: 698- 705.
17. Waldemar La, et al. Comparing reference spirometric values obtained from Knoudson and Pereira equation-adults.J *Pneumologia* .2001 Nov-Dec; 27 (6).
18. Beilia VI, et al. Quality control of - spirometry in the elderly. *AM-J respire crit. care Med*, 2000 April; 161(4): 1094-1100.
19. Paul L, Enright, Kenneth C, Beck and Duane L, Sherrill. Repeatability of spirometry in 18000 adult patients. *AM-J respire crit. care Med*, 2004; 169: 235-238.