

# ORIGINAL ARTICLE

## Cloning and sequencing the plasmid encoding dense granule antigen 14 (GRA14) of *Toxoplasma gondii* RH strain

Ehsan Ahmadpour<sup>1</sup>,  
Shahabeddin Sarvi<sup>2</sup>,  
Ahmad Daryani<sup>3</sup>,  
Mehdi Sharif<sup>3</sup>,  
Mohammad-Bagher Hashemi Soteh<sup>4</sup>,  
Azadeh Mizami<sup>1</sup>,  
Kian Rezaee<sup>5</sup>

<sup>1</sup> PhD Student, Toxoplasmosis Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

<sup>2</sup> PhD, Assistant Professor, Toxoplasmosis Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

<sup>3</sup> PhD, Professor, Toxoplasmosis Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

<sup>4</sup> PhD, Associate Professor, Cellular and Molecular Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

<sup>5</sup> Msc Student, Toxoplasmosis Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

(Received December 25, 2013; Accepted April 30, 2014)

### Abstract

**Background and purpose:** Toxoplasmosis is a common parasitic disease throughout the world and one-third of the population has antibodies to *Toxoplasma gondii*. This disease causes serious medical problems in fetuses and immunocompromised individuals. As gene encoding protein GRA14 can be considered as a suitable target for DNA vaccine and designing diagnostic kits; the aim of this study was to do cloning and sequencing the gene encoding GRA14 protein of *Toxoplasma gondii* RH strain.

**Materials and methods:** DNA extraction was performed on harvested tachyzoites from mouse peritoneal fluid, then PCR carried out and amplification products were analyzed by gel electrophoresis. GRA14 gene was cloned in pTG19-T as a cloning vector, then recombinant plasmid confirmed by the colony-PCR and restriction enzyme digestion using HindIII and EcoRI, followed by sequencing.

**Results:** Evaluation of PCR products by agarose gel electrophoresis and analysis of nucleotide sequencing of 1227 bp gene encoding the protein GRA14, revealed the complete homology with the recorded sequences in the gene bank. Furthermore, cloning of GRA14 gene in pTG19-T vector was confirmed with colony PCR and restriction enzyme digestion.

**Conclusion:** The results showed that the GRA14 gene was successfully cloned into the pTG19-T vector and this plasmid can be used to design DNA vaccines and diagnostic kits in further studies.

**Keywords:** *Toxoplasma gondii*, dense granule antigen 14, cloning

J Mazand Univ Med Sci 2014; 24(112): 42-9 (Persian). |

## کلوزینگ و توالی یابی پلاسمید کد کننده پروتئین گرانولی متراکم RH توکسوپلاسما گوندی

احسان احمدپور<sup>۱</sup>

شهاب الدین سروی<sup>۲</sup>

احمد دریانی<sup>۳</sup>

مهند شریف<sup>۴</sup>

محمد باقر هاشمی<sup>۵</sup>

آزاده میزانی<sup>۱</sup>

کیان رضایی<sup>۵</sup>

### چکیده

**سابقه و هدف:** بیماری توکسوپلاسموز از بیماری‌های شایع در جهان می‌باشد که حدود یک سوم مردم دارای آنتی‌بادی بر علیه توکسوپلاسمما هستند. این بیماری بیشتر به دلیل عوارض وخیم آن، در موارد مادرزادی و نیز بیماران نقص سیستم ایمنی ایمنی اهمیت دارد. ژن کد کننده پروتئین GRA14 می‌تواند به عنوان یک هدف مناسب جهت ساخت DNA (Deoxyribonucleic acid) و اکسن و همچنین طراحی کیت تشخیصی مورد ارزیابی قرار گیرد. هدف از این بررسی، شناسایی و کلون کردن ژن کد کننده پروتئین GRA14 توکسوپلاسمما گوندی بود.

**مواد و روش‌ها:** در مرحله اول پس از جداسازی تاکی‌زوئیت‌های توکسوپلاسما از مایع صفاتی موش آلوده، آن استخراج شد و پس از انجام PCR (Polymerase chain reaction)، محصول تکثیر شده بر روی ژل الکتروفورز بررسی گردید. سپس ژن حاصل در وکتور pTG19-T pTG19-T pTG19-T استفاده شد. در نهایت ژن GRA14 کلون شده در وکتور EcoRI و HindIII و استفاده شد. در نهایت ژن GRA14 کلون شده در وکتور PCR بر روی ژل الکتروفورز و همچنین تعیین توالی ژن کد کننده پروتئین GRA14 نشان داد که این ژن حاصل در وکتور pTG19-T pTG19-T pTG19-T استفاده شد. در نهایت ژن GRA14 کلون شده در پلاسمید Colony PCR و هضم آنزیمی به وسیله آنزیم‌های محدود کننده استفاده شد. در نهایت ژن GRA14 کلون شده در وکتور EcoRI و HindIII و استفاده شد. در نهایت ژن GRA14 کلون شده در وکتور PCR بر روی ژل الکتروفورز و همچنین تعیین توالی ژن کد کننده پروتئین GRA14 نشان داد که این ژن جفت بازی با ژن GRA14 سویه RH ثبت شده در ژن بانک تشایه کامل داشت. علاوه بر این، با استفاده از روش‌های هضم آنزیمی و Colony PCR آنچه در پلاسمید GRA14 در pTG19-T pTG19-T pTG19-T مورد تأیید قرار گرفت.

**یافته‌ها:** بررسی واکنش PCR بر روی ژل الکتروفورز و همچنین تعیین توالی ژن کد کننده پروتئین GRA14 نشان داد که این ژن ۱۲۲۷ جفت بازی با ژن GRA14 سویه RH ثبت شده در ژن بانک تشایه کامل داشت. علاوه بر این، با استفاده از روش‌های هضم آنزیمی و Colony PCR کلون شدن، ژن GRA14 در پلاسمید Colony PCR مورد تأیید قرار گرفت.

**استنتاج:** ژن GRA14 به طور موفقیت‌آمیزی در پلاسمید pTG19-T کلون شد و این پلاسمید می‌تواند برای مطالعات بعدی جهت ساخت واکسن DNA و طراحی کیت تشخیصی مورد استفاده قرار گیرد.

**واژه‌های کلیدی:** توکسوپلاسمما گوندی، GRA14، کلوزینگ

### مقدمه

آن با موجودات مختلف، کترول و پیشگیری آن را در عمل دشوار کرده است (۱-۴). آلودگی در افراد دارای ایمنی کامل اغلب بدون علامت است؛ اما در نوزادان و افراد مبتلا به نقص

توکسوپلاسمما گوندی یک تک یاخته داخل سلوی اجاری است که طیف وسیعی از مهره‌داران را آلوده می‌کند و سازگاری

E-mail: shahabesrvi@yahoo.com

**مؤلف مسئول:** شهاب الدین سروی - ساری: دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دانشکده پزشکی، گروه انگل شناسی و فارج شناسی

۱. دانشجوی دکتری، مرکز تحقیقات توکسوپلاسموز، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

۲. استادیار، مرکز تحقیقات توکسوپلاسموز، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

۳. استاد، مرکز تحقیقات توکسوپلاسموز، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

۴. دانشیار، مرکز تحقیقات سلوی - مولکولی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

۵. دانشجوی کارشناسی ارشد، مرکز تحقیقات توکسوپلاسموز، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

۶. تاریخ دریافت: ۱۳۹۲/۱۰/۴ تاریخ ارجاع جهت اصلاحات: ۱۳۹۲/۱۲/۱۳ تاریخ تصویب: ۱۳۹۳/۲/۱۰

پروتئین تا حدودی مشخص شده است (۱۱). البته در سال‌های اخیر در تک یاخته نوپورا کانینوم نیز که هم خانواده توکسیپلاسمای گوندی است و در نشخوار کنندگان باعث سقط جنین می‌گردد، پروتئین‌های گرانولی متراکمی به نام GRA14 شناسایی شده است (۱۲). این پروتئین که شامل ۴۰۹ اسید آمینه است، دارای توپولوژی خاصی می‌باشد؛ به طوری که انتهای کربوکسیل آن در سیتوپلاسم سلول میزان و انتهای آمین آن در حفره پارازیتوفوروس قرار می‌گیرد. با توجه به الگوی خاص این پروتئین و وجود آن در سیستم PVM (Parasitophorus vacuole membrane) دور از انتظار نیست که این پروتئین محرك قوی برای سیستم ایمنی باشد (۱۱).

درمان این بیماری به دلیل عوارض جانبی متعدد داروهای در دسترس مشکل است و عفونت مجدد به سرعت اتفاق می‌افتد. در شرایط حاضر، تولید و توسعه داروهای جدید ضد توکسیپلاسمایا یک واکسن، جایگزین بسیار مناسبی برای پیشگیری از عفونت خواهد بود (۵-۷).

با توجه به اهمیت این انگل در ایجاد بیماری توکسیپلاسموز مادرزادی و همچین عفونت فرصت طلب در افراد دارای نقص سیستم ایمنی و نیز نقش مؤثر واکسیناسیون در پیشگیری از آن و این که هیچ گونه مطالعه‌ای درخصوص کلولینگ ژن کد کننده GRA14 در دنیا انجام نشده است، هدف از این پژوهش، شناسایی و کلون کردن ژن کد کننده این پروتئین در سویه RH توکسیپلاسمای گوندی برای اولین بار در ایران بود. نتایج حاصل از این مطالعه می‌تواند در تهیه واکسن و نیز طراحی کیت تشخیصی توکسیپلاسموز مورد استفاده قرار گیرد.

## مواد و روش‌ها

### تکثیر انگل و استخراج DNA

در این مطالعه از تاکی‌زوئیت‌های سوش استاندارد RH توکسیپلاسمای گوندی نگهداری شده در دانشکده پزشکی ساری استفاده گردید. به منظور تکثیر انگل، ابتدا به هر موش سوری

اکتسابی سیستم ایمنی، عوارض شدیدی همچون میکروسفالی، هیدروسفالی، کوریورتینیت (در نوزادان) و آنسفالیت (در افراد مبتلا به نقص اکتسابی سیستم ایمنی) را ایجاد می‌کند که حتی ممکن است باعث مرگ بیمار شود (۵-۷).

در حال حاضر، بررسی‌ها به سمت شناخت آنتی ژن‌های ایمنوژن و محافظت کننده توکسیپلاسمای گوندی سوق یافته است؛ زیرا با تشخیص این آنتی ژن‌ها می‌توان با تولید پیتیدهای مصنوعی و تولید منوکلونال آنتی‌بادی محافظت ایجاد کرد. آنتی ژن‌های دفعی-ترشحی تاکی‌زوئیت توکسیپلاسمای، به شدت ایمنوژن هستند و بررسی‌های مختلف در مدل موشی نشان داده است که شیوه تهیه آنتی ژن دفعی-ترشحی، محل و دوز تزریقی آنتی ژن، نوع ادجوانات و استفاده یا عدم استفاده از سرم جنین گاو (FBS) یا راپتیری (ROP) یا راپتیری‌های (Roptery proteins) و پروتئین‌های (Microneme proteins) MIC یا گرانولی متراکم (GRA) یا دندان‌گذار (Dense granule antigen) یا گرفته از سرمه هستند، که هر سه نوع آنتی ژن دفعی-ترشحی پیش گفته، در تحریک پاسخ‌های ایمنی نقش دارند (۶-۸).

پروتئین‌های گرانولی متراکم در حین یا بعد از تهاجم انگل توکسیپلاسمای گوندی به سلول میزان، به داخل حفره پارازیتوفوروس اگزوستیوز می‌شوند (۱۰). این پروتئین‌ها، محیط حفره پارازیتوفوروس را به نفع انگل تغییر می‌دهند و پایدار می‌کنند و باعث زنده ماندن و تکثیر تاکی‌زوئیت‌های انگل طی دوره درون سلولی می‌شوند (۹، ۱۰). تاکنون چندین پروتئین گرانولی متراکم شناخته شده و بررسی‌های متعددی روی برخی از آن‌ها صورت گرفته است و در این میان، GRA1 (۴۰kD)، GRA4 (۲۳kD) و GRA7 (۲۹kD) ایمنی زایی نسبی خوبی نشان داده‌اند (۱۰، ۳).

یکی از جدیدترین پروتئین‌های گرانولی شناخته شده توکسیپلاسمای گوندی، GRA14، می‌باشد که مطالعات اندکی روی آن انجام شده و نقش ساختاری و توپولوژی خاص این

جدول شماره ۱: آغازگرهای رفت و برگشت طراحی شده برای تکثیر ژن GRA14 توکسoplasmagondii به همراه توالی‌های برش آنزیمی (ذیر محل اثر آنزیم خط کشیده شده است)

آغازگر رفت (Forward)	AAAAAG↓CTTATGCAGGCGATAGCG (Hind III)
آغازگر برگشت (Reverse)	AAAGAA↓TTCCTATTGCTGGTCTGGTA (EcoR I)

درجه سانتی گراد، مرحله واسرتگی (Denaturation) به مدت ۱ دقیقه در دمای ۹۴ درجه سانتی گراد، مرحله اتصال آغازگرها (Annealing) به مدت ۳۰ ثانیه در دمای ۶۲ درجه سانتی گراد، مرحله گسترش (Extension) به مدت ۴۵ ثانیه در دمای ۷۲ درجه سانتی گراد و مرحله گسترش نهایی به مدت ۵ دقیقه در دمای ۷۲ درجه سانتی گراد انجام شد.

در نهایت، جهت تأیید انجام واکنش، محصول PCR بر روی ژل ۱ درصد آگارز در کنار نشانگر ۱۰۰ bp ۱۰۰ الکتروفوروز گردید. پس از اتمام الکتروفوروز و مشاهده قطعه ژنی GRA14، طبق پروتکل کیت استخراج از ژل شرکت بیونر کره Bioneer, AccuPrep® Gel Purification Kit, -۳۰۳۵-۱ (Cat. No.: K) قطعه تکثیر یافته از بقیه مواد به کار رفته در PCR جدا گردید. جهت تأیید فرایند استخراج از ژل ۳ میکرولیتر از محصول این مرحله بار دیگر روی ژل ۱ درصد الکتروفوروز شد.

کلونینگ ژن GRA14 در پلاسمید pTG19-T و انتقال آن به باکتری مستعد E. coli سوش Top ۱۰ در این مطالعه به منظور انجام کلونینگ از کیت -T PCR pTG19 cloning vector جهت انجام این کار در یک میکروتیوب ۰/۵ میلی لیتری، واکنشی به حجم ۳۰ میکرولیتر به شرح جدول شماره ۲ تهیه و به مدت ۱ ساعت در دمای ۲۲ درجه سانتی گراد و سپس به صورت شبانه در دمای ۴ درجه سانتی گراد انکوبه گردید. پس از انجام واکنش فوق جهت پذیرش Transformation) پلاسمید حاوی ژن GRA14، از باکتری (Escherichia coli) E. coli Top ۱۰ مستعد شده به روش کلرید کلسیم استفاده شد (۱۳). پس از مستعد کردن

سفید تعداد  $10^9 \times 5-8$  تا کی زوئیت به صورت داخل صفاقی تزریق شد و پس از ۳-۴ روز، مایع صفاق موش آسپیره شد و برای رسوب دادن انگل‌ها، لوله آزمایش حاوی تاکی زوئیت‌ها در ۴۸۰ به مدت ۱۰ دقیقه سانتریفوژ گردید (۳۸). استخراج DNA تاکی زوئیت‌ها بر اساس دستورالعمل کیت استخراج Bioneer, AccuPrep® Genomic DNA -۳۰۳۲ (extraction kit, Cat. No.: K) انجام شد. غلظت و کیفیت DNA به دست آمده با دو روش جذب نوری و الکتروفوروز بررسی شد.

#### طراحی پرایمرها

جهت انجام واکنش زنجیره‌ای پلیمراز یا PCR (Polymerase chain reaction) ابتدا آغازگرهای (Forward) و برگشت (Primer) با استفاده از اطلاعات تنها توالی ثبت شده در سایت http://www.ncbi.nlm.nih.gov به شماره FJ015061/1 توسط نرمافزار Gene runner طراحی گردید (جدول شماره ۱). پس از طراحی آغازگرها جهت انجام برش آنزیمی، به ابتدای آغازگر رفت و برگشت به ترتیب، توالی‌هایی به عنوان Linker اضافه شد که حاوی جایگاه برش آنزیم‌های برش EcoR I و Hind III باشد.

تکثیر و جداسازی ژن GRA14 توکسoplasmagondii با روش PCR

برای انجام واکنش زنجیره‌ای پلیمراز از PCR master mix شرکت Bioneer کره استفاده شد و تکثیر ژن GRA14 در ۳۵ (Cat No:K-۲۰۱۲) سیکل طبق برنامه به شرح زیر انجام شد: مرحله واسرتگی اولیه (Initial Denaturation) به مدت ۵ دقیقه در دمای ۹۴

استفاده از PCR Master Mix های شرکت Bioneer و اکنش زنجیره‌ای پلیمراز انجام شد و سپس محصول به دست آمده در ژل ۱ درصد آگارز الکتروفورز گردید تا وجود قطعه کلون شده مورد نظر تأیید گردد.

- استفاده از برش آنزیمی DNA پلاسمیدی:  
جهت برش آنزیمی و جداسازی قطعه مورد نظر از پلاسمید نوترکیب در ابتدا باکتری حاوی پلاسمید نوترکیب در محیط LB مایع کشت داده شد و سپس با استفاده از کیت استخراج پلاسمید AccuPrep® Plasmid Mini Extraction -۳۰۳۰-۱) Bioneer (Kit, Cat. No.: K شرکت (Kit, Cat. No.: K شرکت Bioneer، پلاسمید از باکتری استخراج شد. به منظور برش آنزیمی به صورت Hind III و EcoR I Double digestion از دو آنزیم از شرکت Fermentas آلمان، در یک میکروتیوب استریل در حجم نهایی ۴۰ میکرولیتر استفاده شد. محلول واکنش شامل ۲۵ میکرولیتر DNA پلاسمیدی، بافر X<sup>۱۰</sup> به میزان ۸ میکرولیتر، از هر یک از آنزیم‌ها ۱ میکرولیتر و در نهایت ۵ میکرولیتر آب مقطر بود. سپس میکروتیوب، به مدت ۱۶ ساعت (Overnight) در دمای ۳۷ درجه سانتی گراد انکوبه گردید. در نهایت، ۵ میکرولیتر از محصول برش آنزیمی روی ژل آگارز ۱ درصد الکتروفورز شد.

- تعیین توالی ژن GRA ۱۴ کلون شده:  
برای تعیین توالی نوکلئوتیدهای ژن GRA ۱۴ کلون شده، محصول حاصل از برش آنزیمی با استفاده از کیت استخراج از Bioneer، AccuPrep® Gel Purification -۳۰۳۵-۱) استخراج و تخلیص شد و جهت تعیین توالی به شرکت فزایبوتک ارسال شد. نتیجه تعیین توالی ژن کلون شده با استفاده از سایت اینترنیتی www.ncbi/blast از نظر تشابهات و اختلافات با ژن GRA ۱۴ توکسیپلاسمای گوندی موجود در بانک جهانی ژن مقایسه گردید.

## یافته‌ها

در مرحله اول، کار استخراج DNA انجام شد و جهت تأیید، محصول استخراج روی ژل آگارز ۱ درصد الکتروفورز

باکتری‌ها برای پذیرش پلاسمید، ۱۰ میکرولیتر از پلاسمیدهای حاوی ژن مورد نظر به میکروتیوب حاوی باکتری مستعد شده اضافه گردید و در نهایت با استفاده از شوک حرارتی پلاسمید نوترکیب به داخل باکتری منتقل شد.

جدول شماره ۲: مواد و مقدار ھر یک در واکنش انجام کلوبنینگ

ماده	مقدار
PCR product	۵ µl
Vector	۳ µl
۵x Ligation buffer	۶ µl
T <sub>4</sub> DNA Ligase	۱ µl
Nuclease-free water	۱۵ µl
Total	۳۰ µl

سپس این باکتری‌ها ابتدا به مدت ۶۰ دقیقه داخل انکوباتور شیکردار در ۳۷ درجه سانتی گراد و در محیط کشت LB (Luria bertani) مایع فاقد آنتی‌بیوتیک کشت داده شد و پس از آن این محیط کشت در ۵۰۰ rpm به مدت ۲ دقیقه سانتریفیوژ گردید. از رسوب باقی مانده به پلیت حاوی آنتی‌بیوتیک آمپی-سیلین، -indolyl-beta-D-galacto-pyranoside (X-gal) و IPTG (5-bromo-4-chloro-thiogalactopyranoside) اضافه شد و به کمک میله شیشه‌ای L شکل در تمام نقاط پلیت پخش گردید و به مدت ۱۶-۱۸ ساعت در انکوباتور ۳۷ درجه سانتی گراد قرار داده شد.

پس از انجام کلوبنینگ و انتقال پلاسمید نوترکیب به داخل باکتری، جهت تأیید کلوبنینگ ژن از روش‌های زیر استفاده شد:


### ۱- تشکیل کلونی‌های آبی و سفید:

پس از کشت باکتری‌های ترانسفورم شده، در سطح محیط کشت، کلنی‌های آبی (کلنی فاقد پلاسمید نوترکیب که به دلیل سنتز بتا-گالاکتوزیداز و تجزیه X-gal و تولید Indolyl رنگ آبی دیده می‌شود) و سفید (کلنی حاوی پلاسمید نوترکیب) را تشکیل خواهد شد.

### ۲- انجام Colony PCR از کلنی‌های آبی و سفید:

برای این کار ۳-۲ عدد از کلنی‌های آبی و سفید حاصل مرحله ترانسفورم انتخاب (به عنوان جایگزین DNA الگو) و با

پلاسمید استخراج گردید و در نهایت، در معرض آنزیمهای محدودالاثر EcoRI و HindIII قرار گرفت که در الگوی الکتروفورزی آن دو باند که یکی مربوط به پلاسمید و دیگری GRA14 باندی ۱۲۲۷ نوکلوتیدی که نشان دهنده وجود ژن GRA14 کلون شده می‌باشد، مشاهده گردید (تصویر شماره ۳). در نهایت تعیین توالی ژن مورد نظر و مقایسه آن با ژن ثبت شده در NCBI نشان داد که این توالی با ژن GRA14 توکسوپلاسما گوندی بثبات شده در بانک جهانی ژن، ۱۰۰ درصد همخوانی دارد (تصویر شماره ۴).




تصویر شماره ۲: الکتروفورز محصول کلونی PCR از کلونی‌های سفید و آبی بر روی ژل آگارز ۱ درصد (ستون ۱: نشانگر با وزن ملکولی ۱۰۰ bp، ستون ۲: محصول PCR از کلونی آبی فقد ژن GRA14، ستون ۳: ملکول استاندارد (GRA14 جفت بازی ژن ۱۲۲۷ جفت بازی ژن ۱۴)

PCR :Polymerase chain reaction

GRA14 :Dense Granule Antigen 14


گردید. غلظت نمونه نیز با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر نانودرایپ در حدود ۱۵۱ نانو گرم در میکرولیتر برآورد شد. پس از انجام واکنش زنجیره‌ای پلیمراز از DNA ژنومی با پرایمرهای طراحی شده برای ژن GRA14 توکسوپلاسما، محصول واکنش بر روی ژل ۱ درصد آگارز الکتروفورز شد و باندی در محدوده ۱۲۲۷ bp مشاهده گردید که نشان دهنده تکثیر اختصاصی ژن کد کننده پروتئین GRA14 می‌باشد (تصویر شماره ۱).



تصویر شماره ۱: الکتروفورز محصول ژن GRA14 توکسوپلاسما گوندی بر روی ژل آگارز ۱ درصد (ستون ۱: نشانگر با وزن ملکولی ۱۰۰ bp، ستون ۲: قطعه ۱۲۲۷ جفت بازی ژن GRA14)

PCR :Polymerase chain reaction

GRA14 :Dense Granule Antigen 14



تصویر شماره ۳: الکتروفورز محصول برش آنزیمی پلاسمید pTG19-T حاوی ژن GRA14 توکسوپلاسما گوندی بر روی ژل آگارز ۱ درصد (ستون‌های ۱ و ۴: نشانگر با وزن ملکولی ۱ kb، ستون ۲: محصول برش آنزیمی شامل قطعه ۱۲۲۷ جفت بازی ژن GRA14 در پایین و پلاسمید در بالا، ستون ۳: پلاسمید حاوی ژن مورد نظر بدون برش آنزیمی)

GRA14 :Dense Granule Antigen 14

پس از انتقال ژن GRA14 توسط پلاسمید pTG19-T به داخل باکتری Ecoli سویه Top10 به عنوان میزبان و کشت آن بر روی محیط LB آگار حاوی آنتی‌بیوتیک آمپیسیلین، X-gal و IPTG، کلونی‌های سفید و آبی تشکیل شد که نشان دهنده انتقال پلاسمید به درون باکتری مورد نظر بود. همچنین جهت تأیید وجود ژن نوترکیب در پلاسمید pTG19-T از کلونی‌های سفید طبق پرتوکل دمایی و زمانی پیش‌گفته برای PCR اولیه، واکنش زنجیره‌ای پلیمراز انجام شد و با الکتروفورز محصول واکنش وجود ژن GRA14 تأیید گردید (تصویر شماره ۲).

در ادامه پس از تأیید کلون نوترکیب با PCR، جهت تأیید با روش هضم آنزیمی، کلونی‌های حاوی ژن کشت داده شد و

ATGCAGGGGATAAGCCGGGGGGACCGCTCGTCGGGGGGTGGTCGAGTTGTAGCTGGCTTTCTATTTTCGTTCTGCTT  
 CTAACGAGTGAAGCAGTGGCTGAGCTGCCAGTTGGAGCAGACAATTCCCTATTCTGTCACATCAACCGCAGCAG  
 GAAGGCATCCTCGCACACAGAAACCCCAGACTGCCAACACTCCTCAGCAGCTCATTGTGCCCGTAAGCTATCTAGGA  
 GATGGTTTGTCTACCTCTGGAGTTCTTAGGCCTTACCCCTCGATGTTGACAGCTTAAACTAGTGCTCGG  
 GAAATACCAACTGTGGCAGGTTTGTCAAAAATATGTGCTGGCGCCAGCTATCTGATCCCTCAGAGCACGGCG  
 AACGGCGTGAAGAAGATTCTAATGCGTCGATGCAGCCAAAATGAAGAAGGATTATAACAGATCTGTTGAAGTCC  
 GCTCCTGAGGTTCAAGAAGTTCTGAGCCGTTCTGGTTCTGACTGCTCTGCTCTTGGACATCAATGGT  
 CTCCATGAGGCGGTGACGCTAGTCTCCCCGTGACAAAAGCAGTGGCATGCTGTACTACATCTAGTGAGTGTGCTA  
 CGCGCGAACACAACGGGATCCTTCTCCTTCTTATCTGCAAGAGTGGCGGGAGAGTTCAAGATCATGGAG  
 GACCATGTCGCTCTGTTGCTGGTGAGGCACAGGAGGAAAATGTTATAAACAGTCAACCACAGGAAACGGAAAC  
 TCGCACAGGGCGGTAGTGGAGAGGGGATAAGAATGCTACAATCTGGACCTCGAAACCACGAAGCTGCGGAGGACG  
 TGGTGGAGGTTATTAAAGTGGCTGCTCTGCCGTCTAACGATGGCACTGCTGAAATATGGTACGCCCTGTCGCGC  
 GCTTTCTCGAGAGAAGGCCATGCCGAGACGGAGGTGGGACAGTGGAGACTTGGAGAAGAGGGCGCTAAAA  
 GGAGACGTGTCAACTCTGATGATGCCAGAGGCCGCCGCGTACTCTCCGCCATGTATCCGTTGCCGAT  
 CCTGAACACAGATGGGCTGGTACGTACGGAACGTCTCATGGAGGTTATCGAGTACAACCGACAGCTCCACCCGCC  
 GCGTCTATGCTATACCGAGTTACACAGGCTGGGCTACCAGAGACCAAGCGAATAG

تصویر شماره ۴: توالی DNA ژن کنده پروتئین ۱۴ در سویه RH توکسیپلاسمای GRA14

GRA14:Dense Granule Antigen 14

دیگر که بر روی ژنهای مختلف توکسیپلاسمای انجام شده است، اولین قلم و پایه مطالعات بعدی جهت انجام بیان این ژن و تهیه پروتئین نوترکیب می‌باشد. در زمینه تهیه واکسن DNA علیه انگل توکسیپلاسمای گوندی، و نیز استفاده از آنتی ژنهای نوترکیب در طراحی کیت‌های تشخیصی، تحقیقات متعددی در ایران و دنیا انجام شده است؛ اما مطالعه‌ای برای انجام کلون و یا بیان ژن GRA14 انجام نشده است.

کواکب و همکاران، پروتئین P35 انگل توکسیپلاسمای گوندی را در وکتور pGEM-T LB21 باکتری اشرشیا کلی استفاده ترانسفورماسیون از سویه LB21 می‌نمودند. در این مطالعه، توالی ژن مورد نظر با توالی موجود در باانک جهانی ژن همخوانی ۱۰۰ درصدی را نشان داد.<sup>(۱۴)</sup> باسایی و همکاران، ژن بیان کنده GRA8 توکسیپلاسمای گوندی را در پلاسمید pET-28b(+) می‌دانستند.<sup>(۱۵)</sup>

کلون نمودند و سپس در باکتری Ecoli سویه DH5α ترانسفورم کردند. توالی این ژن نیز با توالی ژن باانک همخوانی کامل داشت.<sup>(۱۵)</sup>

باسایی و همکاران، پلاسمید کنده ژن GRA5 توکسیپلاسمای گوندی را در پلاسمید pcDNA3/1 کلون نمودند. برای بررسی بیان این ژن از سلول‌های HEK ۲۳۹-T بافت کلیه انسان استفاده شد و برآوش و سترن بلات و رنگ‌آمیزی فلورسنت مورد ارزیابی قرار گرفت.<sup>(۱۶)</sup> همچنین

## بحث

آنثی ژنهای دفعی-ترشحی انگل نقش مهمی در تحریک سیستم ایمنی میزبان دارند؛ به طوری که این نوع از آنتی ژنهای در عفونت‌های انسانی بسیار ایمونوژن هستند و محرك قوی تری نسبت به آنتی ژنهای محلول و کیستی، برای سیستم ایمنی سلولی می‌باشند. همچنین در مقایسه با آنتی ژن Tam توکسیپلاسمای سبب تحریک و تکثیر بیشتر لنفوسيت‌های T می‌شوند. از این رو، آنتی ژنهای دفعی-ترشحی به عنوان کاندیدای مناسب برای بررسی‌های ایمونیزاسیون پیشنهاد شده‌اند.<sup>(۳، ۶)</sup> گرانولهای ترشحی متراکم توکسیپلاسمای گوندی، اندام‌های ترشحی وزیکولار هستند و پروتئین‌هایی که در تغییر شکل واکوئل پارازیتوفروس و همچنین غشای این واکوئل در جهت حفظ و بقای انگل، ترشح می‌نمایند. تا کنون تعداد زیادی از گرانولهای ترشحی متراکم شناسایی شده‌اند که به طور کلی جزء آنتی ژنهای دفعی-ترشحی توکسیپلاسمای می‌باشند.<sup>(۹، ۱۰، ۱۲)</sup>

در مطالعه حاضر ژن گرانول ترشحی متراکم ۱۴ توکسیپلاسمای گوندی، برای اولین بار در سلول پروکاروتیک کلون گردید و مشاهده شد که قادر ناجیه ایترنون می‌باشد. آنالیز ژن مورد نظر و مقایسه آن با ژن ثبت شده برای GRA14 توکسیپلاسمای در باانک ژنی وجود هموژنیسیتی را در نوکلئوتیدها نشان داد. این مطالعه نیز همانند اکثر مطالعات

برخی از این نظر با مطالعه حاضر دارای تفاوت‌هایی می‌باشند. در این مطالعه از پلاسمید pTG19-T و باکتری Ecoli سویه Top10 استفاده شد و شان داد که جهت انجام کلون ژن GRA14، پلاسمید و باکتری پیش‌گفته مناسب می‌باشد. با توجه به این که کلون کردن و شناسایی ژن GRA14 در وکتور pTG19-T، گام نخست در جهت کلونینگ این ژن در وکتور بیانی و دستیابی به آتنی ژن نوترکیب GRA14 می‌باشد، بنابراین استفاده از آن در فرایند تولید کیت‌های تشخیصی و DNA واکسن جهت شناسایی و پیشگیری از ابتلا به عفونت توکسپلاسموز به ویژه در زنان باردار و افراد مبتلا به نقص سیستم ایمنی از جمله مبتلایان به HIV/AIDS (Human immunodeficiency virus) (infection/acquired immunodeficiency syndrome می‌تواند مفید واقع شود.

## سپاسگزاری

این مطالعه بخشی از پایان‌نامه آقای احسان احمدپور دانشجوی دوره دکتری تخصصی رشته انگل‌شناسی پزشکی می‌باشد که هزینه آن توسط دانشگاه علوم پزشکی مازندران طی طرح مصوب شماره ۳۲۷/۹۱ تأمین شده است. لذا از تمامی اعضای محترم گروه انگل‌شناسی و معاونت محترم پژوهشی دانشگاه کمال تشکر و قدردانی را دارد.

## References

- Weiss LM, Dubey JP. Toxoplasmosis: A history of clinical observations. *Int J Parasitol* 2009; 39(8): 895-901.
- Saadatnia G, Golkar M. A review on human toxoplasmosis. *Scand J Infect Dis* 2012; 44(11): 805-14.
- Weiss LM, Kim K. *Toxoplasma Gondii: The Model Apicomplexan. Perspectives and Methods.* Waltham, MA: Academic Press; 2011.
- Zhang M, Joyce BR, Sullivan WJ, Nussenweig V. Translational control in Plasmodium and toxoplasma parasites. *Eukaryot Cell* 2013; 12(2): 161-7.
- Kaye A. Toxoplasmosis: diagnosis, treatment, and prevention in congenitally exposed infants. *J Pediatr Health Care* 2011; 25(6): 355-64.
- Kur J, Holec-Gasior L, Hiszczynska-Sawicka E. Current status of toxoplasmosis vaccine development. *Expert Rev Vaccines* 2009; 8(6): 791-808.
- Montoya JG, Remington JS. Management of *Toxoplasma gondii* infection during pregnancy. *Clin Infect Dis* 2008; 47(4): 554-66.
- Daryani A, Hosseini AZ, Dalimi A. Immune responses against excreted/secreted antigens of *Toxoplasma gondii* tachyzoites in the murine model. *Vet Parasitol* 2003; 113(2): 123-34.
- Cesbron-Delauw MF. Dense-granule organelles of *Toxoplasma gondii*: their role in the host-parasite relationship. *Parasitol Today* 1994; 10(8): 293-6.
- Mercier C, Adjogble KD, Daubener W, Delauw MF. Dense granules: are they key organelles to help understand the parasitophorous vacuole of all apicomplexa parasites? *Int J Parasitol* 2005; 35(8): 829-49.

وزینی و همکاران نیز جهت کلونینگ ژن GRA7 توکسپلاسمما گوندیبی از پلاسمید pcDNA<sup>3</sup> و سویه Top10 باکتری اشرشیاکلی استفاده نمودند. در این بررسی، یان (Chinese hamster ovary) CHO در سلول‌های SDS-PAGE با استفاده از روش وسترن بلات و Sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel (electrophoresis تأیید شد (۱۷).

Bivas-Benita و همکاران، یک DNA واکسن حاوی ژن GRA1 را تهیه و پتانسیل ایجاد پاسخ ایمنی بعد از تجویز گوارشی را ارزیابی و مشاهده کردند که استفاده از واکسن پروتئینی GRA1 و سپس استفاده از پلاسمید GRA1 به عنوان IgG2a/IgG1 یادآور پاسخ ایمنی تؤمنان (Immunoglobulin 2a/immunoglobulin 1) تحریک می‌نماید (۱۸). در مطالعه Ram و همکاران نیز ژن GRA4 توکسپلاسمما در پلاسمید pQE-30 UA و باکتری اشرشیاکلی سویه M15 کلون گردید و ژن کلون شده در مقایسه با توالی ثبت شده در ژن بانک، همولوژی ۹۹/۲ درصد را نشان داد. از این ژن جهت ایمنی زایی در موش‌های آلووده شده به سویه RH توکسپلاسمما استفاده شد، که زمان بقای موش‌های آلووده به انگل، به مدت دو روز افزایش یافت (۱۹). نکته حائز اهمیت در مطالعات مختلف، استفاده از پلاسمیدها و سوش‌های مختلف باکتریایی جهت کلونینگ می‌باشد که

11. Rome ME, Beck JR, Turetzky JM, Webster P, Bradley PJ. Intervacuolar transport and unique topology of GRA14, a novel dense granule protein in *Toxoplasma gondii*. *Infect Immun* 2008; 76(11): 4865-75.
12. Liu G, Cui X, Hao P, Yang D, Liu J, Liu Q. GRA 14, a novel dense granule protein from *Neospora caninum*. *Acta Biochim Biophys Sin (Shanghai)* 2013; 45(7): 607-9.
13. Sambrook J, Russell DW. Molecular Cloning: A Laboratory Manual. Long Island, NY: Cold Spring Harbor Laboratory Press; 2001.
14. Kavakeb P, Kazemi B, Dorostkar Moghaddam D. Cloning, Expression and Characterization of *Toxoplasma gondii* P35 protein in *E. coli*. *Yakhteh Medical Journal* 2006; 8(3): 190-5.
15. Babaie J, Zare M, Sadeghiani G, Lorgard-Dezfouli M, Aghighi Z, Golkar M. Bacterial production of dense granule antigen GRA8 of *Toxoplasma gondii*. *Iran Biomed J* 2009; 13(3): 145-51.
16. Babaie J, Sadeghiani G, Golkar M. Construction and In vitro Expression Analyses of a DNA Plasmid Encoding Dense Granule GRA5 Antigen of *Toxoplasma gondii*. *Avicenna J Med Biotechnol* 2011; 3(3): 135-41.
17. Vazini H, Ghaffarifar F, Sharifi Z, Dalimi-Asl A. Characterization and expression of GRA7 gene of *Toxoplasma gondii* RH strain in eukaryotic pcDNA3 plasmid. *Feyz* 2013; 17(1): 8-13. (Persian).
18. Bivas-Benita M, Laloup M, Versteyhe S, Dewit J, De BJ, Jongert E, et al. Generation of *Toxoplasma gondii* GRA1 protein and DNA vaccine loaded chitosan particles: preparation, characterization, and preliminary in vivo studies. *Int J Pharm* 2003; 266(1-2): 17-27.
19. Ram H, Rao JR, Tewari AK, Banerjee PS, Sharma AK. Molecular cloning, sequencing, and biological characterization of GRA4 gene of *Toxoplasma gondii*. *Parasitol Res* 2013; 112(7): 2487-94.