

بررسی شیوع ناهنجاری‌های بارز دستگاه عصبی در متولدین بیمارستان ولی عصر زنجان، سال ۱۳۸۰-۸۱

*اصغر مرزبان (M.D.) ** منصور صادق زاده (M.D.) *** نورالدین موسوی نسب (Ph.D.)

چکیده

سابقه و هدف: ناهنجاری مادرزادی یک علت شایع بیماری، ناتوانی و مرگ و میر است. شیوع آن ۳-۵ درصد در نوزادان زنده به دنیا آمده می‌باشد. درمان و نوتولانی معلولین ناشی از آن هزینه هنگفتی را به جامعه تحمل می‌کند. هدف این مطالعه، تعیین فراوانی ناهنجاری بارز دستگاه عصبی در متولدین بیمارستان ولی عصر زنجان می‌باشد.

مواد و روش‌ها: تحقیق یک بررسی توصیفی- مقطعي و جامعه پژوهش، تمام نوزادان متولد شده در بیمارستان ولی عصر زنجان (۱۳۸۰/۷/۱ لغایت ۱۳/۸/۸) می‌باشد که حداقل یکبار توسط پزشک معاينة شده باشند. داده‌ها با مشاهده و معاينة جمع‌آوری و آزمایش شد و سپس با برنامه SPSS تجزیه و تحلیل شد.

یافته‌ها: از ۲۲۵۰ نوزاد تولد یافته، ۱۴ نوزاد با ناهنجاری بارز دستگاه عصبی (NTD) به دنیا آمد. بنابراین شیوع آن ۶/۲ در ۱۰۰۰ تولد بود. شایع ترین ناهنجاری، اسپینویفیدا سیستیکا (منتگومیلوسل و منتگوسل) بود (۷۱ درصد).

محل سکونت زندگی اکثر مادران نوزادان با ناهنجاری، روستا (۷۸ درصد) و اکثر نوزادان با ناهنجاری لوله عصبی (NTD) ترم بودند (۷۱ درصد). ۲۱ درصد مادران، سابقه قبلی تولد نوزاد با NTD و ۴۲ درصد، سابقه سقط جنین داشتند. همچنین بین بروز ناهنجاری و وضعیت اجتماعی- اقتصادی، رابطه معنی‌داری وجود داشت.

استنتاج: در مقایسه با میزان بروز NTD در کشورهای توسعه یافته (۰/۵-۰/۸ در ۱۰۰۰ تولد)، شیوع ناهنجاری بارز دستگاه عصبی در مطالعه حاضر به طور چشمگیری بالا بود (۶/۲ در ۱۰۰۰ تولد).

واژه‌های کلیدی: ناهنجاری مادرزادی، ناهنجاری بارز لوله عصبی، وضعیت اقتصادی- اجتماعی

مقدمه

ناهنجاری که نیاز به جراحی وسیع داشته باشد را آنومالی مأمور نامند(۱).

۳-۵ درصد تمام نوزادان زنده به دنیا آمده دارای یک یا چند ناهنجاری مادرزادی می‌باشند(۲) و ۲ درصد

ناهنجاری مادرزادی به عنوان نقص ساختمانی آشکار در موقع تولد تعریف شده است، اما هیچ گاه ذکر نشده که این آشکار بودن صرفاً برحسب مشاهده یا براساس معاینات پاراکلینیکی و بالینی می‌باشد.

✉ بهشهر: خیابان امام- بیمارستان امام خمینی (ره)

* متخصص کودکان و نوزادان بیمارستان امام بهشهر

** متخصص اطفال، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

*** متخصص آنار، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

**** تاریخ دریافت: ۱۴/۷/۸۳ تاریخ تصویب: ۲۵/۹/۸۳ تاریخ ارجاع جهت اصلاحات: ۲۳/۶/۸۴

نوزاد، نوع ناهنجاری قابل رویت بود. در پایان با استفاده از نرم افزار SPSS داده‌ها تجزیه و تحلیل شد.

یافته‌ها

از ۲۲۵۰ نوزاد متولد شده، ۳۷ درصد زایمان‌ها از طریق سزارین بود. در طی مدت مطالعه، ۱۴ نوزاد با ناهنجاری دستگاه عصبی متولد شدند که شیوع ۶/۲ در ۱۰۰۰ تولد را نشان می‌دهد. توزیع انواع ناهنجاری لوله عصبی در جدول شماره ۱ نشان داده شده است. شایع‌ترین ناهنجاری لوله عصبی، اسپینا بیفیدا سیستیکا (متنگومیلوسل و متنگوسل) با ۷۱ درصد بود(۱). فراوانی ناهنجاری دستگاه عصبی در بارداری سوم تا ششم حداکثر و سن اکثر مادران در گروه ناهنجاری بین ۱۸-۳۵ سال بود (۷۱ درصد).

محل سکونت اکثر نمونه‌ها در گروه ناهنجاری، روستا (۷۸ درصد) و اکثر نوزادان با ناهنجاری‌های لوله عصبی، ترم به دنیا آمده و اکثرا پسر بودند (۷۱ درصد) جدول شماره ۲.

جدول شماره ۲: توزیع فراوانی ناهنجاری ستون فقرات بر حسب محل سکونت خانواده در نوزادان متولد شده در بیمارستان ولی‌عصر زنجان، سال ۸۱-۱۳۸۰

محل سکونت	آنومالی ستون فقرات		
	کل	ندارد	دارد
روستا	۹۸۲	۹۷۱	۱۱
شهر	۱۱۳۹	۱۱۲۶	۳
کل	۲۱۲۱	۲۱۰۷	۱۴

تولد های زنده، ناهنجاری مادرزادی شدید دارند. در این میان ناهنجاری لوله عصبی، ۶۰ درصد نفایص مادرزادی را در متولدین زنده و مرده در بر می‌گیرد(۳).

بررسی در دو مرکز زایمانی تهران (۷۱-۷۲) شیوع ناهنجاری بارز دستگاه عصبی را ۴/۷ در ۱۰۰۰ تولد نشان داد(۴).

درمان و نتوانی معلولین ناشی از ناهنجاری مادرزادی هزینه هنگفتی را به جامعه بشری تحمیل می‌کند. لذا شناخت و پیش‌گیری از بروز ناهنجاری‌های مادرزادی برای جوامع بشری به مراتب با صرفه‌تر می‌باشد. نظر به اهمیت مسأله و نبودن آمار دقیق از شیوع ناهنجاری دستگاه عصبی در این منطقه جغرافیایی، مطالعه در این خصوص ضروری به نظر می‌رسد.

مواد و روش‌ها

مطالعه از نسخه توصیفی- مقطعی (CROSS-SECTIONAL) و جامعه پژوهش، کلیمه نوزادان متولد شده که حداقل یکبار توسط پزشک معاینه شده باشند، می‌باشد(۱). این بررسی از تاریخ ۸۰/۶/۱ لغایت ۸۱/۳/۱ در بیمارستان ولی‌عصر زنجان انجام گرفت.

جهت جمع‌آوری اطلاعات، از پرسشنامه خود ساخته استفاده شد که بعد از معاینه و مشاهده توسط پزشک کودکان تکمیل می‌شد. پرسشنامه شامل مشخصات مادر، محل سکونت، نوع زایمان، مشخصات عمومی

جدول شماره ۱: توزیع فراوانی ناهنجاری مادرزادی لوله عصبی بر حسب انواع آن در نوزادان متولد شده در بیمارستان ولی‌عصر زنجان، سال ۸۱-۱۳۸۰

فرابوی	متنگوسل	میلومنگوسل	جمع *
۶	۴	۱	۱۷

* دو بیمار با علائم مشترک (هیدروسفالی، میلومنگوسل و کرانیوسینوستوز) متولد شدند.

بحث

ناهنجاری‌های مادرزادی در مراحل مختلف رشد و تکامل جنین انسان می‌تواند به وجود بیاید. نقايسن لوله عصبی که به علت اشکال در بسته شدن لوله عصبی می‌باشد از شایع‌ترین ناهنجاری‌های مادرزادی است (۲ تا ۵).

نتایج تحقیق مشابه در دیگر نقاط کشور (۴، ۱۰) (اراک، ۷/۶ در ۱۰۰۰ تولد و تهران، ۷/۴ در ۱۰۰۰ تولد) نشان می‌دهد که ناهنجاری در ایران نسبت به کشورهای دیگر شیوع بالاتری دارد. چنانچه نتایج تحقیق در امریکا، شیوع آن را ۰/۵ تا ۰/۸ در ۱۰۰۰ تولد و در استرالیا ۲/۴ در ۱۰۰۰ تولد نشان داده است (۳).

وضعیت اجتماعی- اقتصادی از عوامل موثر بر تولد نوزادان ناهنجار می‌باشد. در مطالعه مشابه در کالیفرنیا، وضعیت اقتصادی- اجتماعی پایین و اقامت در مناطق روستایی سبب افزایش دو برابر خطر NTD^۱ شده است (۷، ۶)، که با مطالعه حاضر همسو می‌باشد.

مطالعات نشان می‌دهد که نقص لوله عصبی (NTD) در جوامعی که از نظر تغذیه‌ای ضعیف هستند، فراوان‌تر است. مطالعه‌ای در مجارستان نشان داد که در ۲۱۰۴ مادری که روزانه ۰/۸ میلی‌گرم فولیک اسید مصرف می‌کردند، هیچ مورد NTD مشاهده نشد. اما شیوع آن در ۲۰۲۵ مادری که اسید فولیک دریافت نکردند، ۶ مورد بود (۸).

در مطالعه حاضر ۴۲ درصد مادران دارای نوزاد NTD، سابقه سقط جنین داشتند که در مقایسه با تحقیقی که در مکزیک انجام گرفت، بیشتر بود؛ به طوری که در مکزیک ۲۷ درصد مادران سابقه سقط داشتند (۹). همچنین ۷۱ درصد نوزادان ناهنجار، مذکور و ۲۸ درصد، مونث بودند که با مطالعه مشابه در تهران که ۵۱ درصد

همچنین ۴۲ درصد گروه ناهنجاری از طریق سزارین به دنیا آمدند. در بررسی تاریخچه بارداری مادران، ۴۲ درصد سابقه سقط جنین و ۲۱ درصد سابقه تولد نوزاد با ناهنجاری لوله عصبی داشتند و نیزیکی از مادران سابقه بیماری تبدیل در طی بارداری را گزارش نمود. همه مادران در گروه ناهنجاری، خانه دار بودند. جدول شماره ۳ توزیع فراوانی ناهنجاری لوله عصبی را بر حسب برخی از مشخصه‌های مادران نشان می‌دهد.

سنه‌نوزاد در گروه ناهنجاری، پاچنبری بوده و همچنین دو نوزاد بیش از یک نوع ناهنجاری دستگاه عصبی داشتند (هیدروسفالی همراه متگومیلوسل، کرانیوسینوستوز).

جدول شماره ۳: توزیع فراوانی ناهنجاری مادرزادی لوله عصبی بر حسب برخی از مشخصه‌های مادر در نوزادان متولد شده در بیمارستان ولی عصر زنجان، سال ۱۳۸۰-۸۱

متغیر	تعداد (درصد)	نوزادان با ناهنجاری لوله عصبی
جنس		
مذکور	۱۰ (۷۱)	
مونث	۴ (۲۸)	
سابقه سلطه مادر		
داشت	۶ (۴۲)	
نداشت	۸ (۵۷)	
سابقه تولد نوزاد ناهنجار		
داشت	۳ (۲۱)	
نداشت	۱۱ (۷۸)	
منطقه سکونت		
روستا	۱۱ (۷۸)	
شهر	۳ (۲۱)	
نوع زادمان		
سزارین	۶ (۴۲)	
طیبی	۸ (۵۷)	
حدت بارهاری		
ترم	۱۰ (۷۱)	
نارس	۴ (۲۸)	
تعداد گیاوید		
۲-۱	۵ (۳۵)	
۶-۳	۷ (۵۰)	
۷	۲ (۱۴)	
سن مادر		
کمتر از ۱۸	۱ (۷)	
۲۰-۱۸	۱۰ (۷۱)	
بیشتر از ۲۰	۳ (۲۱)	
جمع:	۱۶ (۶/۲)	

1. Neural Tube Defect

مادران، کاهش بارز در بروز NTD در دو دهه اخیر نسبت به سال‌های قبل از ۱۹۷۰ به وجود آمده است (۱۴، ۱۳). انجمن ملی سلامت آمریکا مصرف روزانه ۰/۴ میلی‌گرم اسید فولیک برای همه زنان در سن بارداری و ۴ میلی‌گرم روزانه برای همه زنانی که سابقه نوزاد با ناهنجاری لوله عصبی دارند، ازیک ماه قبل از بارداری تا حداقل سه ماه بعد از بارداری را توصیه می‌کند (۲ تا ۱۵).

باتوجه به نتایج این مطالعه پیشنهاد می‌شود که شیوع و علل ناهنجاری مادرزادی در دیگر مناطق کشور و ارتباط آن با عوامل همه گیر شناسی، اقتصادی- اجتماعی... بررسی گردد و نیز به مادرانی که سابقه تولید نوزاد ناهنجار دارند، جهت انجام مشاوره ژنتیک آموزش داده شود.

نوزادان ناهنجار مونث بودند، قابل مقایسه می‌باشد (۴). علی‌رغم تاثیر افزایش سن مادر بر ناهنجاری‌های مادرزادی، سن ۷۱ درصد مادران نوزادان ناهنجار ۱۸ تا ۳۵ سال بود و سن بارداری نیز در ۷۱ درصد آنان ترم بود. در این مطالعه، بیشترین نوع ناهنجاری عصبی از نوع میلومتگوسل بود که با نتایج مطالعه مشابه در اراک همسویی دارد (۱۰).

بر طبق گزارش موسسه ملی سلامت کودکان و تکامل انسان (۱۹۹۵)، ژن مسبب نقص NTD شناسایی شده است که ممکن است ناشی از نقص در تولید یک آنزیم ضروری برای استفاده از فولات (۱۱ تا ۱۲) باشد. در مطالعه‌ای در انگلیس، با افروختن فولات در غذای روزانه

فهرست منابع

1. Nederi's congenital Abnormalities in newborn of consanguineous & nonsanguineous Parents *A.J Obs & Gyn.* 1979; 53(2): 195.
2. Behrman RE, Kliegman RM, Arvin AM. *Nelson text book of pediatrics* 16th ed. London, saunders, 2000: 1803-1806.
3. Youman S. *Neurological Surgery*. 3rd ed. New York; NY; 1990; (2): p. 39; 40.
4. Katabchi, Ghodsi, Nejat. Incidence of gross nervous system anomalies in newborns at two obstetric centers in Tehran. *j-of medical council of I.R.I.* 2000; 18(4): 227-281.
5. Fazel, keithl.Moore. *The Developing Human*, 4th ed. Mashhad; asfand. 1992; 419-459.
6. Shaw AM, Todoroff K, Velie EM. Maternal illness-fever& NTD teratology. 1998 Jan; 57(1): 1-7.
7. Wasserman CR, Shaw GM, Selvin S. socioeconomic status, and NTD. *Am J public Health*. 1998 Nov; 88(11):1674-80.
8. Czeizel A, Dudas I. Prevention of the first occurrence of neural tube efects by Periconceptional vitamin supplementation. *N Engl med J*, 1992; 327: 1832-1835.
9. Rivas F, Davalos IP, Olivares N. Reproductive in mothers of children with NTD. *J of Gyn Obs invest*. 2000; 49(4): 255-60.
10. Shah Mohammadi A, Alvay M. Incidence of Congenital gross anomaly in newborns at the Taleghani Hospital of Arak. *J. of Arak Rahavard Danesh*. 1376; 4(1): 23-9.
11. Christina H. Is there etiologic heterogeneity between upper & lower NTD? *Am J Epidemiology*. 1992; 136: 1493-1501.

12. Stondford MK. NTD etiology, New evidence concering maternal hypertherm in health & diet. *Develop Med & Neur.* 1992; 67-9.
13. Murphy M,Whiteman D,Stone D.Dietary folate & the prevalence of NTD in the British *BJO*. 2000 Jul; 107(7): 885-9.
14. Vollset SE, Lande B. Knowledge & attitudes of folate &use of dietary supplements among woman of reproductive age. *Act Ob & Gy Scond.* 2000 Jun; 79(6): 513-9.
15. Cunningham FG, Macdonald PC, Gant NF, et al. Williams obstetric & Gynecology. 12th ed. London,prentice Hall international. 1997. 895-917.