

The usage pattern of Anti-inflammatory drugs-steroidal and non-steroidal- in patients referred to 13 Aban pharmacy in Sari

Shahram Ala, Roja Hadian

Faculty of Pharmacy, Behavioral Sciences Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

(Received 12 September, 2009 ; Accepted 18 November, 2009)

Abstract

In the present study, the usage pattern of Anti-inflammatory drugs-steroidal and non-steroidal- in patients referred to 13 Aban Pharmacy in Sari was evaluated. The results show a high rate of anti-inflammatory drug prescriptions, mainly by general practitioners with ibuprofen, diclofenac and mefenamic acid being the most widely used NSAIDs and prednisolone, dexamethasone and betamethasone being the most prescribed corticosteroids respectively. Training physicians regarding the rational use of anti-inflammatory drug prescriptions may be effective in modifying the usage pattern of these drugs and avoiding the risks associated with their heavy usage.

Key words: Anti-inflammatory, steroidal, non-steroidal, usage pattern

J Mazand Univ Med Sci 2009; 19(72): 82-84 (Persian).

بررسی الگوی تجویز داروهای ضدالتهاب استروئیدی و غیر استروئیدی در بیماران مراجعه کننده به داروخانه ۱۳ آبان شهرستان ساری سال ۸۷

شهرام علا^۱ رجا هادیان^۲

هدف از این مطالعه، بررسی الگوی تجویز سالانه داروهای ضدالتهاب (کورتیکواستروئیدی و غیر استروئیدی) توسط پزشکان جهت ارائه راهکارهایی در راستای کاهش تجویز غیرمنطقی این داروها و کاهش عوارض جانبی ناشی از مصرف بی رویه آنها می باشد. علت انتخاب این دو دسته دارویی، پرمصرف بودن آنها و وسعت جمعیت هدف مصرف کننده این داروها هم از لحاظ تعداد و هم از نظر محدوده سنی و علت انتخاب داروخانه ۱۳ آبان مرجع بودن این داروخانه در سطح شهرستان و استان و حجم بیشتر نسخ ارجاعی به آن در مقایسه با سایر داروخانه های سطح شهر و در نتیجه امکان بررسی نسخ در سطح وسیعتر بوده است. اطلاعات مربوط به نسخ از تاریخ ۸۷/۱/۱ الی ۸۷/۱۲/۳۰ با استفاده از نرم افزار داروساز دکتر وکیل از بانک اطلاعاتی داروخانه استخراج شد. تعداد نسخ حاوی داروی ضد التهاب غیراستروئیدی (NSAID) و گلوکوکورتیکوئیدها، تعداد کل داروهای تجویز شده از هر دسته به تفکیک فصول مختلف سال، میانگین تجویز اقلام دارویی هر دسته در نسخ بررسی شد و همچنین پرمصرف ترین داروهای هر دسته به تفکیک اشکال دارویی، میانگین میزان تجویز آنها در نسخ و بیشترین پزشکان تجویز کننده این داروها مشخص شدند. تعداد کل نسخ مورد بررسی ۸۶۶۶۸ نسخه بوده است.

جهت آنالیز آماری داده ها از نرم افزار Excel 2007 و SPSS 15 و از آزمون های آماری t-Test و X^2 استفاده شد و مقادیر $p < 0/05$ معنی دار در نظر گرفته شد. میزان کل فروش NSAID ها در سال ۸۷، ۴۸۴۷۰۵ عدد بوده است. میانگین تعداد NSAID های تجویز شده در نسخ ۲۰/۳۳ عدد در هر نسخه و بیشترین میزان تجویز مربوط به پزشکان عمومی می باشد. تعداد نسخ حاوی NSAID ها ۲۳۸۳۱ نسخه بوده که ۲۷/۴۹ درصد کل نسخ می باشد که در مقایسه با مطالعه قبلی انجام شده در ساری در فاصله سال های ۱۳۷۸-۱۳۸۰ رشد اندکی را نشان می دهد ولی این تفاوت از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد ($p < 0/01$) (۱). در بین NSAID ها ایبوپروفن (۲۶/۵۷ درصد)، دیکلوفناک (۲۱/۸۰ درصد) و مفنامیک اسید (۱۳/۴۰ درصد) به ترتیب بیشترین میزان تجویز را داشته اند. ولی در مطالعه قبلی پرمصرف ترین NSAID ها به ترتیب دیکلوفناک و پیروکسیکام بوده ایبوپروفن و مفنامیک اسید در رده های بعدی قرار داشتند (۱). این مطلب نشان دهنده تغییر در روند تجویز داروهای NSAID در شهر ساری در طی این فاصله زمانی می باشد. در مطالعات انجام شده در ایالات متحده آمریکا، فرانسه، ایتالیا و فنلاند نیز ایبوپروفن پرمصرف ترین داروی NSAID بوده است (۵-۲).

E-mail: hadian.r@gmail.com

مؤلف مسئول: رجا هادیان- ساری: میدان معلم، داروخانه شبانه روزی سیزده آبان

۱. گروه داروسازی بالینی، دانشکده داروسازی، مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مازندران

۲. داروخانه سیزده آبان، دانشگاه علوم پزشکی مازندران

تاریخ دریافت: ۸۸/۶/۲۱ تاریخ ارجاع جهت اصلاحات: ۸۸/۷/۱۸ تاریخ تصویب: ۸۸/۸/۲۷

در کشور انگلستان نیز پرمصرف ترین گلوکو کورتیکوئید پردنیزولون بوده است (۸).

مقایسه میزان مصرف NSAID ها و گلوکو کورتیکوئیدها در فصول مختلف سال تفاوت معنی داری را برای هر دو دسته دارویی نشان می دهد ($p < 0/003$). میزان تجویز هر دو دسته دارویی در فصل تابستان نسبت به فصل بهار کاهش مختصری داشته در فصل پاییز و زمستان افزایش قابل ملاحظه ای می یابد که طبیعتاً ناشی از اثر دمای هوا بر میزان بروز بیماری های التهابی حاد می باشد.

در مجموع نتایج این مطالعه نشانگر بالا بودن میزان مصرف داروهای ضد التهاب در این منطقه می باشد که صرف نظر از شرایط اقلیمی که منجر به بالا بودن میزان بروز آلرژی نسبت به برخی مناطق دیگر می شود، به نظر می رسد بخشی از این امر به علت الگوی نادرست تجویز داروهای ضد التهاب توسط پزشکان به ویژه پزشکان عمومی می باشد. تصور می شود برگزاری دوره های آموزشی تجویز منطقی داروهای ضد التهاب برای پزشکان می تواند در کاهش تجویز بی رویه این دسته داروها مؤثر باشد.

در بین اشکال دارویی مختلف NSAID ها، قرص پرمصرف ترین شکل دارویی می باشد که ۵۵/۰۳ درصد از کل تعداد NSAID های تجویز شده را به خود اختصاص داده است.

میزان کل فروش گلوکو کورتیکوئیدها در سال ۸۷، ۱۵۶۲۳۵ عدد بوده است. میانگین میزان تجویز آنها ۱۰/۸۶ عدد در هر نسخه و بیشترین میزان تجویز مربوط به پزشکان عمومی بوده است. گلوکو کورتیکوئیدها جمعاً در ۱۷۶۶۰ نسخه یعنی در ۲۰/۳۷ درصد نسخ تجویز شده اند که در مقایسه با آمار مربوط به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و همچنین نتایج مربوط به مطالعه انجام شده در شهر تبریز در سال ۱۳۸۱ اختلاف قابل ملاحظه ای را نشان نمی دهد ($p < 0/005$) (۶-۷).

پردنیزولون (۷۲/۹۳ درصد)، دگزامتازون (۱۱/۹۸ درصد) و بتامتازون (۷/۳۱ درصد) به ترتیب پرمصرف ترین گلوکو کورتیکوئیدها بوده اند ولی در مطالعه انجام شده در تبریز برعکس، بیشترین گلوکو کورتیکوئید تجویز شده بتامتازون و کمترین پردنیزولون می باشد (۶) که نشانگر تفاوت الگوی تجویز گلوکو کورتیکوئیدها در این دو منطقه کشور می باشد.

References

1. Ebrahimzadeh M A, Gholami Kh, Gaharanjik U, Javadian S.M. Evaluation of drug interactions of Non-steroidal Anti-inflammatory drugs (NSAIDs) in Sari insured prescriptions during 1999-2001. J Iran Uni Med Sci 2003; 36(1): 489-496 (Persian).
2. El-Serag HB, MPH, Graham DY, Richardson P, Inadomi JM. Prevention of Complicated Ulcer Disease among Chronic Users of Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs. Arch Intern Med 2002; 162: 2105-2110.
3. Maison P, Guillemot D, Vauzelle-Kervroëdan F, Balkau B, Sermet C, Thibault N, et al. Trends in aspirin, paracetamol and non-steroidal anti-inflammatory drug use in children between 1981 and 1992 in France. Eur J Clin Pharmacol 1998; 54: 659-664.
4. Motola G, Russo F, Mazzeo F, Rinaldi B, Capuano A, Rossi F, et al. Over-the-Counter Oral Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs: A Pharmacoepidemiologic Study in Southern Italy. Advances In Therapy 2001; 18(5): 216-222.
5. Helin-Salmivaara A, Klaukka T, Huupponen R. Heavy users of non-steroidal anti-inflammatory drugs: a nationwide prescription

- database study in Finland. Eur J Clin Pharmacol 2003; 59: 477-482.
6. Khadiv S. Evaluation of pattern of prescription of Glucocorticoid drugs in Tabriz in the year 1381. Doctoral Thesis. Faculty of Pharmacy. Tabriz Uni Med Sci.
7. Available from: [http:// www.behdasht.gov.ir](http://www.behdasht.gov.ir). Accessed September 1, 2009.
8. Van Staa T.P, Leufkens H.G.M, Abenhaim L, Begaud B, Zhang B, Cooper C. Use of oral corticosteroids in the United Kingdom. Q J Med 2000; 93: 105-111.

Archive of SID