

بررسی فراوانی کم وزنی هنگام تولد (LBW) و برخی عوامل وابسته به آن در شهر تنکابن در سال ۱۳۸۱

حسن فلاح باقر شیدایی^{***(M.D.)} محمد هادی بهادری^{+***(Ph.D.)} سیده زهرا حسینی^{*(M.D.)}

چکیده

سابقه و هدف : کم وزنی هنگام تولد (LBW) از شاخص‌های مهم بهداشتی هر کشور است. به منظور بررسی میزان تولد نوزادان کم وزن و برخی عوامل مرتبط، مطالعه‌ای در سال ۱۳۸۱ در شهرستان تنکابن انجام شد.

مواد و روش‌ها : مطالعه به روش Cross-sectional انجام شد. هر نوزاد که وزن کمتر از ۲۵۰۰ گرم داشت، وارد مطالعه می‌گشت. جهت مقایسه عوامل خطر وابسته، نوزادان با وزن طبیعی که قبل و پس از نوزاد کم وزن متولد شده بودند نیز وارد مطالعه می‌شدند. پرسشنامه با معاینه نوزاد و مصاحبه با مادر پرداخت. توزین با ترازوی Seca انجام شد. برای نمایش داده‌ها از آمار توصیفی و رگرسیون لجستیک استفاده شد. همچنین برای هر یک از عوامل خطر، نسبت شانس در فاصله اطمینان ۹۵ درصد محاسبه گشت.

یافته‌ها : در مدت مطالعه ۲۰۱۶ نوزاد متولد شد. ۸۵ تن از نوزادان (۴/۴ درصد) نوزادان کم وزن بوده (فاصله اطمینان ۹۵ درصد از ۴/۶، ۳/۸ درصد) و ۷ تن از نوزادان (۴/۳۴ درصد) دارای وزن بسیار کم (VLBW) بودند. کمبود وزن یا نارسی (P<0/۰۰۰)، رتبه حاملگی (۰/۰۴۲)، نوع زایمان (P<0/۰۲۵)، نوع زایمان قبلی (P<0/۰۳) به لحاظ آماری مرتبط بود. اما با جنس نوزاد و سن مادر مرتبط نبود.

استنتاج : فراوانی LBW در تنکابن کمتر از میانگین کشوری است. علت آن احتمالاً وضعیت سیستم اقتصادی و تغذیه‌ای مردم این منطقه نسبت به میانگین کشوری می‌باشد.

واژه‌های کلیدی : کم وزنی، نوزادان، کم وزنی هنگام تولد

مقدمه

کودکی نیز، ۴۰ برابر نوزادان با وزن طبیعی است (۲). فراوانی این پدیده در کشورهای توسعه یافته حدود ۴ درصد و در کشورهای در حال توسعه ۱۶/۴ درصد نوزادان زنده گزارش شده است (۱ا). مطالعه در بعضی از شهرهای استان مازندران میزان کم وزنی هنگام تولد

کم وزنی هنگام تولد (LBW) از شاخص‌های مهم بهداشتی هر کشور است، زیرا از عوامل مهم برای رشد و تکامل طبیعی و حتی بقاء نوزادان و شیرخواران می‌باشد (۱). مرگ و میر نوزادان کم وزن، ۲۴ برابر نوزادان با وزن طبیعی و حتی مرگ و میر آن‌ها در دوره

* رشت: دانشگاه پزشکی بخش علوم تشریحی

* متخصص کودکان (استادیار) دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن

** دکترای تخصص بافت‌شناسی و جنین‌شناسی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

تاریخ دریافت: ۸۳/۶/۱۰ تاریخ ارجاع جهت اصلاحات: ۸۳/۸/۲۰ E

تاریخ تصویب: ۸۴/۳/۲۵

ترازوی مدل Seca مخصوص نوزادان (با دقت ۱۰ گرم) و جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و همچنین رگرسیون لجستیک به منظور بررسی همبستگی عوامل خطر استفاده شد. نسبت شانس (OD) برای هر یک از عوامل خطر با فاصله اطمینان ۹۵ درصد محاسبه شد.

یافته‌ها

در مدت مطالعه ۲۰۱۶ نوزاد متولد شدند. تعداد نوزادان کم وزن در هنگام تولد (LBW)، ۸۵ نفر (۴/۲ درصد) با فاصله اطمینان ۹۵ درصد از ۳/۸ و ۶/۴ درصد (Z score) برای جوامع مشابه محاسبه شد. در این مدت، ۷ نوزاد زیر ۱۵۰۰ گرم (V LBW) بودند (۴/۰ درصد).

همبستگی بین LBW و متغیرهای موردنظر در جدول شماره ۱ نمایش داده شده‌اند. نسبت شانس (OD) برای هر یک از عوامل خطر محاسبه شد که در جدول ملاحظه می‌شود. همبستگی زایمان زودرس، رتبه حاملگی، نوع زایمان، فاصله با زایمان قبلی معنی‌دار بودند. اما همبستگی بین LBW با جنس نوزاد ($P=0/۳$) و سن مادر ($P=0/۷$) معنی‌دار نبود.

^۱LBW را ۶/۲ درصد گزارش کرده است (۴)، که کمتر از میزان پیش‌بینی شده توسط سازمان جهانی بهداشت (WHO) برای کشور ما بوده است (۲). همچنین از متوسط آمار کشوری (۴) نیز کم‌تر می‌باشد.

همواره این نگرانی وجود دارد که نوزادان، با لباس و یا به گونه‌ای نامناسب وزن شده باشند و یا گزارش‌دهی به درستی انجام نشده باشد. لذا به منظور تعیین فراوانی LBW و برخی عوامل خطر وابسته، مطالعه‌ای در سال ۱۳۸۱ بیمارستان شهید رجایی تنکابن انجام شد.

مواد و روش‌ها

مطالعه از نوع توصیفی و به روش مقطعی (cross-sectional) انجام شد. در این بررسی هر نوزاد که با وزن ۲۵۰۰ گرم یا کمتر متولد می‌شد، وارد مطالعه می‌گشت و پرسشنامه تحقیق با معاینه نوزاد و مصاحبه مادر پرمی‌گشت. جهت مقایسه عوامل خطر وابسته، نوزادان با وزن طبیعی که قبل و پس از نوزادان مورد نظر، متولد شده بودند نیز وارد مطالعه می‌شدند و همان پرسشنامه برایشان پرمی‌گشت. جهت توزین نوزادان از

جدول شماره ۱: تعداد نوزادان متولد شده بالای ۲۰۰۰ گرم و تعداد نوزادان کم وزن بر حسب متغیرهای مختلف مورد بررسی در تنکابن در سال ۸۱

متغیر	گروه	تعداد طبیعی	تعداد درصد تولد زنده	تعداد درصد تولد زنده LBW	P value	CI 95%	OD
سن حاملگی	به موقع زودرس	(%) ۱۳۹/۱	(%) ۱۳۹/۷	(%) ۲۷/۱	p = .۰/۰۰۰	۰/۲۸۵ to ۱۷۵۰۱	OD = ۹/۶۳
سن حاملگی	اول زاید و دومین حاملگی و بالاتر	(%) ۳۱/۱	(%) ۳۱/۸	(%) ۵۸/۲	p < ۰/۰۴۲	.۹۹۶ to ۲/۸۸۶	OD = ۱/۶۹۵
جنس	ذکر	(%) ۹۲/۴	(%) ۹۲/۵	(%) ۵۳/۴	p < ۰/۱۳۲	.۷۵۱ to ۲/۱۳۲	OD = ۱/۲۶
سن مادر	زیر ۲۰ سال	(%) ۱۶/۵	(%) ۹/۵	(%) ۹/۱	p < ۰/۷۰۵	.۹۹۵ to ۲/۸۴۵	OD = ۱/۶۸
نوع زایمان	سرزارین طبیعی	(%) ۱۴۱/۲۰	(%) ۹/۶	(%) ۳۷/۵	p < ۰/۰۲۵	.۹۹۵ to ۲/۸۴۵	OD = ۱/۶۸
فاصله از حاملگی قبلی	بدون زایمان قبلی	(%) ۱۳/۳۵	(%) ۹/۷	(%) ۵۳/۴	p < ۰/۰۳۳	.۹۹۵ to ۲/۸۴۵	OD = ۱/۶۸

1. Low Birth Weight

بحث

مطالعه حاضر سن بالاتر از ۳۵ سال مادر هم رابطه معنی داری با بروز LBW نشان نداد. شاید علت این امر، محدود بودن تعداد حاملگی مادران و فاصله گزاری مناسب بوده که خطر سن بالاتر مادر را جبران کرده است، زیرا در بسیاری از مطالعات، سن بالای مادر عامل خطر برای LBW شناخته شده است (۷،۱).

یکی دیگر از عوامل خطر، فاصله زایمان از رایمان قبلی است که در مطالعه شاذی از اصفهان و گرمارودی از تهران نیز مشابه مطالعه حاضر بوده است (۶،۳).

در مورد جنس نوزاد، در این مطالعه ارتباط معنی داری یافت نشد. مطالعه رحیمی (۸)، ارشادی (۵) و خوری نیز مشابه بررسی حاضر بود. سازمان جهانی بهداشت (WHO) جنس مونث را بیشتر در معرض خطر کم وزنی معرفی می کند (۱۰،۹) در مطالعه حاجیان از بابل نیز کم وزنی در دختران بیشتر مشاهده شد (۴). زایمان به روش سزارین از عوامل خطر شناخته شده به خصوص برای نارسی و کم وزنی است (۱۲،۱۱). این یافته هم مشابه مطالعه نژادشمی، رحیمی و ارشادی بود (۱۳،۸،۶).

گرچه فراوانی نوزادان کم وزن و بسیار کم وزن در تکابن بالا نمی باشد، روشن شدن عوامل خطری چون نارسی، سزارین های بدون توجه به رسیدگی جنینی و همچنین پیشگیری از حاملگی با فاصله کمتر از ۳ سال می تواند در کمتر شدن این عامل خطر که منجر به بستره شدن نوزادان و حتی مرگ و میر می شود، موثر باشد.

فراوانی LBW؛ در تکابن کمتر از میانگین کشوری (۸-۱۰/۶ درصد) می باشد (۴). علت آن احتمالاً وضعیت بهتر اقتصادی و تغذیه ای مردم این منطقه نسبت به میانگین کشوری است.

گرمارودی و همکاران در سال ۱۳۸۰ (۳) فراوانی LBW را در تهران ۴/۴ درصد گزارش نمودند که کاملاً مشابه یافته مطالعه حاضر است. فراوانی LBW در مطالعه ارشادی و همکاران (۵) از کاشان ۱/۵ درصد؛ شاذی و همکاران (۶) از اصفهان (۶ درصد)، حاجیان (۴) از بابل ۶/۳ (۲ درصد)، خوری و همکاران (۷) از گرگان (۴/۲ درصد) و رحیمی شعباباف و همکاران (۸) از تهران (۹/۲ درصد) همگی بیشتر از این مطالعه می باشد.

مهمنترین عامل خطرساز مانند تمام مطالعات، زایمان زودرس بود و تفاوت آمارهای فوق علاوه بر عوامل اقتصادی- اجتماعی می تواند ناشی از تفاوت در میزان زایمان زودرس باشد.

از دیگر عوامل مرتبط، رتبه حاملگی بود و زایمان اول در مطالعه دیگران نیز مانند مطالعه حاضر معنی دار بود. ارتباط سن مادر (حتی زیر ۲۰ سال) با LBW در این مطالعه معنی دار نبود. این رابطه در بررسی تهران، اصفهان و کاشان هم معنی دار نبود ولی در مطالعه حاجیان از بابل، شیوع کم وزنی در نوزادان مادران کمتر از ۱۹ سال نسبت به مادران مسن تر، بیشتر بود (۰/۰۵). در

فهرست منابع

- World Health Organization. Birth weight. *J Word Pediatrics Health*, 1995: 31-37.
- Malekafzali H. The health situation of mothers and children in the Islamic Republic of Iran. Theran, Ministry of Health and Medical Education/ *United National Fund*. 1994: 25-83.

- گرمارودی غلامرضا، افخار حسن، باطی عزیزالله. بررسی شیوع و عوامل موثر بر تولد نوزادان کم وزن در شهر تهران. *فصلنامه پاشر*, ۱۳۸۰؛ سال اول، شماره اول، صفحه ۱۳-۱۸.
- حاجیان کریم اله. بررسی شیوع کم وزنی نوزادان و برخی از عوامل خطر آن در شهر بابل در سال ۱۳۷۷. *مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی*

- مازندران. ۱۳۷۹؛ سال نهم، شماره ۲۶، صفحه ۴۹-۵۰.
۹. WHO. Low birth weight. Mother and Child Health Journal. 1992; 2:1-13.
۱۰. UNICEF. The state of worlds children. *United Nation childrens fund*, 1999: 98-101.
۱۱. متصری زهره، افشون اسفندیار، فراروئی محمد، پور آرین شهناز. بررسی میزان تولد نوزادان کم وزن و نارس دریمارستان شهید بهشتی یاسوج طی یک دوره ده ساله. *مجله دانشگاه علوم پزشکی یاسوج*. ۱۳۷۷، سال سوم، شماره ۱۱ و ۱۲، صفحه ۸-۱.
۱۲. میرناصری فهیمه السادات، صدر مهدخت، اخوان کرباسی صدیقه، گلستان مطهره. بررسی شیوع Low birth weight و فاکتورهای وابسته به آن در نوزادان شهر یزد. *مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوqi یزد*. ۱۳۷۷، سال ششم، شماره دوم، صفحه ۲۴-۲۸.
۱۳. نژاد شمسی ف، شاهرخی راد الف. شیوع LBW و عوامل همراه آن در مرکز آموزشی درمانی الزهرا رشت. پایان نامه جهت اخذ درجه دکترای پزشکی، ۱۳۷۶؛ دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دانشکده پزشکی.
۵. ارشادی احمد، اسلامی علیرضا، شریف محمد رضا. بررسی وضعیت نوزادان کم وزن در شهر کاشان. *مجله علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان*. ۱۳۷۹؛ سال ۱، شماره ۳۰ و ۳۱، صفحه ۵۴-۶۰.
۶. شاذری شهین، محمد زاده زهراء، مصطفوی فیروزه، حسن زاده اکبر. بررسی شیوع کم وزنی هنگام تولد و تعیین برخی از عوامل خطرساز مادری در شهر اصفهان. *مجله دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان*. ۱۳۷۹، سال نهم، شماره ۳۳ و ۳۴، صفحه ۵۰-۶۰.
۷. خوری الهام، وکیلی محمد علی، گلعلی پور محمد. میزان کم وزنی زمان تولد در شهر گرگان و برخی از عوامل مرتبط با آن. *مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان*. ۱۳۷۸؛ سال اول، شماره ۳ و ۴، صفحه ۴۶-۵۳.
۸. رحیمی شعریاف فاطمه، مقیمی رقیه، شادافزا بهناز، شفایی سپیده. فراوانی وزن کم هنگام تولد و فاکتورهای مرتبط با آن در بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران. *مجله علمی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایوان*. ۱۳۸۱؛ سال بیستم، شماره ۲، صفحه ۸۳-۸۸.