

ORIGINAL ARTICLE

Anticancer Effects of Senecionine and *Senecio vulgaris L.* on Prostate Cancer Cell Lines

Morteza Mahdavi¹,
Mohammad Azadbakht²,
Akbar Vahdati³,
Mohammad Shokrzadeh⁴,
Ayub Farhadi⁵, Ali Davoodi⁶

¹ PhD Student in Biology, Department of Biology, Fars Science and Research Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran

² Professor, Department of Pharmacognosy, Faculty of Pharmacy, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

³ Professor, Department of Biology, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran

⁴ Professor, Pharmaceutical Sciences Research Center, Department of Toxicology and Pharmacology, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

⁵ Assistant Professor, Laboratory of Molecular Cytogenetics, Faculty of Animal Sciences and Fisheries, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran

⁶ PhD Student in Pharmacognosy, Student Research Committee, Faculty of Pharmacy, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

(Received October 16, 2016 ; Accepted December 1, 2018)

Abstract

Background and purpose: This research aimed at evaluating the effects of senecionine and *Senecio vulgaris* extract on apoptosis and cell cycle inhibition. Also, their cytotoxicity on prostate cancer cell lines (PC3, DU145 and HGFs), antioxidant effects, and influences on AR and CLU gene expression were investigated.

Materials and methods: In this experimental study, senecionine and *S. vulgaris* extract were prepared and the induced morphological changes on cell lines were evaluated in DMEM F12 cell culture after 24, 48, 72, and 96 hours by an invert microscope. Then, cell viability and apoptosis were determined by MTT and fluorescence analysis, respectively. Finally, AR and CLU gene expression and methylation of AR gene were evaluated using Real-time PCR and Bi-Sulfide test, respectively.

Results: Cytotoxicity data showed morphological changes 24 hours after treatment with senecionine in all cell lines and all concentrations which also increased in longer time. Based on MTT results, senecionine showed cytotoxicity in 50 and 500 µg/ml on PC3 and du145 prostate cancer cell lines.

Conclusion: According to current findings, Ragwort aerial part extract are suggested for in vivo studies with minimum destruction on normal cells and inducing effects on destruction and apoptosis of prostate carcinogenic cell lines.

Keywords: senecionine, cancer, cytotoxic, apoptosis

J Mazandaran Univ Med Sci 2019; 28 (169): 1-13 (Persian).

* Corresponding Author: Mohammad Azadbakht - Faculty of Pharmacy, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran (E-mail: azadbakhtm@hotmail.com)

بررسی اثرات خد سرطانی سنه سیونین و پیرگیاه در رده های سلولی سرطانی پروستات

مرتضی مهدوی^۱

محمد آزاد بخت^۲

اکبر وحدتی^۳

محمد شکرزاده^۴

ایوب فرهادی^۵

علی داودی^۶

چکیده

سابقه و هدف: در این مطالعه، اثرات ترکیب سنه سیونین و عصاره پیرگیاه (*Senecio vulgaris*) بر آپوپتوz و مهار سلولی ارزیابی شده است هم چنین سمیت سلولی آنها بر روی سلول های سرطانی پروستات (PC3 و DU145)، اثرات آنتی اکسیدانی و اثرات آنها در بیان ژن های گیرنده های آندروژن (AR) و کلاسترین (CLU) نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

مواد و روش ها: این مطالعه از نوع تجربی بوده است. سنه سیونین و عصاره اندام هوایی پیرگیاه تهیه شدند. سپس تغییرات مورفو لوژیک ایجاد شده توسط آنها بر روی رده های سلولی سرطانی پروستات، در محیط کشت DMEM F12 پس از ۲۴، ۴۸، ۷۲ و ۹۶ ساعت با میکروسکوپ معمکوس بررسی شدند. درصد زنده ماندن رده های سلولی و میزان آپوپتوz نیز به ترتیب توسط آزمون MTT و آنالیز فلوسایوتومتری و چگونگی بیان ژن های گیرنده AR و CLU با روش Real-time PCR و هم چنین نحوه متیلاسیون (methylation) ژن AR با تست بی سولفیت بررسی شدند.

یافته ها: نتایج بررسی سمیت سلولی نشان داد که پس از ۲۴ ساعت تیمار با سنه سیونین، تغییرات مورفو لوژیک در هر سه رده سلولی و در هر یک از چهار غلظت فوق مشاهده شد به طوری که با گذشت زمان این تغییرات تشدید شدند. نتایج آزمون MTT نشان داد که سنه سیونین در غلظت ۵۰ و ۵۰۰ $\mu\text{g}/\text{ml}$ دارای اثرات سایتو توکسیک بر سلول های سرطان پروستات PC3 و DU145 است.

استنتاج: بر اساس نتایج، عصاره اندام هوایی پیرگیاه در غلظت مذکور با کمترین آسیب به سلول های طبیعی و تخریب و القای آپوپتوz سلولی با هدف درمان سرطان پروستات برای مطالعات *in vivo* پیشنهاد می شود.

واژه های کلیدی: پیرگیاه، سرطان، سایتو توکسیک، آپوپتوz

مقدمه

طور خودرو در مزارع، دامنه های مرطوب و کم ارتفاع کوهستان ها می روید. البته پراکندگی آن، بیشتر در نواحی معتدل است. از اختصاصات پیرگیاه این است که

پیرگیاه با نام علمی *Senecio vulgaris* L. و از خانواده Asteraceae، گیاهی است علفی، یک ساله یا دوساله، به ارتفاع ۲۰ تا ۴۰ سانتی متر و دارای ساقه منشعب که به

E-mail: azabakht@mail.com

مؤلف مسئول: محمد آزاد بخت - ساری: کیلومتر ۱۷ جاده فرج آباد، مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم، دانشکده داروسازی

۱. دانشجوی دکترای زیست شناسی جانوری تکونی، گروه زیست شناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

۲. استاد، گروه فارماکو گنوزی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.

۳. استاد، گروه زیست شناسی، واحد فارم، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

۴. استاد، مرکز تحقیقات علوم دارویی، گروه سم شناسی / داروشناسی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

۵. استادیار، آزمایشگاه سیتو ژنیک مولکولی، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، ساری، ایران

۶. دانشجوی دکترای فارماکو گنوزی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران


تاریخ دریافت: ۱۳۹۷/۹/۱۹ تاریخ ارجاع چهت اصلاحات: ۱۳۹۷/۶/۲۰ تاریخ تصویب: ۱۳۹۷/۱۰/۱۵

آپوپتوز، سلول آب از دست داده و چروکیده می‌شود و تغییرات هسته‌ای در آن مشهود است. بنابراین در روش فلوسیتومتری، کوچک شدن سلول، جمع شدن هسته سلول مشاهده می‌شود. در مقایسه، سلول‌هایی که دچار نکروز شده‌اند، ابتدا متورم شده و سپس محتوای سلولی خود را آزاد می‌کنند^(۴,۵). متیلاسیون DNA در خودنوزایی، تمایز و برقراری مجدد حالت سکون سلول‌های بنیادی نقش اساسی دارد. تومورها در شرایط خاصی از تکوین به وجود می‌آیند. سرطان ناشی از تنظیم ژن‌های نابرابر از جمله غیر فعال کردن تنظیم کننده‌های منفی هنگام تکثیر سلولی مانند ژن‌های سرکوب کننده تومور (Tumor suppressor genes-TSG) و فعال‌سازی (Oncogenes) است. علاوه بر تغییرات ژنتیکی، فرایند سرطان‌زایی می‌تواند از طریق تغییرات اپی ژنتیکی در پروموتورهای ژنی نیز رخ دهد. بخش‌های توالی ژن که سیتوزین در کنار گوانین قرار دارد (CpG) معمولاً در سلول‌های طبیعی متیله نشده‌اند اما متیلاسیون زیاد در جزایر CpG که منجر به انسداد رونویسی و خاموش شدن ژن می‌شود، می‌تواند وقایع اولیه در سرطان‌زایی باشد و به عنوان یک مکانیزم رایج از دست دادن عملکرد TSG در سرطان‌های انسان محسوب می‌شود. از لحاظ بالینی، شناخت الگوهای متیلاسیون در سراسر ژنوم می‌تواند کمک به شناسایی TSG‌های کلیدی غیرفعال در تشکیل تومور شود^(۶,۵). اثر سمتی و سایتوتوکسیک ترکیبات و عصاره‌ها بر روی سلول‌های سرطانی با روش رنگ سنجی، با استفاده از رنگ ترازوکلیوم (4,5-dimethylthiazol-2-yl)-(2,5-diphenyl Tetrazolium bromide) در مقایسه با گروه‌های کنترل بررسی می‌شود. این روش یک تست متابولیک رقباتی میتوکندریایی بوده و براساس شکستن نمک ترازوکلیوم توسط آنزیم سوکسینات دهیدروژنаз

برگ‌هایی منقسم به لوب‌های تقریباً مساوی و دندانه‌دار و کاپیتول‌هایی عاری از زبانه، محصور در انولوکری مرکب از یک ردیف برآکته دارد. در قسمت‌های مختلف پیرگیاه دو آلکالوئید پیرولیزیدینی، به نام سنه‌سیونین (Senecioneine) و سنه‌سین (Senecionine) یافت می‌شود. سنه‌سیونین، به صورت ورقه‌های ریز و کوچک، متبلور می‌شود. طعم تلخ دارد. در آب غیر محلول ولی در کلروفرم حل می‌شود. به مقدار بسیار کم در الکل و اتر نیز محلول است. سنه‌سیونین یک ماده سمی قوی است و باعث القای جهش ژن‌هایی در ایجاد سرطان کبد موش می‌شود^(۱,۲). تاکنون چندین مکانیسم برای سنه‌سیونین در سرطان کشف شده است که این تنوع در مکانیسم اثر باعث کاهش احتمال مقاومت‌های دارویی در اثر موتاسیون در ژن‌های پروتئین‌های هدف می‌شود. یکی از مکانیسم‌های اثر این ترکیبات مهار فاکتور رونویسی FNVB بوده که در سلول‌های سرطانی بسیار فعال می‌باشد. حضور این فاکتور در سلول‌های سرطانی جلوی آپوپتوز این سلول‌ها را می‌گیرد و مهار این عامل حساسیت سلول‌ها را در برابر عوامل القاکننده آپوپتوز افزایش می‌دهد. سنه‌سیونین اثراتش را با تداخل در مسیر FNVB با اتصال به P65 اعمال می‌کند. علاوه بر این مکانیسم، این ترکیب با کاهش بیان یا افزایش بیان ژن c-Jun-N-terminal kinase MARK و تداخل با فاکتور رونویسی STAT3 عمل می‌کند. مکانیسم اثر دیگر این ترکیب با افزایش تولید رادیکال‌های آزاد اکسیژن، مهار تولید metalloproteinase matrix می‌باشد که برای رگ‌زایی بسیار حیاتی می‌باشد^(۲,۳). آپوپتوز از نظر بیولوژی اهمیت زیادی دارد و به همین دلیل ردبایبی و اندازه‌گیری آپوپتوز در تحقیقات و آزمایشات تشخیصی و بالینی کاربرد پیدا می‌کند. سلول‌های در حال آپوپتوز نشانه‌های زیادی دارند که قابل اندازه‌گیری با فلوسیتومتری هستند. این نشانه‌ها شامل تغییرات در نفوذپذیری غشاء میتوکندری، فعال‌سازی کاسپازها و شکستگی‌های DNA سلولی می‌شوند. در اثر

جمع آوری گیاه

اندام هوائی پیرگیاه در فروردین ۱۳۹۴ از حاشیه شهر ساری جمع آوری شد. موقعیت پیرگیاه از منطقه روستای دروار ساری در عرض جغرافیایی ۴۵۴۱۳۹/۳۶ و طول جغرافیایی ۵۳/۰۸۴۷۸۷ قرار دارد. پس از شناسایی دقیق، با نمونه هرباریومی دانشگاه پیام نور ساری با کد SPNH-2011 تطیق داده شد. گیاهان از نقاط مختلف در این موقعیت جغرافیائی جمع آوری شد تا نمونه برداری درستی انجام شده باشد.



تصویر شماره ۱: تصویر نمونه هرباریومی و گیاه کامل پیرگیاه

خشک کردن و عصاره گیری

گیاه جمع آوری شده در ابزار بر روی توری های فلزی با شرایط تهويه مناسب قرار داده شد تا به طور کامل خشک شود. پس از خشک شدن کامل، نمونه ها توسط آسیاب برقی به طور کامل خرد شد. عصاره گیری از اندام هوایی پیرگیاه به روش سوکسله و توسط متابولو متوالی انجام گرفت (۱۱، ۱۲).

میتوکندریایی سلول های زنده استوار است که طی آن محلول زرد رنگ MTT تحت تأثیر این آنزیم به کریستال های نامحلول فورمازان بنفس رنگ تبدیل می شود. جذب این کریستال ها بعد از حل کردن در DMSO با استفاده از دستگاه میکروپلیت ریدر (Microplate reader Elisa reader-Stat Fax 303 Plus) در طول موج ۵۷۰ نانومتر اندازه گیری می شود (۸، ۷). همچنین در بررسی اثربخشی ضدسرطانی ترکیبات، ارزیابی تاثیر آن ها در مهار بیان ژن های برخی پروتئین های مهم مانند گیرنده های سلولی که بیان آن ها در بیماری سرطان افزایش می یابد، ضروری می باشد. از پروتئین های مهم سلولی در پروستات گیرنده آندروزنی (AR) و کلاسترین (CLU) بوده که بیان سلولی آن ها در شرایط بد خیمی پروستات افزایش یافته و مهار بیان آن ها تاثیر زیادی در درمان این بیماری دارد. از شاخص های عملکرد ضد سرطانی ترکیبات، توانائی آلکیلاسیون آن ها به صورت اختصاصی بر روی ژن های تاثیر گذار تکثیر سلولی زیاد در سلول ها بوده است. از ژن های مورد ارزیابی در سلول های بد خیم پروستات ژن AR PMEPA1 ژن مهمی بوده که در ترجمه پروتئین بسیار می باشد. هرگونه اختلال در عملکرد این ژن باعث مهار رشد و در ادامه مهار سرطان پروستات خواهد شد (۹، ۱۰). در این مطالعه هدف بررسی اثر ضد سرطانی عصاره تام اندام هوائی گیاه *S. vulgaris* و ترکیب اصلی آن سنه سیونین به صورت جداگانه با تست های مختلف و برای تعیین اثر آن در سرطان پروستات می باشد.

مواد و روش ها

این مطالعه از نوع تجربی، مستخرج از طرح مصوب دانشگاه علوم پزشکی مازندران و با تایید کمیته اخلاق دانشگاه بوده و تمامی مراحل کار اعم از کار گیاهی و سلولی براساس اصول اخلاقی توصیه شده کمیته اخلاق دانشگاه به انجام رسیده است.

تست سمیت ماده استاندارد و عصاره گیاهی بررسی میزان سمیت سایتوکسیک عصاره پیرگیاه و ماده استاندارد سنه سیونین بر هر دو رده سلولی سرطان پروستات (PC3, DU145) در مقایسه با گروههای کنترل بررسی شد. از هر رده سلولی، پس از انجام پاساژ، یک سوسپانسیون سلولی در محیط کشت تهیه شد. به این صورت که در هر خانه از پلیت ۹۶ خانه‌ای، ۵۰۰۰ سلول موجود باشد. پلیت‌ها ۲۴ ساعت در انکوباتور قرار داده شدند تا سلول‌ها به بستر خود بچسبند. غلظت‌های ۱۰، ۵۰، ۱۰۰، ۵۰۰ میکروگرم در میلی لیتر عصاره پیرگیاه به ۴ گروه سه‌تایی از خانه‌های مربوط به هر دو رده سلولی سرطان پروستات و سنه سیونین به ۴ گروه سه‌تایی از خانه‌های مربوط به هر دو رده سلولی اضافه شد و به خانه‌های مربوط به گروه شاهد، برای کنترل منفی، آب مقطر استریل و برای گروه کنترل مثبت سیس‌پلاتین اضافه شد. این پلیت‌ها در انکوباتور قرار گرفتند و پس از ۴۸ ساعت به جای محیط کشت، ۱۸۰ میکرولیتر محیط کشت تازه همراه با ۲۰ میکرولیتر رنگ ترازوژلیوم اضافه و ۴ ساعت در انکوباتور گذاشته شد. پس از آن محیط کشت حاوی رنگ ترازوژلیوم خالی و ۲۰۰ میکرولیتر DMSO و ۲۵ میکرولیتر بافر گلایسین جایگزین آن شد و جذب نوری خانه‌ها توسط دستگاه میکروپلیت ریدر در طول موج ۵۷۰ نانومتر اندازه گیری شد(۱۵، ۱۶).

تست تعیین آپوپتوز و نکروز سلول‌ها به روش فلوزایتمتری از هر رده سلولی، پس از انجام پاساژ، یک سوسپانسیون سلولی در محیط کشت تهیه شد. به این صورت که در هر خانه از پلیت ۱۲ خانه‌ای ۵۰۰۰۰ سلول موجود باشد. برای این آزمون ۳ پلیت ۱۲ خانه‌ای در نظر گرفته شد و ۳۰ خانه از پلیت‌های ۱۲ خانه‌ای انتخاب شد. سپس ۵ گروه سه‌تایی از خانه‌ها به سلول‌های هر دو رده سلولی سرطان پروستات با عصاره پیرگیاه و ۵ گروه سه‌تایی از خانه‌ها به سلول‌های هر دو رده سلولی با ماده استاندارد سنه سیونین اختصاص داده شد. این پلیت‌ها ۴۸ ساعت در انکوباتور قرار گرفتند و سپس برای سه دقیقه

تعیین مقدار پیرولیزیدین آلکالوئید تام عصاره ترکیب سنه سیونین با روش UV در گیاه تعیین مقدار شد. در این روش پودر گیاه در متانول قرار گرفته و برای یک ساعت جوشانده شد. سپس تغليظ و خشک گردیده و با پودر زینک آلکالوئیدهای N-اکسیدی آن احیا شده و استخراج آلکالوئیدها با اسیدی و قلیائی کردن محلول عصاره انجام شد. در نهایت در طول موج ۵۶۵ نانومتر در حصور محلول‌های استاندارد سنه سیونین مورد ارزیابی قرار گرفت(۱۱، ۱۲).

کشت رده‌های سلولی سرطانی پروستات (PC3, DU145) از بانک سلولی انستیتو پاستور ایران تهیه شد (کد C47، NCBI) رده سلول‌های سرطانی در محیط کشت ۱۰۰ DMEM/ f12 حاوی ال-گلوتامین، پنی‌سیلین (۱۰۰ واحد در میلی لیتر)، استرپتومایسین (۱۰۰ واحد در میلی لیتر) و ۱۰ درصد سرم جنین گاوی (FBS) کشت شدند. سلول‌ها در انکوباتور CO₂ ممرت آلمان در ۳۷ درجه سانتی‌گراد، رطوبت ۹۰ درصد و دی‌اکسید کربن ۵ درصد قرار گرفتند. سلول نرمال فیبروبلاست از بانک سلولی انستیتو پاستور ایران تهیه شده (کد NCBI C165) و در محیط کشت RPMI 1640 در شرایط نرمال کشت شد(۱۲، ۱۴).

بررسی اثر سنه سیونین و عصاره بر مورفو‌لوزی سلول‌های کشت داده شده در بررسی مورفو‌لوزی، غلظت‌های ۱۰، ۵۰، ۱۰۰، ۵۰۰ میکروگرم در میلی لیتر هر یک از سنه سیونین و عصاره پیرگیاه را بر سلول‌های کشت داده شده به تعداد متوسط (۵×۱۰^۵) سلول در فلاسک‌های با درب فیلتردار استریل ۵۰ میلی لیتر که حاوی ۵ میلی لیتر محیط کشت بودند، اثر داده شدند و نتایج در ۲۴، ۴۸، ۷۲ و ۹۶ ساعت بعد از تیمار کردن سلول‌ها با ترکیب، توسط اینورت میکروسکوپ مجهز به دوربین اولمپوس ژاپن، عکس برداری شد(۱۵).

شده و تجزیه و تحلیل واریانس برای بررسی وجود یا عدم وجود اختلاف معنی دار آماری بین تیمارهای مختلف از نظر بیان ژن های مورد نظر از نرم افزار آماری SAS ویرایش ۹/۱ استفاده شد(۱۹).

بررسی متیلاسیون ژن PMEPA1 در سلول های رده سرطانی پروستات

طراحی پرایمر با نرم افزار Blast انجام شد. ژن PMEPA1 از ژن های آندرورژن رسپتور AR انتخاب شده و از طریق سایت NCBI به بررسی ژن و طراحی آن اقدام شد. یک میکرو گرم DNA توسط بی سولفیت سدیم EZ DNA Methylation-GoldTM با استفاده از بسته EZ DNA Bisulfite Kit (EpiTect Bisulfite Kits) و پیروی در کیت بی سولفیت از پروتکل عرضه کننده، با استفاده از بافر ۵۰ میلی لیتر، بی سولفیت شد. غلظت پرایمر برای مخلوط با الیگونو کلئوتید بی سولفیت شده ۷۰۰ نانو گرم تعیین شد. ۵۰ میکرولیتر از نمونه های بی سولفیت شده از هر رده سلولی PC3 و DU145 با اثر ماده استاندارد سنه سیونین و نمونه کنترل با اثر سیس پلاتین بر روی هر یک از رده ها را برای سکانتس به کشور کرده فرستاده شد. نتایج سکانتس با نرم افزار ChromasPro نسخه ۲,۴,۱ آنالیز شد(۲۰,۲۱).

تعیین آنتی اکسیدانی با روش DPPH

اثر آنتی اکسیدانی گیاه با ترکیب DPPH مورد ارزیابی قرار گرفت. در این روش غلظت های مختلف عصاره گیاه با حجم برابر با محلول ۱۰۰ میکرومولار DPPH مخلوط و بعد از انکوباسیون برای مدت ۱۵ دقیقه در دمای اتاق با دستگاه UV در طول موج ۵۱۷ نانومتر آنالیز گشته هم چنین اثر آنتی اکسیدانی آن با ترکیب آنتی اکسیدان استاندارد BHA مقایسه شد(۲۲,۲۳).


یافته ها

تعیین مقدار پیرولیزیدین آلكالوئید تمام نتایج حاصل از تعیین مقدار پیرولیزیدین آلكالوئید معادل ۰/۲۹ درصد در عصاره خشک گیاه بوده است.

۲۰۰ میکرولیتر تریپسین ۱ ایکس برای هر خانه ریخته شد و پس از سانتریفیوژ برای بررسی سلول های آپوپتوز و نکروز از دستگاه فلوسایتمتری چهار کاناله تک لیزری (Sysmex Partect PSA)، طول موج ۵۸۰ و ۶۳۰ Annexin V-FITC Apoptosis ebiosince به بالا، کیت استفاده شد(۱۶).

بیان نسبی ژن های AR و CLU به روش Real time PCR دو رده سلولی پروستات به وسیله کیت استخراج RNA شرکت کیاژن (۷۴۱۰۴) استخراج شد. پس از استخراج RNA برای اطمینان از صحت استخراج و بررسی کمیت و کیفیت آن، RNA استخراج شده روی ژل آگارز دو درصد الکتروفورز شد. برای ساخت cDNA از Reverse Transcriptase (QuantiFast) کیاژن فست شرکت کیاژن (۲۰۵۳۱۱) استفاده شد. قبل از اندازه گیری بیان ژن های مورد نظر، صحت عمل کرد آغاز گرهای تهیه شده با استفاده از دستگاه PCR و تکثیر قطعه مورد نظر از روی cDNA تهیه شده براساس پرایمرهای اختصاصی TGTCACTATGGAGCTCTCACATGTGG برای هر ژن (CACCTCTCAAATATGCTAGACGAATCTGT) به عنوان پرایمر مستقیم و AR به عنوان پرایمر معکوس و مستقیم GAGTTCCAAAGGCCAACCG به عنوان پرایمر معکوس (CLU)، بررسی شد. واکنش های Real Time QPCR با استفاده از آغاز گرهای اختصاصی و کیت کو آنتی فست سایبر گرین PCR شرکت کیاژن (۲۰۴۰۵۲) در دستگاه PCR از شرکت Corbett انجام شد. ژن GAPDH به عنوان ژن کنترل داخلی استفاده شد(۱۷,۱۸).

روش اندازه گیری کمیت بیان ژن ها و تجزیه و تحلیل آماری نتایج در مطالعه حاضر بیان رونوشت های ژن های مورد نظر با استفاده از روش لیواک (ΔΔCT-2) اندازه گیری



(A) پس از ۲۴ ساعت، (B) پس از ۴۸ ساعت،
(C) پس از ۷۲ ساعت، (D) پس از ۹۶ ساعت.


تصویر شماره ۲: بررسی اثر تیمار *S. vulgaris* با غلظت ۱۰۰۰ میکروگرم بر میلی لیتر (به ترتیب از بالا به پایین) پس از ۲۴، ۴۸، ۷۲ و ۹۶ ساعت بر رده سلول‌های سرطانی PC3 (۱) و DU145 (۲).

بررسی مورفولوژیک اثر تیمار سنه سیونین با غلظت‌های ۱۰، ۱۰۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ میکروگرم بر میلی لیتر پس از ۲۴، ۴۸، ۷۲ و ۹۶ ساعت بر رده سلول‌های سرطانی PC3، نیز همین نتایج را باشد بیشتر ارائه کرده است. هم‌چنین در مورد رده سلولی DU145 که با غلظت‌های ۱۰، ۱۰۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ میکروگرم بر میلی لیتر عصاره گیاه تیمار شده بودند، با افزایش زمان، سلول‌های بیشتری از حالت طبیعی (دوکی شکل)، به حالت کروی درآمده و کوچک شده‌اند و افزایش گرانولاسیون سلولی در آن‌ها مشاهده شد که تمامی این شرایط نشانه‌ای از ساختارهای سرطانی DU145، نیز همین نتایج را باشد بیشتر ارائه کرده است. نتایج مقایسه‌ای اثر عصاره گیاه و ترکیب سنه سیونین در زمان‌های ۲۴، ۴۸ و ۷۲ ساعت بر روی دو رده سلولی در تصاویر شماره ۳ و ۴ آورده شده است.


اثر عصاره‌های گیاهی و ماده استاندارد بر میزان تکثیر رده سلولی با روش MTT assay

اثر عصاره پیرگیاه بر تکثیر رده‌های سلولی PC3 و DU145 در تمام غلظت‌های ۱۰، ۱۰۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ میکروگرم بر میلی لیتر، نسبت به گروه کنترل مثبت سیس پلاتین با غلظت ۱۰ نانوگرم در میلی لیتر، دارای اثر یک نواختی بوده و برای بررسی اثر آپوپتوزیس مناسب می‌باشد (تصویر شماره ۲). بر اساس این نتایج دوز ۱۰۰۰ میکروگرم بر میلی لیتر عصاره بیشترین اثر را دارد بوده است. هم‌چنین، اثر سنه سیونین بر تکثیر رده سلولی DU145 در تمام غلظت‌های ۱۰، ۱۰۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ میکروگرم بر میلی لیتر، با افزایش غلظت از تکثیر رده سلولی می‌کاهد و تیمارهای فوق برای ارزیابی اثر آپوپتوزیس نسبت به گروه تیمار عصاره‌های گیاهی مناسب می‌باشد.

تصاویر مورفولوژیک نشان داد که با تیمار *S. vulgaris* بر رده سلول‌های سرطانی PC3 با افزایش غلظت و با افزایش زمان، سلول‌های بیشتری از حالت طبیعی (دوکی شکل)، به حالت کروی درآمده و کوچک شده‌اند. در ضمن افزایش گرانولاسیون سلولی در آن‌ها مشاهده شد که تمامی این شرایط نشانه‌ای از مرگ سلول‌ها است.



(A) پس از ۲۴ ساعت، (B) پس از ۴۸ ساعت،
(C) پس از ۷۲ ساعت، (D) پس از ۹۶ ساعت




تصویر شماره ۵: نتایج حاصل از بررسی اثر عصاره گیاه (A) و ترکیب سنه سیونین (B) بر روی روند آپوپتوز در سه رده سلولی NF و سلول‌های نرمال فیبروبلاستیک (PC3، DU145).


بر اساس تصویر شماره ۵، عصاره گیاه باعث درصد آپوپتوزیس ابتدایی، ۷/۷۱ درصد آپوپتوزیس انتهایی، ۱/۱۰۰ درصد نکروزیس و میزان بقای سلول زنده ۶۹/۴۹ درصد ($p < 0.05$) و سنه سیونین باعث ۲۸/۶۵ درصد آپوپتوزیس ابتدایی، ۹/۵۱ درصد آپوپتوزیس انتهایی، ۰/۶۳ درصد نکروزیس و میزان بقای سلول زنده ۶۱/۲۱ درصد PC3 شده است ($p < 0.05$). همچنین، عصاره گیاه باعث ۱۰/۲۱ درصد آپوپتوزیس ابتدایی، ۹/۶۱ درصد آپوپتوزیس انتهایی، ۱/۴۴ درصد نکروزیس و میزان بقای سلول زنده ۷۸/۷۴ درصد شده آپوپتوزیس ابتدایی، ۲۳/۰۷ درصد آپوپتوزیس انتهایی، ۴/۱۸ درصد نکروزیس و میزان بقای سلول زنده ۵۱/۶۶ درصد در رده سلولی DU145 شده است ($p < 0.05$). در مورد سلول‌های نرمال فیبروبلاستیک نیز پیرگیاه باعث ۰/۰ درصد آپوپتوزیس ابتدایی، ۵/۳۴ درصد آپوپتوزیس انتهایی، ۵۴/۴۹ درصد نکروزیس و میزان بقای سلول زنده ۴۰/۱۶ درصد ($p < 0.05$) و سنه سیونین

ارزیابی القاء آپوپتوزیس سنه سیونین و عصاره پیرگیاه با فلوسایتومتری


آپوپتوزیس و نکروزیس و بقای سلول زنده برای رده‌های سلولی PC3، DU145 و فیبروبلاست نرمال با اثر عصاره اندام هوایی پیرگیاه به غلظت ۱۰۰ µg/ml و ماده خالص سنه سیونین به غلظت ۱۰۰ µg/ml که به مدت ۲۴ ساعت تیمار داده شدند، با استفاده از کیت (Annexin-V FITC and propidium iodide) و دستگاه فلوسایتومتر مورد ارزیابی قرار گرفت.



تصویر شماره ۶: نتایج مقایسه‌ای اثر عصاره گیاه و ترکیب سنه سیونین (در دوزه‌های ۱۰، ۱۰۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ میکروگرم بر میلی‌لیتر از A تا D در زمان‌های ۲۴، ۴۸ و ۷۲ ساعت بر روی رده سلولی PC3).



تصویر شماره ۷: نتایج مقایسه‌ای اثر عصاره گیاه و ترکیب سنه سیونین (در دوزه‌های ۱۰، ۱۰۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ میکروگرم بر میلی‌لیتر از A تا D در زمان‌های ۲۴، ۴۸ و ۷۲ ساعت بر روی رده سلولی DU145).



تصویر شماره ۶(۱): کروماتوگرام A اثر سیس پلاتین و B سنه سیونین بر متیلاسیون ژن PMEPA1 در رده سلولی PC3 و DU145

میزان فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره پیرگیاه و سنه سیونین با توجه به نتایج به دست آمده میزان IC₅₀ عصاره گیاه، سنه سیونین و BHA یا هیدروکسی آئیزول بوتیله به ترتیب ۲۸/۷۰، ۳۷/۵۲ و ۵۸/۷۲ میکروگرم بر میلی لیتر محاسبه شد.

باعث ۱/۲۹ درصد آپوپتوزیس ابتدایی، ۶/۱۱ درصد آپوپتوزیس انتهایی، ۲۶/۰۶ درصد نکروزیس و میزان بقای سلول زنده ۶/۵۲ درصد شد (p < ۰/۰۵).

میزان بیان ژن های AR و CLU در رده های سلولی در جدول ۱ میانگین بیان ژن AR و CLU با اثر سنه سیونین بر هر دو رده سلولی سرطانی پروستات ارائه شده است.

جدول شماره ۱: میانگین بیان ژن AR و CLU با اثر سنه سیونین بر رده سلولی پروستات

CLU DU145 در	CLU PC3 در	میانگین بیان DU145 در	AR PC3 در	میانگین بیان DU145 در	ماده مؤثره استاندارد
2/۰۵b	2/۷۹b	8/۲۵a	4/۰۶a		سنه سیونین
17/۰۹a	17/۰۹a	0/۹۷b	0/۹۷b		کنترل
.۰/۰۲a	.۰/۰۴۲	.۰/۰۷۰	.۰/۰۷۰	.۰/۰۱۴۲	P-value
۱/۳	۱/۲	.۰/۹۱	.۰/۹۱	.۰/۹۱	SEM

اثر سنه سیونین بر متیلاسیون قطعه طراحی شده ژن PMEPA1 در رده های سلولی

اثر سیس پلاتین (ماده کنترل) و سنه سیونین بر متیلاسیون قطعه طراحی شده (Template) ژن PMEPA1 در دو رده سلولی PC3 و DU145 در تصویر شماره ۶ آورده شده است. با توجه به این که رده سلولی PC3 هیپرمتیلاسیون بوده، اثر سیس پلاتین بر ژن PMEPA1 در سکانس انجام شده ۱۰۰ درصد می باشد. نتیجه این که سیس پلاتین به عنوان داروی آپوپتوزیس در کاهش متیلاسیون موثر نیست ولی اثر سنه سیونین بر ژن PMEPA1 در سکانس انجام شده ۸۰ درصد می باشد و در نتیجه سنه سیونین به عنوان داروی آپوپتوزیس در کاهش متیلاسیون موثر است. هم چنین، در مورد رده سلولی DU145 با توجه به این که این رده سلولی هیپرمتیلاسیون بوده، اثر سیس پلاتین و سنه سیونین بر ژن PMEPA1 در سکانس انجام شده ۱۰۰ درصد می باشد. نتیجه این که در این رده سلولی سیس پلاتین و سنه سیونین به عنوان داروی آپوپتوزیس در کاهش متیلاسیون موثر نیستند.

بحث

سرطان پروستات شایع ترین بدخیمی در مردان در جهان غرب است. علی‌رغم بروز کم سرطان پروستات در کشورهای شرقی، آمار مرگ و میر سرطان پروستات در ایران در حال افزایش است. در دو دهه گذشته، درمان آندروژنی به عنوان موثرترین روش درمان سرطان متاستاتیک پروستات و حذف تومورها به کار گرفته شده است. این درمان معمولاً با متوقف کردن سیگنالینگ تستوسترون، کاهش بیان ژن گیرنده آندروژنی و کاهش تولید PSA، آپوپتوز را در اکثر سلول های سرطانی پروستات القا می کند (۲۴). در این مطالعه، ترکیب سنه سیونین و عصاره تام پیرگیاه درمان سرطان پروستات بر روی رده های سلولی PC3 و DU145 در شرایط برون تنی و به صورت مقایسه ای بررسی شدند. با توجه به تصاویر شماره ۳ و ۴ ترکیب سنه سیونین خالص اثر سایتوتوکسیک قوی تری را نسبت به عصاره گیاه بر روی دو رده سلولی PC3 و DU145 اعمال کرده است. البته در برخی دوزها این

۲۰۱۷ بر روی اثر سایتو توکسیک عصاره میوه گیاه *Citrullus colocynthis* انجام دادند، میزان IC₅₀ آن را بر روی رده‌های سلولی AGS و MCF-7 مورد بررسی قرار دادند. بر اساس این مطالعه میزان IC₅₀ عصاره میوه گیاه بین ۱ μ/ml تا ۱۰۰۰ μ/ml در زمان‌های مختلف متغیر بود. این گیاه به دلیل دارا بودن ترکیبات سایتو توکسیک مانند کوکوربیتاسین و کولوسیتین اثر سمیت سلولی بالائی را نشان داد (۲۵).

در مطالعه Butler و همکارانش در سال ۲۰۰۰ اثر مهاری ترکیب سوپرولیل آنیلید هیدروکسامیک اسید بر روی سرطان پروستات مدل *in vivo* و *in vitro* مورد ارزیابی قرار گرفت. در این مطالعه، مشخص شد که این ترکیب با مهار آنزیم هیستون داستلاز عمل ساپرس سلول‌های سرطانی پروستات را انجام می‌دهد. در مطالعه حاضر ترکیب سنه سیونین با مکانیسم‌های متعددی از جمله مهار گیرنده آندروژنی باعث مهار رشد سلول‌های سرطانی پروستات می‌شود (۲۶). هم‌چنین در مطالعه‌ای که Eroğlu و همکارانش در سال ۲۰۱۵ بر روی مکانیسم‌های مختلف ضد سرطانی ترکیب فرولیک اسید بر روی سلول‌های سرطانی پروستات انجام دادند مشخص شد که این ترکیب فنلیک با مهار چرخه سلولی و القای آپوپتوز باعث مرگ برنامه‌ریزی شده سلول‌های سرطانی پروستات می‌شود (۲۷).

یکی از مکانیسم‌های مهم در بروز سمیت سلولی در سلول‌های سرطانی، مرگ برنامه‌ریزی شده سلول و روند آپوپتوز است. مواد مختلف و داروهای شیمی درمانی بسیاری از طریق این مکانیسم باعث بروز سمیت سلولی می‌شوند. به عنوان مثال مکانیسم اثر سمیت سلولی ترکیبات فنلی از طریق القای آپوپتوز است که این عمل به واسطه مهار فاکتور رونویسی فاکتور NF-κB مرتبط با تولید سایتوکین‌ها، فعال شدن پروتئین P53 و افزایش تولید گونه‌های فعال اکسیژن (ROS) در اثر خاصیت آنتی اکسیدانی بوده است. به همین منظور در این مطالعه، جهت یافتن اثر سمیت عصاره پیر گیاه و ترکیب خالص

اثرات وابسته به زمان، افزایش و در برخی وابسته به زمان، کاهش یافت. این اثربخشی کمتر عصاره به علت درصد پایین تر ترکیب سنه سیونین در آن در دوز یکسان با ترکیب خالص بوده که نشان دهنده وابستگی اثر سایتو توکسیک عصاره به این ترکیب می‌باشد. هم‌چنین که با افزایش دوز نیز اثربخشی عصاره تغییر قابل توجهی نکرد. این نتیجه حاکی از وابسته به دوز بودن اثر سایتو توکسیک ترکیب سنه سیونین بوده کما این که به صورت تعجب برانگیزی در برخی دوزهای سنه سیونین با افزایش زمان رشد سلول افزایش یافت.

در مورد اثر آپوپتوزیک عصاره و ترکیب سنه سیونین، هر دو باعث ایجاد آپوپتوز بیشتری در هر دو رده سلولی سرطانی و آپوپتوز کمتری در رده سلولی فیبروبلاستی نرمال شده و هر دو مورد باعث ایجاد نکروز بالائی در سلول فیبروبلاستیک نرمال شدند در ضمن میزان بقای سلولی بعد از ۲۴ ساعت در هر سه رده سلولی بیش از ۵۰ درصد محاسبه شد که احتمالاً با افزایش زمان مواجه با رده‌های سلولی سرطانی کاهش پیدا خواهد کرد. در رابطه با اثر ترکیب سنه سیونین بر روی بیان ژن دو پروتئین AR و CLU، این ماده تنها توانست بیان ژن CLU را به میزان قابل توجهی در هر دو رده سلولی کاهش دهد. البته سنه سیونین باعث افزایش بیان ژن AR در هر دو رده سلولی شد. این نتایج حاکی از این بوده که این ترکیب مداخله قابل توجهی با توالی ژنی بیان کننده پروتئین CLU دارد. هم‌چنین ترکیب سنه سیونین باعث متیلاسیون ۸۰ درصدی ژن PMEPA1 در رده سلولی PC3 و ۱۰۰ درصدی این ژن در رده سلولی DU145 شده است. نتایج این تست حاکی از این بوده که ترکیب سنه سیونین به عنوان داروی آپوپتوزیک در کاهش متیلاسیون در رده سلولی PC3 موثر است. مطالعات مختلفی در زمینه اثربخشی و ارزیابی مکانیسم‌های اثر ترکیبات با منشا طبیعی در مدل‌های مختلف بیماری سرطان انجام شده است.

در مطالعه‌ای که رضائی و همکارانش در سال

برای عصاره پیرگیاه، اثر سنه‌سیونین بر میزان آپوپتوز و نکروز به ترتیب با میانگین ۵/۹۰۵ درصد و ۷۵/۸۴۵ درصد مشاهده شد و برای عصاره پیرگیاه میزان آپوپتوز و نکروز به ترتیب با میانگین ۱۱/۶۷۵ درصد و ۵۰/۷۳ درصد مشاهده شد. با توجه به کاهش متیلاسیون رده سلولی DU145 به میزان ۲۰ درصد، این فرآیند ثابت می‌شود. پائین بودن میزان آپوپتوز در اثر ماده سنه‌سیونین PC3 با توجه به کاهش ۲۰ درصد متیلاسیون رده سلولی ۶۵/۸۳ درصد دانست با استاندارد سنه‌سیونین با میانگین ۶۵/۸۳ درصد مشاهده شد. مکانیسم سمیت سلولی سنه‌سیونین و عصاره پیرگیاه تعیین شد. در مطالعات دیگر نیز القای آپوپتوز توسط سایر ترکیبات در انواع رده‌های سرطانی اثبات شده است.

سپاسگزاری

این مقاله بخشنی از پایان نامه آقای مرتضی مهدوی با کد اخلاق IR.MAZUMS.REC.95.2101 از تمامی افرادی که در این طرح کمک کردند تشکر و قدردانی می‌کنم.

References

- Xiong A, Yang L, Ji L, Wang Z, Yang X, Chen Y, et al. UPLC-MS based metabolomics study on *Senecio scandens* and *S. vulgaris*: an approach for the differentiation of two *Senecio* herbs with similar morphology but different toxicity. *Metabolomics* 2012; 8(4): 614-623.
- Wiedenfeld H. Plants containing pyrrolizidine alkaloids: toxicity and problems. *Food Addit Contam Part A* 2011; 28(3): 282-292.
- Wiedenfeld H, Edgar J. Toxicity of pyrrolizidine alkaloids to humans and ruminants. *Phytochem Rev* 2011; 10(1): 137-151.
- Gong K, Li W. Shikonin, a Chinese plant-derived naphthoquinone, induces apoptosis in hepatocellular carcinoma cells through reactive oxygen species: A potential new treatment for hepatocellular carcinoma. *Free Radic Biol Med* 2011; 51(12): 2259-2271.
- Liu B, Bian H-j, Bao J-k. Plant lectins: potential antineoplastic drugs from bench to clinic. *Cancer Lett* 2010; 287(1): 1-12.
- Wendel H-G, Wolfe AL, Mavrakis KJ, Oricchio E, Ferrando AA, De Keersmaecker K, et al. Methods and compositions for the detection and treatment of cancer involving

سنہ‌سیونین در رده سلول سرطانی پروستات، از روش فلوسایتومتری استفاده شد.^(۲۸، ۲۹)

در سلول طبیعی به دلیل وجود مکانیسم‌های تصحیح کننده آلکیلاسیون DNA شامل ویرایش، حذف و خاموشی ژن عمل آلکیلاسیون رخ نمی‌دهد.^(۳۰) در این مطالعه کاهش اثر متیلاسیون در ماده استاندارد سنه‌سیونین به میزان ۲۰ درصد در رده سلول سرطانی PC3 مشاهده شد. در نتیجه سنه‌سیونین با اثر آپوپتویک خود در درمان سرطان پروستات به صورت بالقوه کاربرد دارد.^(۳۱، ۳۰) نتایج حاصل از بررسی آنتی‌اکسیدانی عصاره گیاه نشان دهنده عمل کرد بهتر آن نسبت به استاندارد BHA و IC₅₀ معادل ۲۸/۷۰ میکروگرم بر میلی لیتر بود. هم‌چنین، با تعیین IC₅₀ عصاره پیرگیاه و ماده مؤثره سنه‌سیونین با تکنیک MTT میزان تاثیر آن‌ها بر روی تکثیر رده سلول سرطان پروستات مشخص شد. با توجه به شناسایی ماده مؤثره استاندارد در ترکیبات گیاهی، در بررسی آپوپتوز و مکانیسم‌های مولکولی شناخته شده تنها از ماده مؤثر استاندارد در ارزیابی آپوپتوز استفاده شد. ماده سنه‌سیونین به عنوان ماده مؤثره استاندارد، با توجه به میانگین ۲۶/۹۰ درصد در تکثیر رده سلول سرطانی پروستات و میانگین ۲۳/۱۶ درصد

- miRNAs and miRNA inhibitors and targets. Google Patents; 2017.
7. Talib WH, Mahasneh AM. Antiproliferative activity of plant extracts used against cancer in traditional medicine. *Sci Pharm* 2010; 78(1): 33-45.
 8. Tamilselvam K, Braidy N, Manivasagam T, Essa MM, Prasad NR, Karthikeyan S, et al. Neuroprotective effects of hesperidin, a plant flavanone, on rotenone-induced oxidative stress and apoptosis in a cellular model for Parkinson's disease. *Oxidative medicine and cellular longevity*. 2013; 2013.
 9. Sharad S, Li H, Ravindranath L, Haffner M, Heidenberg D, Yegnasubramanian S, et al. MP24-03 methylation of the pmepl1 gene disrupts the control of androgen receptor in prostate cancer. *J Urol* 2014; 191(4): 260-265.
 10. Yu J-T, Li L, Zhu Q-X, Zhang Q, Zhang W, Wu Z-C, et al. Implication of CLU gene polymorphisms in Chinese patients with Alzheimer's disease. *Clin Chim Acta* 2010; 411(19-20): 1516-1519.
 11. Shafiee F, Khoshvishkaie E, Davoodi A, Dashti Kalantar A, Bakhshi Jouybari H, Ataee R. The Determination of Blood Glucose Lowering and Metabolic Effects of *Mespilus germanica* L. Hydroaceton Extract on Streptozocin-Induced Diabetic Balb/c Mice. *Medicines* 2018; 5(1): 1.
 12. Azadbakht M, Talavaki M. Qualitative and quantitative determination of pyrrolizidine alkaloids of wheat and flour contaminated with *Senecio* in Mazandaran Province farms. *Iranian Journal of Pharmaceutical Research* 2010; 179-183 (Persian).
 13. Hashemi S, Abediankenari S, Ghasemi M, Azadbakht M, Yousefzadeh Y, Dehpour A. The effect of fig tree latex (*Ficus carica*) on stomach cancer line. *Iran Red Crescent Med J* 2011; 13(4): 272 (Persian).
 14. Shokrzadeh M, Modanloo M. An overview of the most common methods for assessing cell viability. *Res Med Dent Sc* 2017; 5(2): 33-41.
 15. Shokrzadeh M, Azadbakht M, Ahangar N, Hashemi A, Saravi SS. Cytotoxicity of hydro-alcoholic extracts of *Cucurbita pepo* and *Solanum nigrum* on HepG2 and CT26 cancer cell lines. *Pharmacogn Mag* 2010; 6(23): 176-179.
 16. Rathinavelu A, Levy A, Sivanesan D, Murugan D, Jornadal J, Quinonez Y, et al. Cytotoxic effect of pumpkin (*Cucurbita pepo*) seed extracts in LNCaP prostate cancer cells is mediated through apoptosis. *Curr Top Nutraceutical Res* 2013; 11(4): 137-143.
 17. Tabatabaei Qomi R, Sheykhhasan M, Kalhor N, Ghiasi M. Chondrogenic Differentiation of Human Adipose-derived Mesenchymal Stem Cells Using Fibrin Hydrogel Scaffold. *J Mazandaran Univ Med Sci* 2015; 25(123): 21-31 (Persian).
 18. Wang X, Xia Y, Liu L, Liu M, Gu N, Guang H, et al. Comparison of MTT assay, flow cytometry, and RT-PCR in the evaluation of cytotoxicity of five prosthodontic materials. *J Biomed Mater Res B Appl Biomater* 2010; 95(2): 357-364.
 19. Wahab R, Dwivedi S, Khan F, Mishra YK, Hwang I, Shin H-S, et al. Statistical analysis of gold nanoparticle-induced oxidative stress and apoptosis in myoblast (C2C12) cells. *Colloids Surf B Biointerfaces* 2014; 123: 664-672.
 20. Holmes EE, Jung M, Meller S, Leisse A, Sailer V, Zech J, et al. Performance evaluation of kits for bisulfite-conversion of DNA from tissues, cell lines, FFPE tissues, aspirates, lavages, effusions, plasma, serum,

- and urine. *PloS One* 2014; 9(4): e93933.
21. Booth MJ, Ost TW, Berald D, Bell NM, Branco MR, Reik W, et al. Oxidative bisulfite sequencing of 5-methylcytosine and 5-hydroxymethylcytosine. *Nature Protocols* 2013; 8(10): 1841-1851.
 22. Azadmehr A, Oghyanous KA, Hajiaghae R, Amirghofran Z, Azadbakht M. Antioxidant and neuroprotective effects of scrophularia striata extract against oxidative stress-induced neurotoxicity. *Cell Mol Neurobiol* 2013; 33(8): 1135-1141.
 23. Azadbakht M, Hosseiniemehr S, Shokrzadeh M, Habibi E, Ahmadi A. *Diospyros lotus L.* fruit extract protects G6PD-deficient erythrocytes from hemolytic injury in vitro and in vivo: prevention of favism disorder. *Eur Rev Med Pharmacol Sci* 2011; 15(11): 1270-1281.
 24. Pérez-Herrero E, Fernández-Medarde A. Advanced targeted therapies in cancer: drug nanocarriers, the future of chemotherapy. *Eur J Pharm Biopharm* 2015; 93: 52-79.
 25. Rezai M, Davoodi A, Asori M, Azadbakht M. Cytotoxic Activity of *Citrullus colocynthis* (L.) Schrad Fruit Extract on Gastric Adenocarcinoma and Breast Cancer Cell Lines. *Int J Pharm Sci Rev Res* 2017; 45(1): 175-178.
 26. Butler LM, Agus DB, Scher HI, Higgins B, Rose A, Cordon-Cardo C, et al. Suberoylanilide hydroxamic acid, an inhibitor of histone deacetylase, suppresses the growth of prostate cancer cells in vitro and in vivo. *Cancer Res* 2000; 60(18): 5165-5170.
 27. Eroğlu C, Seçme M, Bağcı G, Dodurga Y. Assessment of the anticancer mechanism of ferulic acid via cell cycle and apoptotic pathways in human prostate cancer cell lines. *Tumor Biology* 2015; 36(12): 9437-9446.
 28. Meiyanto E, Putri D, Susidarti RA, Murwanti R, Sardjiman FA, Husnaa U, et al. Curcumin and its analogues (PGV-0 and PGV-1) enhance sensitivity of resistant MCF-7 cells to doxorubicin through inhibition of HER2 and NF-κB activation. *Asian Pac J Cancer Prev* 2014; 15(1): 179-184.
 29. Davoudi Z, Akbarzadeh A, Rahmatiyamchi M, Movassaghpoor AA, Alipour M, Nejati-Koshki K, et al. Molecular target therapy of AKT and NF-κB signaling pathways and multidrug resistance by specific cell penetrating inhibitor peptides in HL-60 cells. *Asian Pac J Cancer Prev* 2014; 15(10): 4353-4358.
 30. Leitzmann MF, Rohrmann S. Risk factors for the onset of prostatic cancer: age, location, and behavioral correlates. *Clin Epidemiol* 2012; 4: 1-11.
 31. Kirkegaard T, Witton CJ, Edwards J, Nielsen KV, Jensen LB, Campbell FM, et al. Molecular alterations in AKT1, AKT2 and AKT3 detected in breast and prostatic cancer by FISH. *Histopathology* 2010; 56(2): 203-211.