

BRIEF REPORT

Investigating the Frequency of *AlgD* Gene in Clinical Isolates of *Pseudomonas Aeruginosa* Collected from Teaching-Therapeutic Hospitals of Mazandaran-2022

Mohammad Kaboli Chalmardi¹,
Mehrdad Gholami²,
Negar Hajilou³,
Maedeh Kakavan³,
Mehdi Haghshenas⁴,
Hamid Reza Goli^{5,6}

¹ Medical Student, Faculty of Medicine, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

²Assistant Professor, Department of Medical Microbiology and Virology, Faculty of Medicine, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

³ MSc Student in Microbiology, Faculty of Medicine, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

⁴ Medical Student, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

⁵ Molecular and Cell Biology Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

⁶ Associate Professor, Department of Medical Microbiology and Virology, Faculty of Medicine, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

(Received December 16, 2023; Accepted April 3, 2024)

Abstract

Background and purpose: *Pseudomonas aeruginosa* is an opportunistic nosocomial pathogen, which is resistant to different groups of antibiotics. Infections caused by this organism due to antibiotic resistance may ultimately cause high mortality. The ability of this microorganism to produce pathogenic factors such as alginate, proteases, pyocyanin, rhamnolipid, phospholipase C, the presence of pili, and the ability to form biofilm and colonization have made this bacterium one of the most important pathogens. Considering that alginate is one of the important pathogenic factors of this microorganism which mainly *algA*, *algC*, and *algD* genes encode enzymes necessary for the leading biosynthesis pathway of alginate-GDP-mannuronic acid. Therefore, in the current study, we investigated the frequency of the *algD* gene in *P. aeruginosa* isolated from patients hospitalized in Mazandaran hospitals using specific primers by PCR method.

Materials and methods: According to the results of past studies and using the sample size formula to calculate the prevalence and considering the maximum error of 0.05, the confidence level of 0.95, the ratio of 0.97, and the sample size of the unlimited population was estimated to be 100 isolates. Clinical isolates of *P. aeruginosa* were collected from different laboratories of Mazandaran educational hospitals. After collecting the clinical isolates of *P. aeruginosa* and definitively identifying the bacteria by performing routine biochemical tests, the antibiotic resistance pattern of the isolates was checked with Agar Diffusion Disk. In the next step, we extracted the DNA of *P. aeruginosa* strains by alkaline lysis method by adding sodium dodecyl sulfate and NaOH. Finally, a PCR test was performed using the specific primer of the *algD* gene. Then, the PCR product was evaluated using a UV Transilluminator device. Data were analyzed using SPSS software.

Results: 100 isolates of *P. aeruginosa* were isolated from 100 hospitalized patients. These isolates were collected from five medical educational hospitals of Mazandaran province, which were as follows: Imam Khomeini Hospital in Sari (40 isolates), Razi Hospital in Qaemshahr (22 isolates), Bo Ali Sina Hospital in Sari (17 isolates), Zare Psychiatric and Burn hospital in Sari (11 isolates), and Fatemeh Zahra heart hospital in Sari (10 isolates). Most of the clinical isolates of *P. aeruginosa* in the present study were obtained from sputum samples (37/100) and in second place from urine samples (26/100) of patients. 98 isolates had the *algD* gene. 26% of isolates were resistant to Piperacillin, 39% of isolates to Aztreonam, 27% of isolates to Ceftazidime, 31% of isolates to Imipenem, 39% to Tobramycin and 41% to Ciprofloxacin. All clinical isolates resistant to studied antibiotics carried the *algD* gene. Only two isolates of the sensitive strains of this organism in each group of antibiotics lacked the desired gene.

Conclusion: The results of the present study show that the *algD* gene is present in most of the clinical isolates of the *P. aeruginosa* strain obtained from medical education centers in Mazandaran. On the other hand, the high prevalence of this organism and the high resistance to antibiotics and multiple drugs observed in the current study and previous studies have turned the treatment of infections caused by *P. aeruginosa* into a serious and complex problem. Finally, considering that the *algD* gene plays a significant role in the formation of biofilm and antibiotic resistance, the results of the current study also confirm this finding.

Keywords: *pseudomonas aeruginosa*; antibiotic resistance; alginate; *algD*, mazandaran

J Mazandaran Univ Med Sci 2024; 34 (232): 218-226 (Persian).

Corresponding Author: Hamid Reza Goli - Faculty of Medicine, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran.
(E-mail: goli59@gmail.com)

بررسی فراوانی ژن *algD* در ایزوله های بالینی سودوموناس آنروژنیوز/آوری شده از بیمارستان های آموزشی-درمانی مازندران

محمد کابلی چلمردی^۱مهرداد غلامی^۲نگار حاجیلو^۳مائده کاکاون^۴مهدى حق شناس^۵حیدرضا گلی^۶

چکیده

سابقه و هدف: سودوموناس آنروژنیوز یکی از عوامل فرصت طلب عفونت بیمارستانی است که به گروههای مختلف آنتی بیوتیک ها مقاوم است. عفونت های ناشی از این ارگانیسم به علت مقاومت آنتی بیوتیکی ممکن است درنهایت موجب مرگ و میر بالای شود. توانایی این میکرووار گانیسم در تولید فاکتورهای بیماری زایی همچون آلژینات، پروتازها، پیوسینین، رامنولیپید، فسفولیپاز C، وجود پیلی و توانایی تشکیل بیوفیلم و کلونیزاسیون سبب شده است که این باکتری به عنوان یکی از مهم ترین پاتوژن های بیماری زای شمار رود. با توجه به این که آلژینات یکی از عوامل بیماری زای این میکرووار گانیسم است و با توجه به این که عمدتاً ژن های *algC* و *algA* و آنزیم های ضروری برای مسیر بیوسنتز پیشرو آلژینات-GDP-مانورونیک اسید را کد می کنند، مطالعه حاضر با هدف بررسی فراوانی ژن *algD* در سودوموناس آنروژنیوز جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان های مازندران، با استفاده از پرایمرهای اختصاصی به روش PCR، انجام پذیرفت.

مواد و روش ها: با توجه به نتایج مطالعات گذشته و استفاده از فرمول حجم نمونه برای محاسبه شیوع و در نظر گرفتن حداکثر خطای ۰/۰۵ و سطح اطمینان ۹۵٪، و نسبت ۰/۹۷، حجم نمونه برای جامعه نامحدود برابر ۱۰۰ ایزوله برآورد شد. ایزوله های بالینی سودوموناس آنروژنیوز از آزمایشگاه های مختلف بیمارستان های آموزشی درمانی مازندران جمع آوری شدند. پس از جمع آوری ایزوله های بالینی سودوموناس آنروژنیوز و شناسایی قطعی باکتری با انجام آزمایش های معمول بیوشیمیابی، الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله ها با روش دیسک آگار دیفیوژن بررسی شد. در مرحله بعد با افزودن سدیم دودسیل سولفات و NaOH، DNA سویه های سودوموناس آنروژنیوز به روش لیز قلایی استخراج شد. در نهایت تست PCR با استفاده از پرایمر اختصاصی ژن *algD* انجام شد. سپس محصول PCR با استفاده از دستگاه UV ترانس لومینیت مورد ارزیابی قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها: تعداد ۱۰۰ ایزوله سودوموناس آنروژنیوز از ۱۰۰ بیمار بستری در بیمارستان ها جدا شد. این ایزوله ها از پنج بیمارستان آموزشی درمانی استان مازندران، بیمارستان امام خمینی ساری (۴۰ ایزوله)، بیمارستان رازی قائم شهر (۲۲ ایزوله)، بیمارستان بوعلی سینا ساری (۱۷ ایزوله)، بیمارستان روانپردازی و سوختگی زارع ساری (۱۱ ایزوله) و بیمارستان قلب فاطمه زهراء ساری (۱۰ ایزوله) جمع آوری شدند. بیش تر ایزوله های بالینی سودوموناس آنروژنیوز در مطالعه حاضر از نمونه های خلط (۳۷/۱۰۰) و در رتبه دوم از نمونه های ادرار (۲۶/۱۰۰) بیماران بدست آمد. در این مطالعه، ایزوله حامل ژن *algD* بودند. هم چنین، ۲۶ درصد ایزوله ها به پپراسیلن، ۳۹ درصد ایزوله ها به آزترئونام، ۲۷ درصد ایزوله ها به سفتازیدیم، ۳۱ درصد ایزوله ها به ایمی پن، ۳۹ درصد به توبرامایسین و ۴۱ درصد به سپیروفلوكسایسین مقاوم بودند. تمام ایزوله های بالینی مقاوم به آنتی بیوتیک های مورد مطالعه حامل ژن *algD* بودند. تنها دو ایزوله از سویه های حساس این ارگانیسم در هر گروه آنتی بیوتیک فاقد ژن موردنظر بودند.

استنتاج: نتایج مطالعه ای حال حاضر نشان می دهد که ژن *algD* در غالب ایزوله های بالینی سویه سودوموناس آنروژنیوز/ آوری شده از مراکز آموزشی درمانی مازندران وجود دارد. از سوی دیگر شیوع بالای این ارگانیسم و مقاومت بالای آنتی بیوتیکی و چند دارویی که در مطالعه حال حاضر و مطالعات پیشین مشاهده شده است، درمان عفونت های ناشی از سودوموناس آنروژنیوز را به مشکلی جدی و پیچیده در مراکز درمانی تبدیل نموده است. در نهایت با توجه به این که ژن *algD* در تشکیل بیوفیلم و مقاومت آنتی بیوتیکی نقش بهسزایی دارد. نتایج مطالعه حال حاضر نیز این یافته را تایید می کند.

واژه های کلیدی: سودوموناس آنروژنیوز، مقاومت آنتی بیوتیکی، آلژینات، *algD*، مازندران

E-mail: goli59@gmail.com

مولف مسئول: حیدرضا گلی - ساری: کلوب رضا ۱۷ جاده فرح آباد، مجتمع دانشگاهی پامبر اعظم (ص)، دانشکده پزشکی

۱. دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

۲. استادیار، گروه مکروب شناسی و ویروس شناسی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

۳. دانشجوی دانشجوی کارشناسی ارشد مکروب شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

۴. دانشجوی پزشکی، دانشکده علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

۵. مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی و مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

۶. دانشیار، گروه مکروب شناسی و ویروس شناسی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

تاریخ دریافت: ۱۴۰۲/۹/۲۵ تاریخ ارجاع چهت اصلاحات: ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ تاریخ تصویب: ۱۴۰۳/۱/۱۵

مقدمه

بیوسترن آلرینات توسط اپرون *algD* انجام می شود^(۶). با توجه به این که آلرینات یکی از فاکتورهای مهم بیماری زایی این میکرووارگانیسم به شمار می رود و به علت نقص مهم ژن *algD* در بیوسترن آلرینات، لذا در مطالعه‌ی حال حاضر به بررسی فراوانی ژن *algD* در ایزوله‌های سودوموناس آنروژینوزای جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان‌های آموزشی درمانی استان مازندران، پرداخته شد.

مواد و روش‌ها

طراحی تحقیق، جمع آوری نمونه و تعیین هویت باکتری‌ها مطالعه‌ی مذکور توسط کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی مازندران با کد اخلاق IR.MAZUMS..REC.1401.359 تصویب گردید. در ضمن، تمامی موارد رعایت اخلاق در پژوهش رعایت شده و اطلاعات بیماران به‌طور محترمانه نگه داشته شده‌اند. در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، تعداد ۱۰۰ ایزوله بالینی سودوموناس آنروژینوزا از آزمایشگاه‌های مختلف بیمارستان‌های آموزشی درمانی مازندران جمع آوری شده و پس از انجام تست‌های بیوشیمیابی روئین (شامل رنگ آمیزی گرم، مرفلوژی کلی‌ها، تولید پیگمان بر روی محیط مولرهینتون آگار، تست‌های اکسیداز، کاتالاز، واکنش غیرتخمیری در محیط TSI، SIM، Triple Sugare Iron Agar) رشد در سیتریمايد آگار، رشد در دمای ۴۲ درجه و بوی کلی به صورت قطعی تعیین هویت شدند^(۸). سپس باکتری‌ها در محیط کشت Tryptic Soy Broth حاوی درصد گلیسروول کشت شده و در دمای ۲۰-۲۰ درجه سانتی گراد نگهداری شدند.

تعیین الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی ایزوله‌ها برای انجام تست دیسک آگار دیفیوژن، ابتدا یک کشت ۲۴ ساعته از باکتری‌ها تهیه گردید. سپس، کبدورتی معادل نیم مک فارلنند (حاوی 10^8 cfu/ml) از

سودوموناس آنروژینوزا یکی از علل عفونت‌های فرصت طلب بیمارستانی و مقاوم به گروه‌های مختلفی از آنتی‌بیوتیک‌ها است^(۱). این باکتری از مکانیسم‌هایی همچون تولید آنزیم‌های تخریب‌کننده، افزایش بیان پمپ‌های افلاکس، کاهش خروج دارو، ایجاد موتابیون‌های کروموزومی، تولید کپسول و بیوفیلم برای ایجاد مقاومت آنتی‌بیوتیکی استفاده می‌کند^(۲،۱). این میکرووارگانیسم عامل عفونت‌های جدی همچون سپتی سمی، اندوکاردیت و اوپیت خارجی بوده و به علت تولید فاکتورهای بیماری زایی همچون آلرینات، پروتازها، پیوسیانین، رامنولیپید، فسفولیپاز C، پیلی و بیوفیلم و کلوتیزاسیون، به عنوان یکی از مهم‌ترین پاتوژن‌های بیماری‌زا به شمار می‌رود^(۳،۱).

تعدد عوامل ویرولانس سبب ایجاد عفونت‌های شدید و کشنده در مبتلایان به بیماری‌های زمینه‌ای همچون سیستیک فیروزیس، عفونت‌های مزمن ریوی، برونشکتازی، سوختگی، نثوپلازی، نوتروپنی، ایدز و ... شود^(۳). تولید کپسولی از جنس آلرینات به عنوان یکی از مهم‌ترین فاکتورهای بیماری‌زایی این ارگانیسم باعث اتصال به سلول میزان و سهولت در تشکیل میکروکلونی در بافت هدف می‌گردد^(۴). آلرینات یک اگرو-پلی‌ساکارید متشکل از D-mannuronic اسید و L-guluronic اسید است و تولید آن برای تشکیل فوتبیپ مخاطی سودوموناس آنروژینوزا که در CF دیده می‌شود، ضروری است^(۵).

AlgD و *AlgC* آنزیم‌های مهمی در تولید *GDP-mannuronic acid* *AlgA* تولید مانوز-۶-فسفات از فروکتوز-۶-فسفات و *GDP-mannose* از مانوز-۱-فسفات را کاتالیز می‌کند، در حالی که *AlgC* نیز تبدیل مانوز-۶-فسفات به مانوز-۱-فسفات را کاتالیز می‌کند^(۶). *AlgD* یک *GDP-mannose* دهیدروژناز است که تولید *GDP-mannuronic acid* از *GDP-mannose* را کاتالیز می‌کند^(۷). بنابراین کنترل

PCR انجام شد(۱۱). جهت انجام تست PCR، ۵ میکرولیتر DNA از هر کدام از پرایمرها همراه با ۱/۵ میکرولیتر DNA (۹۰۰ نانو گرم) در ترکیب با ۷/۵ میکرولیتر از Master mix و ۵ میکرولیتر آب مقطر با حجم نهایی ۱۵ میکرولیتر، مورد استفاده قرار گرفت. مرحله‌ی اولیه واپاشی در دمای ۹۴ درجه سانتی گراد به مدت ۵ دقیقه انجام شد. سپس، ۳۴ سیکل به شرح زیر انجام گردید. واپاشی (Denaturation) در دمای ۹۴ درجه سانتی گراد به مدت ۶۵ ثانیه، اتصال پرایمرها (Annealing) در دمای ۳۰ درجه سانتی گراد به مدت ۳۰ ثانیه، تکثیر (Extension) در دمای ۷۲ درجه سانتی گراد به مدت ۹۰ ثانیه در نهایت، یک دمای ۷۲ درجه سانتی گراد به مدت ۱۰ دقیقه جهت تکثیر نهایی محصول PCR انجام شد. سپس، محصول PCR با طول قطعه ۱۳۱۰ bp بر روی ژل آگارز ۱ درصد Safe Stain (Wiz biosolution) (با ۱/۵ میکرولیتر SinaClon، ایران) الکتروفوروز شده و با استفاده از دستگاه UV ترانس لومینیتر مورد ارزیابی قرار گرفت.

تجزیه و تحلیل آماری

اطلاعات حاصل از این مطالعه با استفاده از نرم افزار آماری SPSS 22 و تست آماری Chi-square مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و P value کمتر از ۰/۰۵ از لحاظ آماری معنادار در نظر گرفته شد.

یافته‌ها و بحث


سودوموناس آئروژنیوزا یکی از مهم‌ترین پاتوژن‌های مقاوم به آنتی‌بیوتیک و ایجاد کننده عفونت‌های جدی در بیماران به خصوص بیماران دچار سوختگی است و تشکیل بیوفیلم از جمله مکانیسم‌هایی است که مقاومت آنتی‌بیوتیکی را تقویت می‌کند(۱۲). در سودوموناس آئروژنیوزا، ماتریکس بیوفیلم‌های ایجاد شده از ژن‌های psl و pel و algD تشکیل شده است(۱۲). آژینات یک پلیمر خطی مت Shank از acid acid β-d-mannuronic acid و α-L-guluronic acid است و نقش مهمی در پایداری

باکتری‌ها تهیه شده و با استفاده از سوآب سر پنهانی سوسپانسیون باکتری بر روی محیط کشت مولر هیتوون آگار به صورت چمنی کشت داده شد. سپس، دیسک‌های آنتی‌بیوتیکی با فاصله ۱۵ میلی‌متر از لبه پلیت و ۲۵ میلی‌متر از یکدیگر بر روی سطح محیط کشت قرار گرفتند. پلیت‌ها در دمای ۳۷ درجه سانتی گراد انکوبه شده، پس از ۲۴ ساعت، قطر هاله‌های عدم رشد باکتری در اطراف دیسک‌ها با خط کش اندازه گیری شدند و براساس دستورالعمل‌های انتیتو استانداردهای بالینی و آزمایشگاهی (CLSI 2023) نتایج تفسیر شدند. ایزوله‌ها به صورت مقاوم، مقاوم حد واسطه یا حساس گزارش گردیدند(۹). برای کنترل کیفی این تست از سویه سودوموناس آئروژنیوزای ATCC 27853 استفاده شد.

استخراج DNA و انجام تست PCR

سویه‌های سودوموناس آئروژنیوزا به روش لیز قلیایی با افزودن سدیم دودسیل سولفات (SDS) و NaOH استخراج شد(۱۰). به طور خلاصه، با حل کردن ۰/۵ گرم SDS (Sigma، آلمان) و ۰/۴ گرم NaOH در ۲۰۰ میکرولیتر آب مقطر استریل، محلول استخراج آماده شد. سپس، ۴ تا ۶ کلونی از باکتری‌های خالص در ۲۰ میکرولیتر از این محلول حل شدند و میکروتیوب به مدت ۱۰ دقیقه در دمای ۹۵ درجه سانتی گراد انکوبه شد و بعد به مدت ۳ دقیقه در ۱۳۰۰ rpm سانتریفیوژ شد. در نهایت، ۱۸۰ میکرولیتر آب مقطر استریل به میکروتیوب اضافه و از مایع رویی به عنوان DNA استفاده شد(۱۰). OD (چگالی نوری) DNA ها با استفاده از ND1000 (ND)، ایالات متحده آمریکا) اندازه گیری شد. همچنین، DNA های استخراج شده بر روی ژل آگارز ۱/۵ درصد (Wizbiosolutions، کره جنوبی) الکتروفوروز شدند. در مرحله‌ی algD بعد، با استفاده از پرایمر اختصاصی ژن Forward: ATGCGAATCAGCATCTTGGT (Reverse: TACCAAGCAGATGCCCTCGGC) تست

مردان (۳ ایزوله)، اورثانس (۱۳ ایزوله)، بخش زنان (۲ ایزوله)، بخش انکولوژی (۱ ایزوله)، بخش مراقبت های قلبی (۵ ایزوله)، بخش نورولوژی (۲ ایزوله) و بخش کودکان (۵ ایزوله) جمع آوری شدند. در مطالعه جامعی که در ۷۲ کشور جهان به منظور بررسی شیوع سودوموناس آئروژینوزا انجام شده بود، سودوموناس آئروژینوزا یکی از شایع ترین ارگانیسم ها در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه بوده است (۲۰). در مطالعه حاضر، از مجموع ۱۰۰ ایزوله نمونه های بالینی، ۹۸ ایزوله واجد ژن *algD* بودند. تصویر شماره ۱ نتایج تست PCR برای شناسایی ژن *algD* مورد مطالعه را نشان می دهد.



تصویر شماره ۱: نتیجه الکتروفورز محصول PCR برای ژن *algD* از میان تنها ۱۰۰ ایزوله بالینی به دست آمده تنها ۹۸ ایزوله واجد ژن *algD* بودند (ردیف ۱: DNA Marker، ردیف ۲: کنترل مثبت، ردیف ۳ به بعد: نمونه های اصلی).

از میان ۲ ایزوله فاقد ژن *algD*، یک ایزوله بالینی از بخش CCU و یک مورد از بخش ICU جمع آوری شده بودند. تمامی سویه های جدا شده از نمونه های خون، کاتتر، ترشحات چشمی، ترشحات زخم پای دیابتی، مدفوع و زخم حامل ژن *algD* بودند، در حالی که از ۳۷ ایزوله خلط و ۲۶ ایزوله ادرار، هر کدام یک ایزوله فاقد ژن مورد نظر بودند. به لحاظ آماری ارتباط معنی داری میان حضور ژن *algD* با سن، جنسیت، بخش بیمارستانی و نوع نمونه بالینی مشاهده نگردید ($P > 0.05$). در مطالعه رجبی و همکاران، از مجموع ۱۱۲ ایزوله بالینی مورد مطالعه، ۸۸ (۷۸/۶ درصد) مورد حامل ژن

ساختاری و حفاظت از بیوفیلم دارد (۱۳). سنتر آلتینات در سودوموناس آئروژینوزا/ توسط اپرون *algACD* کنترل می شود. *AlgD* کد گذاری شده توسط ژن *algD* یک GDP-mannose dehydrogenase است که تولید GDP-mannose از GDP-mannuronic acid را کatalیز می کند (۶). ژن *algD* واسطه کنترل بیوستر آلتینات و رونویسی پروتئین های *Alg* و مسئول تولید نهایی پیش ساز GDP-mannuronic acid، مولکول پایه پلیمریزاسیون و سنتر آلتینات است (۱۴). با توجه به اهمیت این ژن در پایداری بیوفیلم و ایجاد مقاومت آنتی بیوتیکی ناشی از سودوموناس آئروژینوزا، در مطالعه حال حاضر به بررسی فراوانی ژن *algD* در ایزوله های بالینی تهیه شده از مراکز آموزشی - درمانی مازندران پرداخته شد. تعداد ۱۰۰ ایزوله بیمارستانی غیر تکراری سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از ۱۰۰ بیمار بستری وارد مطالعه جدا شدند، در حالی که ۶۱ ایزوله (۶۱ درصد) از مردان و ۳۹ (۳۹ درصد) از بیماران خانم به دست آمده بودند. نتایج مشابهی توسط Al-Hasan و همکاران و Khan و همکاران گزارش شده است (۱۵، ۱۶).

فضلی و همکاران بر این باور هستند که شیوع بالای سودوموناس آئروژینوزا در بیماران مرد در شغل آن ها نهفته است که معمولاً شامل کارهای سخت خارج از خانه می شود، در حالی که زنان ایرانی معمولاً خانه دار هستند و از محیط های آلوده دورتر هستند (۱۷). ایزوله های باکتریایی مطالعه حاضر از نمونه های بالینی خلط (۳۷ ایزوله)، زخم (۱۹ ایزوله)، ادرار (۲۶ ایزوله)، خون (۵ ایزوله)، ترشحات زخم پای دیابتی (۱ ایزوله)، مدفوع (۲ ایزوله)، ترشحات چشمی (۲ ایزوله) و کاتتر وریدی (۸ ایزوله) جداسازی شده بودند. بروز بالای سودوموناس آئروژینوزا در عفونت های تنفسی در مطالعات پیشین نیز گزارش شده است (۱۸، ۱۹). همچنین، سویه های مطالعه حاضر از بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه (۵۳ ایزوله)، بخش سوختگی (۶ ایزوله)، بخش داخلی (۴ ایزوله)، اتفاق عمل و بخش جراحی (۶ ایزوله)، بخش


و ترشح پوسیانین در بین ایزوله‌های سودوموناس *toxA* آثروژینوزا بسیار بالا بوده است (۲۴).

همچنین، در مطالعه حاضر، ۲۶ درصد ایزوله‌ها نسبت به پپراسیلین، ۳۹ درصد به آزترونام، ۲۷ درصد به سفتازیدیم، ۳۱ درصد به ایمی‌پنم، ۳۹ درصد به توبرامايسین و ۴۱ درصد ایزوله‌ها به سپروفلوکساسین مقاوم بودند (نمودار شماره ۱).

به لحاظ آماری ارتباط معنی‌داری میان وجود ژن *algD* و بروز مقاومت نسبت به آنتی‌بیوتیک‌های مورد مطالعه مشاهده نشد ($P > 0.05$) (جدول شماره ۱). نظارت جامع بر مقاومت آنتی‌بیوتیکی در کشورهای اروپایی در سال ۲۰۱۷، طیفی از مقاومت ترکیبی (مقاومت به سه یا چند گروه آنتی‌بیوتیکی) را از ۰ درصد در ایسلند تا ۵۹/۱ درصد در رومانی را نشان داد (۱۶). هم‌چنین، شیوع سودوموناس آثروژینوزا MDR در ایران بین ۱۰۰ تا ۱۰۰ درصد گزارش شده است (۲۵). در مطالعه حال حاضر، بیشترین مقاومت ایزوله‌های بالینی به ترتیب مربوط به سپروفلوکساسین، آزترونام و توبرامايسین بوده است.

algD بودند (۱۲). فراوانی این ژن در بین ۵۷ سویه سودوموناس آثروژینوزا مورد مطالعه توسط Banar و همکاران ۱۰۰ درصد بود (۱۳). هم‌چنین، در سایر مطالعات انجام شده توسط Namuq و همکاران، قدرک ساز و همکاران و Zaranza و همکاران، فراوانی ژن *algD* به ترتیب ۹۸، ۸۷/۵ و ۳۹ درصد گزارش شده است (۲۱-۲۳). از طرفی دیگر، از مجموع ۱۰۰ ایزوله بالینی سودوموناس آثروژینوزا جمع آوری شده در مطالعه حاضر، به ترتیب ۲، ۲، ۹۴ و ۲ ایزوله بالینی دارای رنگدانه قهوه‌ای، سبز-آبی، سبز و زرد بودند. تمامی ایزوله‌های بالینی دارای رنگدانه قهوه‌ای و سبز-آبی حاوی ژن *algD* نیز بودند، و از مجموع ۹۴ ایزوله دارای رنگدانه سبز، یک ایزوله و از مجموع ۲ ایزوله دارای رنگدانه زرد نیز یک ایزوله فاقد ژن *algD* بودند ($P < 0.05$). با این حال، در هیچ یک از مطالعات پیشین، ارتباط بین بروز انواع رنگدانه و ژن‌های ویرولانس سودوموناس آثروژینوزا بررسی نشده بود. تنها در مطالعه Al Dawodeyah و همکاران اشاره شده است که شیوع ژن‌های ویرولانس *dasB*، *algD* و *algB* شد.

تعداد ایزوله‌های بالینی سودوموناس آثروژینوزا مقاوم به انواع آنتی‌بیوتیک‌ها



نمودار شماره ۱: نمودار الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی ایزوله‌های بالینی سودوموناس آثروژینوزا

جدول شماره ۱: بررسی ارتباط بین حضور ژن *algD* و بروز مقاومت نسبت به آنتی‌بیوتیک‌های مورد مطالعه

وضعیت مقاومت	حضور ژن <i>algD</i> (درصد)	سپروفلوکساسین (درصد)	تعداد (درصد)	تعداد (درصد)	ایمی-پنم (درصد)	متافتزیدم (درصد)	آزترونام (درصد)	پپراسیلین (درصد)	تعداد (درصد)
حساس	(۴۶/۴۲)۵۴	(۴۶/۶۶)۵۸	(۴۶/۷۲)۵۹	(۴۷/۱۸)۶۹	(۴۷/۱۸)۲۶	(۴۷/۲۲)۵۱	(۴۷/۲۵)۲۶	(۴۶/۲۲)۵۱	(۴۶/۲۲)۵۱
نسبتاً مقاوم	(۳/۵۷)۲	(۳/۳۳)۲	(۳/۲۷)۲	(۲/۲۱)۲	(۷/۱۴)۲	(۷/۷۸)۲	(۷/۱۴)۲	(۳/۷۸)۲	(۳/۷۸)۲
مقاوم	(۱۰۰)۳	(۱۰۰)۱	(۱۰۰)۸	(۱۰۰)۲	(۱۰۰)۲۳	(۱۰۰)۲۶	(۱۰۰)۲۳	(۱۰۰)۲۶	(۱۰۰)۲۶
خبر
مقاوم	(۱۰۰)۴۱	(۱۰۰)۳۹	(۱۰۰)۳۱	(۱۰۰)۲۷	(۱۰۰)۳۹	(۱۰۰)۲۱	(۱۰۰)۲۱	(۱۰۰)۲۱	(۱۰۰)۲۱
خبر
سطح معنی داری	۰/۶۴۹	۰/۵۰۶	۰/۵۲۱	۰/۶۵۹	۰/۷۲۳	۰/۴۰۵	۰/۴۰۵	۰/۴۰۵	۰/۴۰۵

در غالب ایزوله های بالینی سویهی سودوموناس آئروژینوزا تهیه شده از مراکز آموزشی درمانی مازندران وجود دارد. از سوی دیگر شیوع بالای این ارگانیسم و مقاومت بالای آنتی بیوتیکی و چند دارویی که در مطالعه حال حاضر و مطالعات پیشین مشاهده شده است، درمان عفونت های ناشی از سودوموناس آئروژینوزا را به مشکلی جدی و پیچیده در مراکز درمانی تبدیل نموده است. در آخر با توجه به این که ژن *D alg* در تشکیل بیوفیلم و مقاومت آنتی بیوتیکی نقش بسزایی دارد نتایج مطالعه حال حاضر نیز این یافته را تایید می کند.

سپاسگزاری

این تحقیق منتج از پایان نامه دانشجوی دکتری حرفه ای در رشته پزشکی بود و توسط کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی مازندران با کد اخلاق IR.MAZUMS..REC.1401.359 مورد تصویب قرار گرفت. از معاونت تحقیقات دانشگاه برای تأمین هزینه مطالعه، تشکر و قدردانی می گردد.

در مطالعه Bazghandi و همکاران، ۵۷/۱ درصد، ۴۶/۵ درصد، ۴۲/۹ درصد، ۶۶/۷ درصد و ۵۴/۸ درصد ایزوله ها، به ترتیب نسبت به پیراسیلین، سفتازیدیم، آزترئونام، ایمی پنم و سپروفلوکساسین مقاوم بودند(۲۶). در مطالعه شهاب زاده و همکاران، به ترتیب ۶۸/۷ و ۴۳/۷ درصد از ایزوله ها نسبت به سپروفلوکساسین، سفتازیدیم و ایمی پنم مقاوم بودند(۲۷).

در مطالعه Silva و همکاران، به ترتیب ۶/۲۳، ۱۵/۶، ۳۷/۵، ۳۷/۴ و ۶/۲۵ درصد از ایزوله ها به ۲، ۳، ۴ و ۶ کلاس از آنتی بیوتیک ها مقاومت نشان داده بودند(۲۸). در مطالعه حاضر نیز غالب ایزوله های بالینی سودوموناس آئروژینوزا به آنتی بیوتیک های مورد مطالعه مقاومت داشتند، در حالی که اکثر ایزوله های بالینی مقاوم حامل ژن *D alg* بودند.

از محدودیت های مطالعه می توان به، عدم انجام تست آنتی بیو گرام برای آنتی بیوتیک های بیش تر و عدم بررسی ژن های دیگر دخیل در تولید کپسول، اشاره کرد. نتایج مطالعه حال حاضر نشان می دهد که ژن *D alg*

References

1. Ahmadian L, Haghshenas MR, Mirzaei B, Khalili Y, Goli HR. Role of MexAB-OprM efflux pump in the emergence of multidrug-resistant clinical isolates of *Pseudomonas aeruginosa* in Mazandaran province of Iran. Mol Biol Rep 2023; 50(3): 2603-2609.
2. Abdelraheem WM, Abdelkader AE, Mohamed ES, Mohammed MS. Detection of biofilm formation and assessment of biofilm genes expression in different *Pseudomonas aeruginosa* clinical isolates. Meta Gene 2020; 23: 100646.
3. Azam MW, Khan AU. Updates on the pathogenicity status of *Pseudomonas aeruginosa*. Drug Discov Today 2019; 24(1): 350-359.
4. Phillips PL, Schultz GS. Molecular Mechanisms of Biofilm Infection: Biofilm Virulence Factors. Adv Wound Care 2012; 1(3): 109-114.
5. Reynolds D, Kollef M. The Epidemiology and Pathogenesis and Treatment of *Pseudomonas aeruginosa* Infections: An Update. Drugs 2021; 81(18): 2117-2131.
6. Laverty G, Gorman SP, Gilmore BF. Biomolecular Mechanisms of *Pseudomonas aeruginosa* and *Escherichia coli* Biofilm Formation. Pathogens 2014; 3(3): 596-632.
7. Govan JR, Deretic V. Microbial pathogenesis in cystic fibrosis: mucoid *Pseudomonas aeruginosa* and *Burkholderia cepacia*. Microbiol Rev 1996; 60(3): 539-574.
8. Barron E, Peterson L, Fingold S. Baily&Scott. Diagnostic Microbiology 1986; 7: 650.
9. CLSI. Clinical and laboratory standards

- institute (CLSI). Performance standards for antimicrobial susceptibility testing: 33rd ed. CLSI supplement M100-S33 (ISBN 978-1-68440-171-0; 2023. 2023.
10. Šipošová NŠ, Liptáková V, Kvasnová S, Kosorínová P, Pristaš P. Genetic diversity of *Acinetobacter* spp. adapted to heavy metal polluted environments. *Nova Biotechnologica Et Chimica* 2017; 16(1): 42-47.
 11. Lanotte P, Watt S, Mereghetti L, Dartiguelongue N, Rastegar-Lari A, Goudeau A, et al. Genetic features of *Pseudomonas aeruginosa* isolates from cystic fibrosis patients compared with those of isolates from other origins. *J Med Microbiol* 2004; 53(Pt 1): 73-81.
 12. Rajabi H, Salimizand H, Khodabandehloo M, Fayyazi A, Ramazanzadeh R. Prevalence of algD, pslD, pelF, Ppql, and PAPI-1 Genes Involved in Biofilm Formation in Clinical *Pseudomonas aeruginosa* Strains. *BioMed Res Int* 2022; 2022: 1716087.
 13. Banar M, Emaneini M, Satarzadeh M, Abdellahi N, Beigverdi R, Leeuwen WB, et al. Evaluation of Mannosidase and Trypsin Enzymes Effects on Biofilm Production of *Pseudomonas aeruginosa* Isolated from Burn Wound Infections. *PloS One* 2016; 11(10): e0164622.
 14. Kamali E, Jamali A, Ardebili A, Ezadi F, Mohebbi A. Evaluation of antimicrobial resistance, biofilm forming potential, and the presence of biofilm-related genes among clinical isolates of *Pseudomonas aeruginosa*. *BMC Research Notes* 2020; 13(1): 27.
 15. Al-Hasan MN, Wilson JW, Lahr BD, Eckel-Passow JE, Baddour LM. Incidence of *Pseudomonas aeruginosa* bacteremia: a population-based study. *Am J Med* 2008; 121(8): 702-708.
 16. Khan JA, Iqbal Z, Rahman SU, Farzana K, Khan A. Report: prevalence and resistance pattern of *Pseudomonas aeruginosa* against various antibiotics. *Pak J Pharm Sci* 2008; 21(3): 311-315.
 17. Fazeli N, Momtaz H. Virulence Gene Profiles of Multidrug-Resistant *Pseudomonas aeruginosa* Isolated From Iranian Hospital Infections. *Iran Red Crescent Med J* 2014; 16(10): e15722.
 18. Tingpej P, Smith L, Rose B, Zhu H, Conibear T, Al Nassafi K, et al. Phenotypic characterization of clonal and nonclonal *Pseudomonas aeruginosa* strains isolated from lungs of adults with cystic fibrosis. *J Clin Microbiol* 2007; 45(6): 1697-1704.
 19. West SE, Zeng L, Lee BL, Kosorok MR, Laxova A, Rock MJ, et al. Respiratory infections with *Pseudomonas aeruginosa* in children with cystic fibrosis: early detection by serology and assessment of risk factors. *JAMA* 2002; 287(22): 2985-2967.
 20. Vincent JL, Rello J, Marshall J, Silva E, Anzueto A, Martin CD, et al. International study of the prevalence and outcomes of infection in intensive care units. *JAMA* 2009; 302(21): 2323-2329.
 21. Ghadaksaz A, Fooladi AAI, Hosseini HM, Amin M. The prevalence of some *Pseudomonas* virulence genes related to biofilm formation and alginate production among clinical isolates. *Journal of Applied Biomedicine* 2015; 13(1): 61-68.
 22. Namuq AO, Ali KOM, Al-Ani AH. Correlation between biofilm formation, multi-drug resistance and AlgD gene among *Pseudomonas aeruginosa* clinical isolates. *Journal of University of Babylon for Pure and Applied Sciences* 2019; 27(3): 143-150.

23. Zaranza AV, Morais FC, do Carmo MS, de Mendonça Marques A, Andrade-Monteiro C, Ferro TF, et al. Antimicrobial susceptibility, biofilm production and adhesion to HEp-2 cells of *Pseudomonas aeruginosa* strains isolated from clinical samples. *Journal of Biomaterials and Nanobiotechnology* 2013; 04(01): 98-106.
24. Al Dawodeyah HY, Obeidat N, Abu-Qatouseh LF, Shehabi AA. Antimicrobial resistance and putative virulence genes of *Pseudomonas aeruginosa* isolates from patients with respiratory tract infection. *Germs* 2018; 8(1): 31-40.
25. Vaez H, Salehi-Abargouei A, Ghalehnoo ZR, Khademi F. Multidrug Resistant *Pseudomonas aeruginosa* in Iran: A Systematic Review and Metaanalysis. *J Global Infect Dis* 2018; 10(4): 212-217.
26. Bazghandi SA, Arzanlou M, Peeridogaheh H, Vaez H, Sahebkar A, Khademi F. Prevalence of Virulence Genes and Drug Resistance Profiles of *Pseudomonas aeruginosa* Isolated from Clinical Specimens. *Jundishapur J Microbiol* 2021; 14(8): e118452.
27. Shahbazzadeh M, Moazamian E, Rafati A, Fardin M. Antimicrobial resistance pattern, genetic distribution of ESBL genes, biofilm-forming potential, and virulence potential of *Pseudomonas aeruginosa* isolated from the burn patients in Tehran Hospitals, Iran. *Pan Afr Med J* 2020; 36: 233.
28. Silva A, Silva V, López M, Rojo-Bezares B, Carvalho JA, Castro AP, et al. Antimicrobial Resistance, Genetic Lineages, and Biofilm Formation in *Pseudomonas aeruginosa* Isolated from Human Infections: An Emerging One Health Concern. *Antibiotics* 2023; 12(8): 1248.