

Comparison of Differential Cell Counts in Samples of Broucho Alveolar Lavage in Diagnosis of Patients with and without Tuberculosis

AbbasAli Niazi¹,
NezarAli Molaei²,
Alireza DashiPour³,
Amin Rashki Ghaleño⁴,
Elahe naz Parsi mood⁵

¹ Assistant Professor, Department of Pathology, Faculty of Medicine, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran

² Associate Professor, Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran

³ Assistant Professor, Department of Nutritional Science, Faculty of Medicine, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran

⁴ General Practitioner, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran

⁵ Student of Medicine, Faculty of Medicine, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran

(Received December 9, 2015 ; Accepted December 27, 2016)

Abstract

Background and purpose: Identifying the types of immune cells in patients with tuberculosis (TB) including single-core and multi-core is of great benefit in control and treatment of these patients. The aim of this research was to compare differential cell count in Bronchoalveolar lavage (BAL) samples in patients with and without TB.

Materials and methods: In this descriptive-analytical study 100 patients were selected using purposive sampling. They were divided into two groups of positive and negative smear ($n=50$ per group). BAL samples were divided into two sections; one was used for culture and the other was fixed. Four smear slides were prepared from the sediments that were stained by Papanicolaou, Giemsa, hematoxylin-eosin (H&E), and Ziehl-Neelsen. Single-core and multi-core cell differential count was done and the association between the presence of TB bacteria and differential cell counts were studied in patients with TB. Also, the sensitivity, specificity, positive and negative predictive values for diagnosis of TB were investigated.

Results: Pearson correlation coefficients indicated that by increase in number of TB bacteria, the rate of neutrophil cells increased significantly ($r=0.526$, $P<0.001$), but the lymphocytes and eosinophils decreased significantly ($r=0.458$, $P=0.003$ and $r=0.363$, $P=0.021$, respectively) and no significant change occurred in plasma cells ($r=0.205$, $P=0.201$)

Conclusion: The findings showed that neutrophils is the predominant cells in (BAL) samples of TB patients and increasing levels were detected when the severity of bacteria increased.

Keywords: tuberculosis, differential cell count, Broucho Alveolar Lavage

مقایسه شمارش افتراقی سلول نمونه لاواز بروونکو آلوئولار در تشخیص بیماران سلی از غیر سلی

عباسعلی نیازی^۱

نizarali Molaiyi^۲

علیرضا داشی پور^۳

امین راشکی قلعه نو^۴

الهه ناز پارسی مود^۵

چکیده

سابقه و هدف: شناسایی میزان انواع سلول های ایمنی بیماران مسلول، اعم از تک هسته ای و چند هسته ای در کنترل و درمان این بیماری بسیار موثر است. هدف از این مطالعه مقایسه شمارش افتراقی سلول در نمونه لاواز بروونکو آلوئولار در تشخیص بیماران مبتلا به سل از غیر سلی بوده است.

مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی-تحلیلی تعداد ۱۰۰ بیمار با روش نمونه گیری مبتنی بر هدف به دو گروه اسمیر مثبت و اسمیر منفی (هر گروه ۵۰ نفر) تقسیم شدند. نمونه لاواز بروونکو آلوئولار تهیه شده از بیماران دو قسمت شد و یک قسمت برای کشت و قسمت دیگر آن بعد از تصفیه توسط محلول فیکساتور فیکس شد و از سدیمان آن ۴ لام اسمیر تهیه گردید که به روش های پاپانیکولا، گیمسا، H&E و زیل نلسون رنگ آمیزی شدند. شمارش افتراقی سلول تک هسته ای و چند هسته ای، ارتباط بین میزان وجود باکتری سل با شمارش افتراقی سلول در بیماران سلی و تعیین حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت و منفی اسمیر نمونه بال در تشخیص بیماران سلی از غیر سلی انجام شد.

یافته ها: ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که با افزایش تعداد باکتری سل، درصد سلول های نوتروفیل به طور معنی داری بالا می رود ($p=0.001$) اما میزان سلول های لنفوسيت و ائوزينوفیل به طور معنی داری کاهش می یابد ($p=0.021$) و میزان سلول های پلاسماسل تغییر محسوسی ندارد ($p=0.058$).
استنتاج: سلول غالب در نمونه لاواز بروونکو آلوئولار بیماران مبتلا به سل نوتروفیل می باشد و با افزایش شدت وجود باکتری میزان آن بالاتر می رود.

واژه های کلیدی: سل، شمارش افتراقی سلول، لاواز بروونکو آلوئولار

مقدمه

سل یک بیماری عفونی است که در اثر مجموعه مایکوباکتریوم های این باکتری ها عامل پاتوژن قوی در انسان بوده^(۱) و

E-mail: eliprs@yahoo.com

مؤلف مسئول: الهه ناز پارسی مود- زاهدان: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، دانشکده پزشکی

۱. استادیار، گروه پاتولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

۲. دانشیار، گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

۳. استادیار، گروه تغذیه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

۴. پژوهشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

۵. دانشجوی دکترای عمومی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

تاریخ دریافت: ۱۳۹۴/۹/۱۸ تاریخ ارجاع جهت اصلاحات: ۱۳۹۴/۹/۲۲ تاریخ تصویب: ۱۳۹۵/۱۰/۷

بسیار موثر است و با توجه به نقش اینمی سلولی و سیستم ماکروفازی در ابتلا و کنترل این بیماری، مطالعه حاضر جهت بررسی شمارش افتراقی سلول در نمونه بال افراد مبتلا به سل و غیر سلی انجام شده است.

مواد و روش ها

این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی در سال ۱۳۹۳ بوده است. جمعیت آماری شامل بیماران مراجعه کننده به بخش داخلی بیمارستان علی ابن ایطالب(ع) زاهدان که به دلایل مختلف مورد بروونکوسکوبی قرار گرفتند، بود و با روش نمونه گیری در دسترس ۱۰۰ بیمار (دو گروه ۵۰ تابی) انتخاب شدند. معیارهای ورود به مطالعه شامل نیاز بیمار به بروونکوسکوبی و برداشت نمونه بال و نداشتن بیماری حاد همراه در زمان انجام مطالعه خصوصاً بیماری هایی که سیستم اینمی را تضعیف می کند مانند ایدز بود. معیارهای خروج از مطالعه نیز شامل عدم همکاری بیمار در ادامه مطالعه بوده است. نمونه لاواز بروونکو آلوئولار (بال) تهیه شده از جمعیت مورد مطالعه به دو قسم تقسیم و یک قسمت آن برای کشت میکروبی استفاده شد که در صورت مثبت شدن اسمری، بیمار دارای بیماری سل بود و در گروه مورد و در صورت منفی شدن اسمری، بیمار غیر سلی در نظر گرفته شد و در گروه شاهد قرار می گرفت و قسمت دیگر آن بعد از تصفیه توسط محلول فیکساتور فیکس شد و پس از ۲۴ ساعت سانتریفیوژ گردید. از سدیمان آن ۴ لام اسمری تهیه شد. سپس هر یک از چهار لام به یکی از روش های پاپانیکولا، گیمساء، H&E و زیل نلسون رنگ آمیزی شد. سه روش رنگ آمیزی اول برای شمارش افتراقی سلولی و رنگ آمیزی زیل نلسون جهت شناسایی باسیل سل استفاده شد. اطلاعات به دست آمده از نتیجه آزمایش اسمری بال همراه با اطلاعات دمو گرافیک در فرم اطلاعاتی ثبت گردید و اطلاعات با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آزمون های آماری T-test و Chei2 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سطح معنی داری <0.05 P در نظر گرفته شد.

شایع ترین فرم در گیری آن سل ریوی است که بیش از ۸۰ درصد موارد ابتلا به سل را تشکیل می دهد و شامل دو دسته سل ریوی اسمر مثبت و منفی می باشد. روش های تشخیصی متداول سل شامل آزمایش اسمر مستقیم خلط^(۳)، تشخیص سل براساس رادیو گرافی سینه و نتیجه تست توبرکولین پوستی^(۴)، تست خون به عنوان مثال T-SPOT و روش های میکروبیولوژی کلاسیک برای تشخیص سل ریوی^(۵)، تعیین توالی یک قطعه ژنتیکی DNA ویژه (PCR)^(۶) می باشد. اما با توجه به وقت گیر بودن روش های متداول تشخیص سل مانند روش کشت که ۳ تا ۸ هفته زمان لازم دارد و روش های پر هزینه مانند PCR، لازم است روش های دیگر مثل شمارش افتراقی سلول در نمونه لاواز بروونکو آلوئولار (بال) مورد استفاده و ارزیابی قرار گیرد. کنترل بیماری سل در بدن انسان به وضعیت اینمی فرد بستگی دارد^(۷). بررسی های مختلف در این زمینه، اهمیت توجه به سیستم اینمی را در ابتلا به این بیماری نشان داده است. در مطالعات انجام شده در این زمینه تنها تفاوت معنی دار در زیر جمعیت های لنفوسيتی در نسبت CD3+ باشد که بین افراد PPd مثبت و PPd منفی وجود داشت^(۸). همچنین در بررسی سلول های اینمی در خون محیطی بیماران اسمر مثبت ریوی که توسط امیدی و همکاران صورت پذیرفت، افزایش معنی داری در تعداد سلول های حامل CD19، CD16-56 و CD8 در بیماران نسبت به افراد نرمال و نسبت به افراد CD8 در بیماران عالیم بالینی دیده شد. این کاهش معنی دار درمار کر CD3 و CD4 در بیماران نسبت به افراد نرمال گزارش شده است^(۶). نسبت CD8+ در تمام بیماران مسلول بیش تراز حد نرمال جامعه بوده است^(۸). نوتوفیل ها سلول غالب در بیماران مبتلا به TB هستند^(۹).

نظر به این که سل همچنان به عنوان یکی از مشکلات عمدی بهداشتی در جهان امروزی خصوصاً در کشورهای در حال پیشرفت به شمار می آید، شناسایی میزان انواع سلول های اینمی بیماران مسلول اعم از تک هسته ای و چند هسته ای در کنترل و درمان این بیماری

یافته ها و بحث

نفوذ نوتروفیل و گرددش آن در بافت های آلوده ضروری است. نوتروفیل ها هم چنین در تنظیم سیستم ایمنی نقش دارند و زمانی که توسط مایکوباکتریوم توبرکلوزیس (MTB) تحریک می شوند، مجموعه ای از سیتوکین ها و کموکاین هایی که باعث جذب دیگر سلول های التهابی می شود را آزاد می کنند. علاوه بر این اثر متقابل نوتروفیل ها با MTB باعث آپوپتوز نوتروفیل ها می شود و در فاگوسیتوز نوتروفیل های آپوپتوز شده توسط ماکروفاژها قابلیت زنده ماندن داخل سلولی MTB کاهش می یابد^(۹). بسیاری از گزارش ها حضور نوتروفیل را در خلط بیماران مبتلا به عفونت مایکوباکتریومی نشان داده اند. در مطالعه زحمتکش و همکاران میانگین درصد لنفوسيت ۲۴/۵ درصد)، نوتروفیل (۶۸/۵ درصد) بود^(۷). در مطالعه Eum و همکاران نیز نتایج نشان داد که در نمونه خلط نوتروفیل ها فراوان تر از ماکروفاژها هستند در نتیجه نوتروفیل ها سلول غالب در بیماران مبتلا به TB هستند^(۹) که با مطالعه حاضر هم خوانی دارد. در مطالعه Swaminathan و همچنین مطالعه Rodrigues و همکاران CD8+ و CD4+ و CD3+ مارکر دارای نسبت سلول های مارکر کاهش در کودکان مبتلا به سل فعال نسبت به بقیه گروه ها معناداری را نشان داد و در گروه مبتلا به سل پس از شش ماه درمان مقدار CD8+ و CD4+ به حد نرمال رسید. این مطالعات اختلال کمی لنفوسيت های را در جریان بیماری سل به خوبی نشان داد^(۱۰، ۱۱).

براساس نتایج به دست آمده از این مطالعه سلول غالب در نمونه BAL بیماران سلی نوتروفیل می باشد و با افزایش شدت وجود باکتری میزان آن نیز بالاتر می رود. براساس نتایج مطالعه حاضر پیشنهاد می شود مطالعه ای با زیر رده های سلول های ایمنی در این زمینه انجام گردد.

سپاسگزاری

در پایان از تمامی همکاران ارجمندی که ما را در به ثمر رسانند این پژوهش یاری رسانده اند نهایت سپاس و امتنان را دارم.

در این مطالعه از ۱۰۰ بیمار، ۵۷ درصد مرد و ۴۳ درصد زن بودند. میانگین سنی بیماران $۱۴/۱ \pm ۶/۳$ سال بود. میانگین درصد لنفوسيت در بیماران مبتلا به سل $۲/۴ \pm ۲/۴$ و در بیماران غیر سلی $۱۲/۵ \pm ۵/۶$ درصد و میانگین پلاسماسل در بیماران مبتلا به سل $۰/۲ \pm ۰/۳$ و در بیماران غیر سلی $۱۱/۵ \pm ۵/۴$ بود که نشان دهنده بالا بودن سلول های تک هسته ای در بیماران غیر سلی است ($<0/۰۰۱$). میانگین درصد نوتروفیل در بیماران مبتلا به سل $۹/۶ \pm ۳/۵$ و در بیماران غیر سلی $۵/۷ \pm ۶/۶$ و در بیماران ائزوینوفیل در بیماران سلی $۱/۴ \pm ۲/۳$ و در بیماران غیر سلی $۶/۹ \pm ۷/۸$ بود که نشان می دهد میانگین سلول های نوتروفیل به طور معنی داری در بیماران سلی و ائزوینوفیل در بیماران غیر سلی بیشتر است ($<0/۰۰۱$). در ارتباط بین میزان وجود باکتری سل با شمارش افتراقی سلول در بیماران سلی با افزایش میزان شدت وجود باکتری سل، میزان درصد سلول نوتروفیلی نیز به طور معنی داری بالا رفت اما میزان سول های لنفوسيتی و ائزوینوفیل به طور معنی داری کاهش پیدا کرد و میزان درصد سلول های پلاسماسل تغییر محسوسی نداشت. حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت و منفی به ترتیب ۹۰ درصد، ۹۵/۷ درصد و ۹۰/۵ درصد به دست آمد. لذا یافته های مطالعه نشان می دهد که سلول غالب در نمونه بال بیماران سلی نوتروفیل می باشد به طوری که حدود ۹۶ درصد سلول های نمونه بال بیماران سلی را تشکیل داد. نوتروفیل ها اولین سلول های دفاعی هستند که به بافت های عفونی می روند و در آن جا نقش خود را به صورت گستره ای با از بین بردن عوامل بیماری زا از طریق مکانیسم های مختلف مانند تولید اکسیژن فعال، اکسیدان ها و آنزیم های پروتئولیتیک آزاد شده توسط دگرانولاسیون نیز ممکن است باعث تخریب سلول های مجاور و از بین رفتن بافت گردد. تناقض نوتروفیلی به آسیب بافتی با واسطه نوتروفیل های بدن گفته می شود. بنابراین تنظیم دقیق

References

1. Gholami A, Moosavi-Jahromi L. Clinical Manifestations of TB patients in Urmia city. J Urmia Nurse Midwifery Fac 2010; 7(4): 240-245 (Persian).
2. Ling Lin P, Rodgers M, Smith L, Bigbee M, Myers A, Bigbee C, et al. Quantitative Comparison of Active and Latent Tuberculosis in the Cynomolgus Macaque Model. Infect Immun 2009; 77(10): 4631-4642.
3. Gopinath K, Singh S. Urine as an adjunct specimen for the diagnosis of active pulmonary tuberculosis. Corresponding Editor: Sheldon Brown. USA: New York; 2008.
4. Geiter L. Ending Neglect: The elimination of Tuberculosis in the United States. 1st ed. Washington DC: National Academy Press; 2000.
5. Torrea G, Van de Perre P, Ouedraogo M, Zougbra A, Sawadogo A, Dingtoumda B, et al. PCR-based detection of the Mycobacterium tuberculosis complex in urine of HIV-infected and uninfected pulmonary and extrapulmonary tuberculosis patients in Burkina Faso. J Med Microbiol 2005; 54(Pt 1): 39-44.
6. Omidi S, Sarshar A, Kazem Nejad A, Abdolbaghi M, Masoud A, Khosravi F. Immunofenotyping of immune cells in the peripheral blood smear positive pulmonary tuberculosis patients before treatment in Rasht Tubercolos prevention center. 4th Congress of Microbiology. Isfahan; 1998.
7. Zahmatkesh M, Azimi G, Mirsaeidi M, The comparison of normal lymphocytes of patients with tuberculosis and society. Scientific-Research J Shahed Univ Med Sci (Daneshvar) 2008; 14(70): 30-44 (Persian).
8. Yamamoto S, Wada M, Toida I. Studies on the signofocance of CD4+ T lymphocytes in the development of TB. Kekkaku 1993; (1): 37-41.
9. Eum SY, Kong JH, Hong MS, Lee YJ, Kim JH, Hwang SH, et al. Neutrophils are the predominant infected phagocytic cells in the airways of patients with active pulmonary TB. Chest 2010; 137(1): 122-128.
10. Swaminathan S, Nandini KS, Hanna LE, Somu N, Narayanan PR, Barnes PF. T-lymphosytes subpopulations in tuberculosis. Indian Pediatr 2000; 37(5): 489-495.
11. Rodrigues DS, Medeiros EA, Weckx LY, Bonnez W, Salomão R, Kallas EG. Immunphenotypic of peripheral T lymphocytes in TB infection and disease. Clin Exp Immunol 2002; 128(1): 149-154.