

BRIEF REPORT

Determining Spatial Pattern of Tuberculosis by Geographical Information System in Guilan Province, 2005- 2011

Hamidreza Tabatabaei¹,

Jafar Hassan Zadeh²,

Fereshteh Younes Nia³

¹ Assistant Professor, Department of Epidemiology, School of Health, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

² Associate Professor, Department of Epidemiology, School of Health, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

³ MSc in Epidemiology, Guilan University of Medical Sciences, Guilan, Iran

(Received March 17, 2015 Accepted August 26, 2015)

Abstract

Background and purpose: Tuberculosis (TB) is created by *Mycobacterium tuberculosis*. Application of Geographical Information System (GIS) is of great benefit in understanding the geographical pattern of TB and strengthens its control programs. This study was performed in Guilan, Iran to determine the geographical pattern of TB in this province.

Materials and methods: The present ecological study was performed in 3027 TB patients in Guilan province in 2005-2011. Data was collected using complete enumeration and the maps were drawn by ArcGIS V.10.

Results: Among the cases 2152 (71.1%) had pulmonary tuberculosis and 875 patients (28.9%) had extra pulmonary tuberculosis. In the maps of county and villages, the highest average of 7-year incidence was observed in Siahkal.

Conclusion: In our study GIS maps indicate a specific pattern in incidence of tuberculosis.

Keywords: Tuberculosis, Geographic Information Systems, Guilan

J Mazandaran Univ Med Sci 2015; 25(129): 142-147 (Persian).

تعیین الگوی مکانی بیماری سل با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در استان گیلان ۱۳۸۴-۱۳۹۰

حیدر رضا طباطبایی^۱

جعفر حسن زاده^۲

فرشته یونس نیا^۳

چکیده

سابقه و هدف: عامل بیماری سل باکتری Mycobacterium Tuberculosis است) و استفاده از Geographic Information System (GIS) در چگونگی توزیع مکانی بیماری سل منجر به تقویت برنامه های کنترل می گردد. این مطالعه با هدف تعیین الگوی مکانی بروز بیماری سل در استان گیلان به انجام رسیده است.

مواد و روش ها: این مطالعه اکولوژیک روی ۳۰۲۷ بیمار مبتلا به سل در سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ در استان گیلان انجام شد. روش جمع آوری داده ها کل شماری بوده است و ترسیم نقشه ها با برنامه ArcGIS ver.10 انجام شد.

یافته ها: تعداد ۲۱۵۲ نفر (۷۱/۱ درصد) بیمار مبتلا به سل ریوی و ۸۷۵ نفر (۲۸/۹ درصد) بیمار مبتلا به سل خارج ریوی بودند. با ترسیم نقشه های شهرستانی و دهستانی بیماری سل، بیشترین متوسط بروز ۷ ساله در شهرستان سیاهکل مشاهده گردید.

استنتاج: نقشه های تهیه شده با GIS نشانگر آن است که بروز بیماری سل از الگوی خاصی پیروی می کنند.

واژه های کلیدی: سل، سیستم اطلاعات جغرافیایی، گیلان

مقدمه

متقابل که کشف آنها از طریق جدول بندی مشکل می باشد بسیار مناسب بوده و می تواند باعث تقویت برنامه های کنترل توپر کلوزیس گردد^(۱). در کشور ما از GIS در حوزه های مختلف علوم بهداشتی از جمله تهیه نقشه توزیع اختلالات کم کاری مادرزادی تیروئید، مرگ های ناشی از سرطان و مدیریت منابع سلامت استفاده شده است^(۲). با توجه به نقشه های جهانی تهیه شده در سال ۲۰۱۱ کشورهای آسیای میانه در شمال ایران دارای موارد بسیاری از مبتلایان به سل مقاوم به درمان

بیماری سل از دلایل عمده مرگ در دنیا است. عامل بیماری، باکتری Mycobacterium Tuberculosis است. سل علاوه بر تاثیر در بافت ریه (سل ریوی)، در بیشتر از یک سوم موارد سایر ارگان ها را نیز در گیر می کند که به آن سل خارج ریوی اطلاق می شود^(۳). از سال ۱۹۹۱ بیماری سل به عنوان اورژانس بهداشت جهانی معرفی شد و در همین راستا Geographical Information System (GIS) برای آنالیز داده های اپیدمیولوژیک و آشکار کردن روابط

Email: God.ANGEL3345@yahoo.com

مؤلف مسئول: فرشته یونس نیا - گیلان: شبکه بهداشت شهرستان رضوانشهر، دانشگاه علوم پزشکی گیلان


۱. استادیار، گروه اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران

۲. دانشیار، گروه اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران


۳. کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ایران

تاریخ دریافت: ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ تاریخ تصویب: ۱۳۹۴/۶/۱ تاریخ ارجاع جهت اصلاحات: ۱۳۹۴/۲/۵

دارد(۹). نقشه‌های تهیه شده با نرم‌افزار GIS توزیع مکانی بروز تجمعی سل ریوی اسمر مثبت را طی دوره ۷ ساله تحت بررسی در شهرستان‌ها (تصویر شماره ۱) و دهستان‌های (تصویر شماره ۲) استان گیلان نشان می‌دهد.



تصویر شماره ۱: متوسط بروز ۷ ساله سل ریوی اسمر مثبت در ۱۰۰۰۰ جمعیت شهرستان‌های استان گیلان ۱۳۸۴-۱۳۹۰



تصویر شماره ۲: متوسط بروز ۷ ساله سل ریوی اسمر مثبت در ۱۰۰۰۰ جمعیت دهستان‌های استان گیلان ۱۳۸۴-۱۳۹۰


می‌باشد(۵) این امر باعث شده است که بیماری سل هم‌چنان به عنوان یک مشکل جدی بهداشتی در کشور مانندی گردد. مطالعه حاضر با هدف تعیین الگوی بروز بیماری سل بر اساس مناطق جغرافیایی شهرستانی و دهستانی در استان گیلان انجام شد.

مواد و روش ها


این مطالعه اکولوژیک بر روی بیماران مبتلا به سل که در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ در همه شهرستان‌های استان گیلان توسط مراکز بهداشتی درمانی در نرم‌افزار TB register به ثبت رسیده‌اند، انجام شد. جمعیت مناطق براساس سرشماری سال ۱۳۸۵ و با استفاده از ضربی ۰/۸ رشد جمعیت برآورد گردید. روش جمع‌آوری داده‌ها کل شماری بوده و تجزیه و تحلیل اطلاعات (سن، جنس، نوع ابیلا و محل زندگی بیماران) با نرم‌افزار SPSS نسخه ۱۹ انجام شد. و ترسیم نقشه‌ها بر اساس محل زندگی بیماران با برنامه ArcGIS ver.10 انجام شد. در لایه‌بندی داده‌های مربوط به بروز از روش (Jenks) Natural Breaks استفاده گردید. در این روش طبقه‌بندی کردن داده‌ها، نقاط برش گروه‌ها بر اساس تغییر شدید در مقادیر متغیر تعیین می‌شود.

یافته‌ها و بحث

در میان ۳۰۲۷ بیمار در ۱۶ شهرستان و ۱۰۹ دهستان استان گیلان، گیلان، میانگین سنی و انحراف معیاریه ترتیب ۴۷/۰۲ و ۱۹/۵ بود که با مطالعه یزدانی چراتی در مازندران مطابقت دارد(۶). فراوانی بیماری در مردان (۵۷/۵ درصد) بیشتر از زنان (۴۲/۵ درصد) بوده که با مطالعه بیرانوند در ایلام مطابقت دارد(۷). به علاوه در مطالعه ما فراوانی بیماری در شهرها (۵۸/۶ درصد) بیشتر از روستاهای (۴۱/۴ درصد) بوده که با مطالعه غلامی در ارومیه مطابقت داشته(۸) و میزان بروز سل ریوی (۷۱/۱ درصد) بیشتر از سل خارج ریوی (۲۸/۹ درصد) بوده که با مطالعه خاصی در زابل مطابقت



نقشه شماره ۳: متوسط بروز ۷ ساله سل ریوی اسمر منفی در ۱۰۰۰۰ جمعیت شهرستانهای استان گیلان ۱۳۹۰-۱۳۸۴




نقشه شماره ۴: متوسط بروز ۷ ساله سل ریوی اسمر منفی در ۱۰۰۰۰ جمعیت دهستان های استان گیلان ۱۳۹۰-۱۳۸۴


همچنین مطالعه ما قادر به شناسایی مناطق نیازمند مراقبت ویژه در استان گیلان بوده که این نقاط با رنگهای تیره‌تر روی نقشه‌های شماره ۱ تا ۶ مشخص شده‌اند. در سطح شهرستانی، بالاترین میزان بروز در شهرستان سیاهکل با متوسط ۷ ساله ۱۸/۸ در ۱۰۰۰۰ جمعیت بوده (تصویر شماره ۱) و در سطح دهستانی، دهستان توکی (واقع در شهرستان سیاهکل) با ۵۰/۷ در ۱۰۰۰۰ جمعیت، دیده شد (تصویر شماره ۲). نتایج مطالعه Feske در امریکا نیز نشان داد که GIS ابزار قدرتمندی برای آگاهی یافتن از مناطقی که نیازمند مراقبت بیشتر بیماری هستند، می‌باشد (۱۰). در مطالعه بیرونی در استان ایلام ارتباط معنا دار آماری بین بروز بیماری و شرایط اقلیمی و نیز پوشش گیاهی منطقه تحت بررسی مشاهده گردید (۱۱). همچنین مطالعه Edziyyie نشان داد که الگوی مشخصی از بروز بیماری سل در بین مناطق مختلف از نظر توزیع ترازی دیده می‌شود (۱۲) که در مطالعه ما به دلیل محدودیت زمانی امکان بررسی مؤلفه‌های دموگرافیک وجود نداشت. نتایج این مطالعه نشان داد که بروز بیماری سل در استان گیلان طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ از الگوی مکانی خاصی پیروی می‌کند. بررسی غیر تصادفی بودن این الگویی تواند سوالاتی همچون نحوه فعالیت‌های بیماریابی، تشخیص و درمان و یا وجود تفاوت‌های اقلیمی و اجتماعی در مناطق مختلف استان را مطرح سازد که خود مستلزم انجام پژوهش‌های تحلیلی گسترده‌تری می‌باشد. همچنین توجه و مراقبت ویژه در مناطق دارای بروز بالاتر بیماری سل پیشنهاد می‌گردد.

سپاسگزاری

این مقاله از پژوهه پایان نامه خانم فرشته یونس نیا در مقطع کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی به شماره طرح ۶۴۶۳ - ۹۱ و با حمایت مالی دانشگاه علوم پزشکی شیراز به انجام رسیده است. نویسنده‌گان لازم می‌دانند مراتب سپاس‌گزاری خود را از همکاری صمیمانه گروه مبارزه با بیماری‌ها معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ابراز دارند.



نقشه شماره ۴: متوسط بروز ۷ ساله سل خارج ریوی در ۱۰۰۰۰ جمعیت دهستانهای استان گیلان ۱۳۹۰-۱۳۸۴



نقشه شماره ۵: متوسط بروز ۷ ساله سل خارج ریوی در ۱۰۰۰۰ جمعیت شهرستانهای استان گیلان ۱۳۹۰-۱۳۸۴

References

- Raviglione MC, O'brien RJ. Tuberculosis. In: Longo DL, (ed). HARRISON'S PRINCIPLES OF INTERNAL MEDICINE. 18th ed. New York: McGraw-Hill; 2012. p. 1340-1358.
- Partilla M. The Uses of Mapping in Improving Management and Outcomes Of Tuberculosis Control Programs: An Overview of Available Tools. Management Sciences for Health 2008; 1-18.
- Rouhani S, Hosseini SM. Creating a GIS based data bank of health facilities in Mazandaran province. Life Science Journal 2013; 10(9): 381-386.
- Osooli M, Haghdoost AA, Yarahmadi SH, Foruzanfar MH, Dini M, Holakouie Naieni K. Spatial Distribution of Congenital Hypothyroidism in Iran using Geographic Information System. Iranian Journal of Epidemiology 2009; 5(1): 1-8 (Persian).
- Yazdani Charati J, Kazemnegad A. Spatial Distribution of Tuberculosis in Mazandaran Province-Iran: Spatiotemporal Modeling. Tanaffos (National Research Institute of Tuberculosis and Lung Disease, Iran) 2010; 9(3): 15-21 (Persian).
- Yazdani Charati J, Kazemnejad A, Mosazadeh M. An epidemiological study on the reported cases of tuberculosis in Mazandaran (1999-2008) using spatial design. J Mazandaran Univ Med Sci 2009; 20(74): 9-16 (Persian).
- Beiranvand R, Ghalavandi Sh, Delpisheh A, Sayemiri K, Salmanzadeh Sh. Epidemiology of Tuberculosis in south-west of Iran: a brief report. Tehran Univ Med J 2014; 72(4): 263-267 (Persian).

8. Gholami A, Gharehaghaji R, Mousavi L, Sadaghiyanifar A. Epidemiologic Survey of Pulmonary Tuberculosis in Urmia city during 2004-2007. Knowledge & Health Journal 2009; 4(3): 19-23.
9. Khazaei HA, Rezaei N, Bagheri GR, Dankoub MA, Shahryari Kh, Tahai A, et al. Epidemiology of tuberculosis in the southeastern Iran. European Journal of Epidemiology 2005; 20(10): 879-883.
10. Feske ML, Teeter LD, Musser JM, Graviss EA. Including the third dimension: a spatial analysis of TB cases in Houston Harris County. Tuberculosis (Edinb) 2011; 91: 24-33.
11. Beiranvand R, Delpishe A, Solymani S, Sayehmiri K, Weysi K, Ghalavandi Sh. Assessment of Tuberculosis distribution by geographical information system in Khuzestan province: a brief report. Tehran Univ Med J (TUMJ) 2014; 72(6): 417-422 (Persian).
12. Edziyie R. Identification Of High Risk Tuberculosis Populations In Tarrant County Using Gis Techniques. [Dissertation]. Course Project for GEOG 5550 "Advanced GIS" Department Of Geography, University Of North Texas. NORTH TEXAS 2007.