

ORIGINAL ARTICLE

Assessment of Household Food Security and its Relationship with Some Pregnancy Complications

Elham Hojaji¹, Rosa Zavoshy²,
Mostafa Noroozi²,
Hasan Jahanihashemi³,
Neda Ezzedin¹

¹ MSc in Public Health Nutrition, Faculty of Health, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran

² Associate Professor, Department of Nutrition, Children Growth Research Center, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran

³ Associate Professor, Department of Biostatistics, Children Growth Research Center, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran

(Received August 6, 2014; Accepted April 5, 2015)

Abstract

Background and purpose: Household food insecurity is defined as limited or uncertain access to nutritionally adequate and safe food or limited ability to obtain foods in socially acceptable ways. Household food insecurity is associated with weight especially in women, so, this study aimed at determining the relationship between household food security status and gestational weight gain and weight-related complications in pregnancy.

Materials and methods: This cross-sectional study was conducted in 2014 in 700 mothers attending health centers in Tehran. Questionnaires of household food security US Department of Agriculture (USDA) and general information were used for data collection. Chi-square, independent sample T-test and logistic regression were also applied for statistical analysis.

Results: The results showed that the prevalence of food insecurity among mothers was 34.8%. There were 25.4% of mothers who were found with food insecurity without hunger. Among the subjects food insecurity with moderate hunger was observed in 8% and 1.4% were seen with food insecurity with severe hunger. Socio-economic survey showed that mothers with household food-insecurity were young housewives with lower education who had many children and low incomes. Based on the final logistic regression model and after adjusting the confounding variables, food insecurity was found associated with gestational diabetes mellitus ($OR= 2.12$, CI 1.36 - 3.33) and pregnancy induced hypertension ($OR= 1.64$, CI 1.01 to 2.67) but not associated with risk of proteinuria ($P>0.05$).

Conclusion: According to findings living in food insecure households may increase the risk of pregnancy complications.

Keywords: Household food insecurity, gestational diabetes mellitus, pregnancy-induced hypertension, proteinuria

J Mazandaran Univ Med Sci 2015; 25(123): 87-98 (Persian).

بررسی شیوع نامنی غذایی خانوار و ارتباط آن با برخی از عوارض دوران بارداری

الهام حججي^۱

رزا زاووشی^۲

مصطفی نوروزی^۲

حسن جهانی هاشمی^۳

ندا عزالدین^۱

چکیده

سابقه و هدف: نامنی غذایی به مفهوم دسترسی محدود یا نامطمئن به غذای کافی و سالم، یا توانایی محدود برای دستیابی به غذا از راههای قابل قبول اجتماعی است. هدف از این مطالعه بررسی امنیت غذایی خانوار و ارتباط آن با وزن‌گیری و عوارض مرتبط با وزن در طول دوران بارداری می‌باشد.

مواد و روش‌ها: این مطالعه مقطعی توصیفی - تحلیلی در سال ۱۳۹۳ روی ۷۰۰ مادر مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی تهران انجام گرفت. برای گردآوری اطلاعات از دو پرسشنامه امنیت غذایی U.S. Department of Agriculture (USDA) و اطلاعات عمومی استفاده شد. در تجزیه و تحلیل آماری نیز آزمون‌های مجذور کا، تی مستقل و رگرسیون لجستیک مورد استفاده قرار گرفتند.

یافته‌ها: در مطالعه حاضر شیوع نامنی غذایی ۳۴/۸ درصد بود. به طوری که ۲۵/۴ درصد از مادران دارای نامنی غذایی بدون گرسنگی، ۸ درصد دارای نامنی غذایی با گرسنگی متوسط و ۱/۴ درصد دارای نامنی غذایی با گرسنگی شدید بودند. بررسی اطلاعات اجتماعی - اقتصادی نشان داد که مادران در خانوارهای نامن غذایی دارای تحصیلات پایین‌تر و خانه‌دار بودند، همچنین دارای سن کم و تعداد فرزندان بیشتری بودند و درآمد کمتری داشتند. بر اساس مدل نهایی رگرسیون لجستیک و پس از تعدیل عوامل مخدوش کننده نیز مشخص گردید که نامنی غذایی با ابتلا به دیابت بارداری (OR=۱/۶۴، CI: ۱/۳۶-۳/۳۳) (OR=۲/۱۲، CI: ۱/۱۰-۲/۶۷)، فشارخون بارداری (OR=۱/۶۴، CI: ۱/۱۰-۲/۶۷) ارتباط دارد. در حالی که نامنی غذایی با ابتلا به پروتئینوری در طول دوران بارداری ارتباط معنی داری نداشت ($p>0.05$).

استنتاج: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که زندگی در خانوارهای نامن غذایی می‌تواند خطر ابتلا به عوارض بارداری را افزایش دهد.

واژه‌های کلیدی: نامنی غذایی خانوار، دیابت بارداری، فشارخون بارداری، پروتئینوری

مقدمه

نامنی غذایی به مفهوم دسترسی محدود یا نامطمئن به غذای کافی و سالم از نظر تغذیه‌ای، یا توانایی محدود برای دستیابی به غذا از راههای قابل قبول اجتماعی است(۱). عوامل مختلفی ممکن است روی نامنی غذایی موثر باشند که عبارتند از سن، تحصیلات سرپرست خانوار، وضعیت اقتصادی، از دست دادن شغل، نداشتن شغل ثابت و پسانداز، تک‌سرپرستی، قومیت، افزایش بعد خانوار و از دست دادن کمک‌های غذایی(۲،۳).

E-mail: mnorooyi@qums.ac.ir

مؤلف مسئول: مصطفی نوروزی - قزوین: دانشگاه علوم پزشکی قزوین، مرکز تحقیقات رشد کودکان

۱. کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

۲. دانشیار، گروه علوم تغذیه، مرکز تحقیقات رشد کودکان، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

۳. دانشیار، گروه آمار زیستی، مرکز تحقیقات رشد کودکان، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

تاریخ دریافت: ۱۳۹۳/۵/۱۸ تاریخ ارجاع جهت اصلاحات: ۱۳۹۳/۵/۲۲ تاریخ تصویب: ۱۳۹۴/۱/۱۵

مواد و روش‌ها

این مطالعه مقطعی در سال ۱۳۹۳ روی ۷۰۰ مادر مراجعه کننده به ۱۰ مرکز بهداشتی-درمانی، تحت پوشش شمال غرب تهران انجام گرفت.

حجم نمونه

جامعه مورد بررسی در این مطالعه مادرانی بودند که تا سه ماه بعد از زایمان مراجعه کرده بودند و سابقه ابتلا به ترومای، تب یا شواهدی از عفونت، بیماری‌های روماتولوژیک، نقرس، دیابت مزمن، پرفشاری خون، بیماری‌های قلبی-عروقی، کلیوی و کبدی از قبل از بارداری نداشتند. همچنین نمونه‌ها از هر درمانگاه بر حسب جمعیت تحت پوشش و تعداد مراجعان آن درمانگاه و به روش طبقه‌ای انتخاب گردیدند. به صورتی که هر درمانگاه به صورت یک طبقه درنظر گرفته شد و مراجعيینی که آماده همکاری در مطالعه بودند به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. با توجه به نتایج به دست آمده از مطالعات قبلی^(۱۷)، شیوع ۲۳ درصد نا امنی غذایی در نظر گرفته شد و بر اساس فرمول $N = \frac{(Z_{\alpha/2} + Z_{1-\beta})^2 p(1-p)}{d^2}$ و با در نظر گرفتن $\alpha = 0.05$ ، $\beta = 0.2$ و $d = 0.05$ تعداد نمونه ۷۰۰ نفر تعیین گردید.

ارزیابی امنیت غذایی

جهت بررسی امنیت غذایی در نمونه‌ها از پرسش نامه استاندارد امنیت غذایی USDA استفاده شد. این پرسشنامه ۱۸ سوالی که وضعیت امنیت غذایی را در ۱۲ ماه گذشته بررسی می‌کند به صورت حضوری، چهره به چهره و با رضایت کامل مادران تکمیل گردید. پرسشنامه مذکور یکی از پرسشنامه‌های طرح شده توسط وزارت کشاورزی ایالت متحده امریکا است، که در سال ۱۹۹۵ توسط این وزارت مورد سنجش قرار گرفته و به عنوان یک پرسشنامه معتبر برای مطالعات اپیدمیولوژیک معروفی شده است. اعتبار این پرسشنامه

ارزیابی امنیت غذایی به خصوص در میان زنان اهمیت بیشتری دارد زیرا ناامنی غذایی خانوار با کاهش دریافت ریزمغذی‌ها^(۴,۵)، میوه و سبزیجات در میان زنان در سنین باروری ارتباط دارد و چندین مطالعه ارتباط میان ناامنی غذایی خانوار با اضافه وزن به خصوص در زنان را تایید کرده‌اند^(۶,۷). به طوری که اضافه وزن قبل از بارداری با دریافت نامناسب غذایی^(۹,۸)، وزن گیری بیش از حد^(۱۰)، دیابت ملتیوس^(۱۱)، فشارخون بارداری^(۱۲) و پره اکلامسی^(۱۳) مرتبط می‌باشد. مشخص شده است که بروز اختلالات فشارخون و دیابت در زنانی که وضعیت اقتصادی مناسبی ندارند، شایع‌تر می‌باشد. به طوری که در مطالعه‌ای که روی ۵۰۹۴ فرد فقیر ۱۸ تا ۶۵ ساله انجام شد، نشان داد که بین ناامنی غذایی و ابتلا به بیماری‌های قلبی-عروقی ارتباط معنی داری وجود دارد^(۱۴). همچنین مشاهده شده است که در سطوح متفاوت اجتماعی و اقتصادی شیوع دیابت و چاقی در میان افراد کم درآمد و زنان با تحصیلات پایین، بیش‌تر می‌باشد^(۱۵). در حالی که در مطالعه‌ای دیگر که روی ارتباط عوارض دوران بارداری و ناامنی غذایی صورت گرفت تنها میان ناامنی غذایی و دیابت بارداری ارتباط دیده شد ولی با فشارخون بارداری ارتباطی دیده نشد^(۱۶).

از آنجایی که زنان باردار جز گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه بوده و عدم امنیت غذایی آنان ممکن است باعث ایجاد عوارض در دوران بارداری شود و با توجه به محدود بودن مطالعات در سطح جهان و عدم انجام مطالعه در ایران روی ارتباط عوارض دوران بارداری و ناامنی غذایی خانوار طراحی مطالعه در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد. بنابراین هدف از این مطالعه بررسی امنیت غذایی خانوار و ارتباط آن با برخی از عوارض دوره بارداری در مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شمال غرب شهر تهران می‌باشد.

ارزیابی شاخص‌های تن سنجی و عوارض دوره بارداری
در مادران

در این مطالعه اطلاعات مربوط به وزن قبل و آخر بارداری از طریق پرسش نامه از خود مادران پرسیده شد. قد مادران نیز به صورت ایستاده و بدون کفش توسط قدسنج seca آلمان با دقت ۱/۰ سانتی متر اندازه گرفته شد. سپس (BMI) Body mass index قبل از بارداری مادران از طریق تقسیم وزن(کیلو گرم) بر مجنوز قد (متر) محاسبه گردید. وزن گیری دوران بارداری نیز به صورت تفاضل وزن فرد قبل از بارداری و وزن فرد در انتهای بارداری محاسبه گردید و بر طبق معیار (IOM) Institute of medicine مورد قضاوت قرار گرفت. میزان توصیه شده افزایش وزن در طول دوران بارداری بر حسب BMI قبل از بارداری، طبق معیار IOM (۲۱) ارائه شده است به طوری که طبق این معیار زنان باردار با نمایه توده بدنی کمتر از ۱۸/۵ (گروه لاغر) باید در طول بارداری ۱۲/۷ تا ۱۸/۱ کیلو گرم، زنان دارای نمایه توده بدنی ۲۴/۹۹ (گروه طبیعی)، ۱۱/۳ تا ۱۶ کیلو گرم، زنان با نمایه توده بدنی ۲۵-۲۹/۹۹ (گروه اضافه وزن)، ۷ تا ۱۱/۳ کیلو گرم و زنان با نمایه توده بدنی بیشتر از ۳۰ (گروه چاق)، ۵ تا ۹ کیلو گرم اضافه نمایند. اطلاعات مربوط به عوارض بارداری از جمله ابتلاء به دیابت، فشارخون و وزن گیری در طول دوران بارداری به طور مستقیم از خود مادران از طریق پرسش نامه به صورت داشتن و یا نداشتن این عوارض در طول دوران بارداری پرسیده شد. مادرانی که از ابتلاء به این عوارض در دوران بارداری آگاهی نداشتند اطلاعات آنها از طریق پرونده موجود در مراکز بهداشتی کنترل گردید. در این مطالعه فشارخون بالاتر از ۱۴۰/۹۰ میلی متر جیوه با و یا بدون پرتوئینوری بعد از هفته ۲۰ بارداری به عنوان اختلال فشارخون در بارداری (۲۲) و غیر طبیعی بودن آزمون تحمل گلوکز خوراکی بین هفتاهای ۲۴ تا ۲۸ بارداری به عنوان ملاک دیابت بارداری در نظر گرفته شد (۲۳).

در مطالعه رفیعی و همکاران که روی خانوارهای شهر اصفهان انجام گرفته بود مورد تایید قرار گرفته است (۱۸) و در مطالعه درستی و همکاران (۱۹) نیز که روی خانوارهای شهر شیراز انجام گرفت، پرسش نامه مذکور تعديل شد. از گرفته است. پرسش نامه مورد استفاده در این طرح نیز از مطالعه شیراز اقتباس شده است. دقت و درستی پرسشنامه ترجمه شده در یک مطالعه پایلوت مورد بررسی و تایید قرار گرفت (۲۰). به دین این صورت که برای بررسی پایایی سوالات، پرسش نامه مذکور در ۱۰۰ خانوار از شهر دزفول تکمیل گردید. همین سوالات پس از ۲۰ روز مجدداً از مادران پرسیده شد. و نتایج با ضربیب آلفای کرونباخ ۰/۷۲ مورد تایید قرار گرفت. امتیازدهی به این پرسش نامه نیز به این صورت در نظر گرفته شد: ابتدا به پاسخ‌های مثبت یعنی پاسخ‌های بلی، "اغلب اوقات درست است"، "بعضی اوقات درست است"، "تقریباً هر ماه و تعدادی از ماه‌ها" کد یک و به پاسخ‌های منفی یعنی پاسخ‌های خیر و " فقط یک یا دو ماه" و سوالات بدون پاسخ کد صفر تعلق گرفت. سپس کدها جمع شده و وضعیت امنیت غذایی مشخص گردید. مادران مورد بررسی بر اساس امتیاز این پرسش نامه به چهار گرسنگی، نامن غذایی با گرسنگی متوسط و نامن غذایی با گرسنگی شدید. سپس سه گروه نامن غذایی بدون گرسنگی، نامن غذایی با گرسنگی متوسط و نامن غذایی با گرسنگی شدید ترکیب شدند و گروه نامن غذایی را تشکیل دادند. جدول شماره ۱ طبقه‌بندی وضعیت امنیت غذایی خانوار را بر اساس امتیاز نشان می‌دهد:

جدول شماره ۱: امتیازبندی پرسشنامه امنیت غذایی

درجات نامن غذایی	کد (امتیاز کل: ۱۰)	تعداد پاسخ مثبت		
		خانوار دارای فرزند زیر ۱۸ سال	خانوار فاقد فرزند زیر ۱۸ سال	وضعیت امنیت غذایی
امن	۰-۲	۰	۰	نامن
نامن بدون گرسنگی	۳-۵	۱	۳-۷	نامن با گرسنگی
نامن با گرسنگی متوسط	۶-۸	۲	۸-۱۲	نامن با گرسنگی شدید
نامن با گرسنگی شدید	۹-۱۰	۳	۱۳-۱۸	

یافته ها

در این مطالعه ۷۰۰ خانوار بررسی شدند که شیوع ناامنی غذایی در آنها ۳۴/۸ درصد بود به طوری که ۲۵/۴ درصد خانوارها دارای نامنی غذایی بدون گرسنگی، ۸ درصد دارای ناامنی غذایی با گرسنگی متوسط و ۱/۴ درصد دارای ناامنی غذایی با گرسنگی شدید بودند. برای تعیین ارتباط بین عوارض دوره بارداری با ناامنی غذایی سه گروه ناامنی غذایی در هم ادغام شدند و گروه ناامن غذایی را تشکیل دادند. بررسی اطلاعات اجتماعی-اقتصادی نشان داد که در مقایسه با خانوارهای امن غذایی، مادران در خانوارهای ناامن غذایی به طور معنی‌داری دارای تحصیلات پایین‌تر و خانه دار بودند، هم‌چنین دارای سن کم و تعداد فرزندان بیشتر بودند و درآمد کمتری داشتند ($p < 0.05$)، علاوه بر این قومیت‌های غیر فارس بیشترین نامنی غذایی را داشتند (جدول شماره ۲). یافته‌های به دست آمده از آزمون کای دو نشان داد که بین BMI قبل از بارداری و نامنی غذایی ارتباط معنی‌دار وجود دارد. به طوری که نسبت به گروه امن غذایی، درصد اضافه وزن و چاقی در گروه ناامن غذایی بیشتر بود ($p < 0.05$). در مقایسه میزان وزن گیری مادران در طول دوران بارداری با مقدار توصیه شده IOM نیز مشخص شد که بین وزن گیری در دوران بارداری و نامنی غذایی ارتباط معنی‌دار وجود دارد. به طوری که نسبت به گروه امن غذایی، درصد وزنگیری بیش از حد در گروه ناامن غذایی بیشتر بود ($p = 0.10$).

در این مطالعه عوارض مختلفی از جمله دیابت بارداری، فشارخون بارداری و پروتئینوری در نظر گرفته شد و ارتباط آنها با نامنی غذایی سنجیده شد. به طوری که با استفاده از آزمون کا اسکوور مشخص شد بین نامنی غذایی و ابیلا به دیابت و فشارخون در دوران بارداری ارتباط معنی‌دار وجود دارد ($p < 0.05$). در حالی که ارتباطی میان نامنی غذایی و پروتئینوری دیده نشد ($p > 0.05$).

ارزیابی وضعیت اجتماعی-اقتصادی

اطلاعات مربوط به وضعیت اجتماعی اقتصادی مادران و خانوار آنها از طریق پرسشنامه اطلاعات عمومی گردآوری شد. این اطلاعات عبارت بودند از: سطح تحصیلات، شغل و سن مادر، وضعیت اقتصادی خانوار، تعداد فرزندان و قومیت. تحصیلات به سطوح بی‌سواد و ابتدایی، راهنمایی و متوسطه، دیپلم و فوق‌دیپلم، لیسانس و بالاتر دسته‌بندی شد. وضعیت اشتغال نیز به این شکل تقسیم شد: خانه دار، فرهنگی (دیبر، معلم، استاد)، آزاد (کارگر، کشاورز، خدماتی)، نظامی، کارمند و بازنیسته. از آنجا که تعداد کمی از افراد پاسخ‌دهنده در طبقه‌های مختلف شغلی قرار داشتند، وضعیت اشتغال افراد پاسخ‌دهنده به دو طبقه شاغل و غیر شاغل تقسیم شد. وضعیت اقتصادی نیز به صورت میزان متوسط درآمد خانوار پرسیده شد. قومیت نیز در قالب فارس، ترک، کرد، لر و سایر قومیت‌ها از مادران پرسیده شد.

تجزیه و تحلیل آماری

با به کارگیری نرم‌افزار SPSS نسخه ۱۶، آزمون کای دو برای متغیرهای کیفی (از جمله شغل و تحصیلات مادر، BMI قبل از بارداری و کفایت وزن گیری در دوران بارداری)، آزمون تی مستقل برای متغیرهای کمی (از جمله سن مادر، تعداد فرزندان و درآمد خانوار) و آزمون رگرسیون لجستیک برای بررسی ارتباط نامنی غذایی با دیابت، فشارخون بارداری و میزان وزن گیری در طول دوران بارداری مورد استفاده قرار گرفت. مدل‌های نهایی رگرسیون بر اساس BMI قبل از بارداری تعديل شدند. هم‌چنین وزن گیری در طول بارداری به عنوان عامل مخدوش‌کننده برای عوارض بارداری در نظر گرفته نشد زیرا در این مطالعه وزن گیری در کل بارداری درنظر گرفته شده است درحالی که وزن گیری تا قبل از زمان تشخیص لازم می‌باشد. نیز به عنوان سطح معنی‌دار در نظر گرفته شد.

جدول شماره ۲: توزیع افراد بر حسب مشخصات اجتماعی-اقتصادی، عوارض بارداری، وزن گیری در طول بارداری، نمایه توده بدنی و وضعیت امنیت غذایی

متغیرهای کمی	کل شرکت کنندگان (۷۰۰)	امن غذایی (۴۵۶)	نا امن غذایی (۲۴۴)	سطح معنی داری *
				Mean±SD
سن مادر	۳۰±۴/۵	۳۰±۴/۱	۲۹/۰±۴/۸	.۰/۰۰۰
نعداد فرزندان	۱/۵±۰/۶	۱/۴±۰/۶	۱/۶±۰/۷	.۰/۰۰۳
درآمد خانوار	۸۹۶۰۶/۷±۱۴۸۹۴/۰/۸	۸۹۸۲۶/۶±۱۸۰۸۸/۱/۷	۴۹۹۵۹/۹±۹۴۲۴/۶/۲	.۰/۰۰۰
متغیرهای کیفی	(درصد)	تعداد	سطح معنی داری **	
شغل مادر	خانه دار	(۷۲/۹)۵۱۰	(۸۹/۳)۲۱۸	.۰/۰۰۰
	شاغل	(۲۷/۱)۱۹۰	(۱۰/۷)۶۴	
تحصیلات مادر	بی سواد و ابتدایی	(۵/۴)۳۸	(۱۴/۳)۳۵	
	راهنما و متوسطه	(۳/۳)۲۴	(۸/۷)۲۱	
	دیپلم و فوق دیپلم	(۳/۵/۹)۲۵۱	(۴۵/۱)۱۱۰	.۰/۰۰۰
	لیسانس و بالاتر	(۵۵/۳)۳۸۷	(۳۲/۰)۷۸	
قومیت	فارس	(۶۲/۳)۴۳۶	(۵۰/۰)۱۲۲	
	ترک	(۲۵/۰)۱۷۵	(۳۰/۳)۷۴	
	کرد	(۵/۶)۳۹	(۹/۴)۴۳	.۰/۰۰۰
	لر	(۳/۰)۲۱	(۴/۱)۱۰	
	سایر	(۴/۱)۴۹	(۶/۱)۱۵	
سیگار	خیر	(۹۹/۱)۶۹۴	(۹۸/۸)۲۴۱	
	بلی	(۰/۹)۶	(۱/۲)۳	.۰/۰۰۴
دیابت بارداری	خیر	(۸۷/۰)۶۰۹	(۷۴/۲)۱۹۷	
	بلی	(۱۳/۰)۹۱	(۱۹/۳)۴۷	.۰/۰۰۰
فشارخون بارداری	خیر	(۸۹/۳)۶۲۵	(۸۵/۷)۲۰۹	.۰/۰۲۳
	بلی	(۱۰/۷)۷۵	(۱۴/۳)۳۵	
پروتئینوری در بارداری	خیر	(۹۳/۹)۶۵۷	(۹۲/۶)۲۲۶	.۰/۰۱۳
	بلی	(۶/۱)۴۳	(۷/۴)۱۸	
وزن گیری ناکافی	وزن گیری کافی	(۱۷/۴)۱۲۲	(۱۸/۰)۴۴	
	وزن گیری بیش از حد	(۳۵/۶)۳۴۹	(۲۸/۳)۶۹	.۰/۰۱۰
BMI مادران قبل از بارداری	(کم وزن)	(۱۸/۵)>	(۱۷/۰)۷۸	
	(طبیعی)	(۵/۷/۳)۴۰۱	(۳۹/۵)۱۸۰	.۰/۰۲۸
	(اضافه وزن)	(۳۰/۷)۲۱۵	(۵۳/۷)۱۳۱	
	(چاق)	(۷/۹)۵۵	(۹/۴)۲۳	

سطح معنی داری * = با استفاده از آزمون تی مستقل محاسبه شده است.

سطح معنی داری ** = با استفاده از آزمون کا اسکوور محاسبه شده است.

جدول شماره ۳: مدل نهایی رگرسیون لجستیک برای بررسی ارتباط نامنی غذایی خانوار با ابتلاء به دیابت، فشارخون در طول دوره بارداری

متغیرهای مستقل	OR (95%CI)	متغیرهای مستقل
دیابت بارداری	۲/۱۲ (۱/۳۶-۳/۳۳)	OR= odd ratio, CI= confidence interval
شارخون بارداری	۱/۶۵ (۱/۰۱-۲/۶۷)	

مدل بر اساس عامل مخدوش کننده، BMI قبل از بارداری تعديل شده است.
OR= odd ratio, CI= confidence interval

بحث

در این مطالعه شیوع نامنی غذایی در خانوارهای مورد بررسی ۳۴/۸ درصد بود شیوع نامنی غذایی با

از بین فاکتورهای مستقل مانند سن، تحصیلات و شغل مادر، BMI قبل از بارداری، درآمد خانوار و تعداد فرزندان و قومیت که با نامنی غذایی ارتباط داشتند، تنها BMI قبل از بارداری با دیابت و فشارخون بارداری ارتباط داشت ($p<0.05$) و همراه با نامنی غذایی در مدل نهایی رگرسیون لجستیک وارد شدند و مشخص شد که نسبت به گروه امن غذایی، گروه نامن غذایی، به ترتیب ۲/۱ برابر ($OR=2/12, CI: 1/36-3/33$) و ۱/۶ ($OR=1/6, CI: 1/0-1-2/67$) برابر ($OR=1/64, CI: 1/0-1-2/67$) شانس ابتلاء بالاتری به دیابت و فشارخون بارداری داشتند (جدول شماره ۳).

اقتصادی و درآمد بهتر فراهم نماید که در نهایت منجر به دسترسی بیشتر خانواده به مواد غذایی با کیفیت بالا می‌گردد.

در این مطالعه میان شغل مادر و نامنی غذایی خانوار ارتباط معنی داری وجود داشت و بیشتر مادران در خانوارهای نامن غذایی خانه دار بودند. این نتایج با سایر مطالعات از جمله مطالعه Shariff (۲۶) در مالزی هم سویی دارد، که علت این امر است که افراد بدون شغل ثابت معمولاً دارای درآمد ناکافی برای خرید مواد غذایی با ارزش بالا هستند. در این مطالعه میان درآمد خانوار و نامنی غذایی خانوار ارتباط معنی داری مشاهده شد. به طوری که این ارتباط در سایر مطالعات نیز مورد تایید قرار گرفته است (۱۴، ۱۶). در واقع به دنبال کاوش میزان درآمد، هزینه‌های خوراک نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد و موجب نامنی غذایی می‌گردد. در این مطالعه میان تعداد فرزندان و نامنی غذایی خانوار ارتباط معنی داری وجود داشت. همسو با این نتایج مطالعه درستی و lararia نیز رابطه معنی داری میان نامنی غذایی و تعداد فرزندان دیده شد (۱۶). در واقع با افزایش تعداد فرزندان میزان هزینه‌ها خانوار و دسترسی به غذا افزایش می‌یابد که در نتیجه افزایش تعداد و حجم غذا با توجه به درآمد کم در این گونه خانوارها، نامنی غذایی پدیدار می‌گردد. در این مطالعه میان قومیت و نامنی غذایی خانوار ارتباط معنی داری وجود داشت و نامنی غذایی در خانوارهای غیر فارس بیشتر بود. در مطالعه حکیم و همکاران (۲۷) این ارتباط تایید گردید. علت این ارتباط به این صورت قابل توجیه است که معمولاً متوسط درآمد برخی از قومیت‌ها به علت عدم آشنایی با لهجه و فرهنگ آن منطقه کمتر است و درآمد نیز عامل تعیین کننده مهم نامنی غذایی است.

همچنین در این مطالعه مشخص شد که نامنی غذایی خانوار می‌تواند به عنوان یک عامل خطر مستقل در ابتلاء به دیابت، فشارخون در طول دوران بارداری محسوب شود. چندین مطالعه ارتباط بین دیابت،

توجه به جمعیت‌های مورد بررسی متفاوت است. در مطالعه رامش و همکاران (۱۹)، که با هدف تعیین شیوع نامنی غذایی برخی عوامل مرتبط با آن در خانوارهای شهر شیراز انجام شد، میزان شیوع نامنی غذایی در خانوارهای مورد مطالعه ۴۴ درصد بود. در مطالعه پایاب و همکاران (۲۴) نیز که با هدف بررسی عوامل مؤثر بر نامنی غذایی در شهرستان ری، بروی ۴۳۰ مادر دارای کودک دبستانی در سال ۱۳۸۹ انجام شد، میزان شیوع نامنی غذایی در ۵۰/۲ درصد بود. علت تفاوت شیوع در مطالعات مختلف به نظر می‌رسد ناشی از نوع جمعیت مورد بررسی در خانوارهای شهری و روستایی می‌باشد به طوری که شیوع نامنی غذایی در خانوارهای روستایی و ساکن شهرهای کوچک بالاتر از خانوارهای شهری و ساکن شهرهای بزرگ می‌باشد. در مطالعه ما ارتباط معکوس و معنی دار میان نامنی غذایی خانوار و سن مادران دیده شد. در مطالعه‌ای که توسط درستی و همکاران انجام شد ارتباطی میان سن و وضعیت نامنی غذایی دیده نشد (۱۹). اما محمدی نصرآبادی در مطالعه خود بین نامنی غذایی و سن ارتباط مثبت و معنی داری مشاهده کرد (۲۵). در مطالعه lararia و همکاران، بین نامنی غذایی و سن ارتباط معکوس گزارش شد (۱۶). که علت این ارتباط را می‌توان به این امر اشاره داشت که مادران با سن کم معمولاً از سطح تحصیلات و جایگاه شغلی پایین‌تری برخورداری می‌باشند و توانایی کمی برای خرید مواد غذایی خواهند داشت. در این مطالعه نشان داده شد که مادران در خانوارهای نامن غذایی به طور معنی داری تحصیلات پایین‌تری از مادران در خانوارهای امن غذایی داشتند که با نتایج مطالعه Seligman و همکاران (۱۴) که در آمریکا انجام گرفت همسو است، علت این امر به این صورت قابل توجیه است که با افزایش سطح تحصیلات مادران، آگاهی و عملکرد تغذیه‌ای مناسب‌تری در مورد انتخاب گروههای غذایی خواهند داشت. همچنین سطح تحصیلات بالاتر، می‌تواند زمینه را برای شغل بهتر در نتیجه وضعیت

در مطالعه ما نیز بالا بودن BMI قبل از بارداری از عوامل خطر مستقل در ابتلا به دیابت و فشارخون بارداری تعیین گردید. در واقع دیده شده است که خانوارهای نامن غذایی، بیشتر از غذاهای ارزان استفاده می‌کنند که به علت وجود غلات تصفیه شده، شکر و چربی‌های اضافه شده در غذا، دارای ارزش کیفی پایین و کالری بالا می‌باشد و می‌تواند موجب چاقی در این افراد گردد^(۴۰،۴۱). در خصوص ارتباط نامنی غذایی خانوار و فشارخون و دیابت بارداری لازم به ذکر می‌باشد که مصرف میوه، سبزی، گوشت و لبنت‌ها در خانوارهای نامن غذایی معمولاً پایین‌تر از خانوارهای امن غذایی است^(۳۱). به‌طوری که پایین بودن محتوای پتاسیم^(۳۲) در این گونه رژیم‌های غذایی ممکن است با ابتلا به فشارخون مرتبط باشد^(۳۳). هم‌چنین این فرضیه مطرح شده است که کاهش دریافت کلسیم توسط خانوارهای نامن غذایی^(۳۲) خطر ابتلا به فشارخون را در زنان باردار افزایش می‌دهد^(۳۴). هم‌چنین جایگزین شدن کربوهیدرات‌های ساده با میوه و سبزی در رژیم غذایی افراد با نامنی غذایی نیز موجب افزایش بارگلایسمی در رژیم‌شان شده و ممکن است خطر ابتلا به دیابت را در آن‌ها افزایش دهد^(۳۵،۳۶). از دیگر علل احتمالی در مورد ارتباط نامن غذایی خانوار با ابتلا به دیابت، فشارخون می‌توان به استرس‌های روانی و عاطفی اشاره کرد^(۳۷،۳۸). نشان داده شده است که خانوارهای نامن غذایی سطوح بالاتری از استرس و نگرانی را گزارش می‌کنند^(۳۹). در مطالعه Laraia و همکاران نیز دیده شده است، زنانی که در زندگی خود دارای استرس بیش از حد هستند و وضعیت روحی و روانی ضعیفی دارند، به احتمال بیشتر شرایط نامن غذایی را در دوران بارداری خود تجربه می‌کنند^(۴۰). در یک مطالعه دیگر بیان شده است که سطوح بالای استرس می‌تواند به عنوان یک عامل خطر بالقوه در ابتلا به دیابت مطرح می‌باشد. به‌طوری که افزایش کورتیزول ناشی از استرس می‌تواند چاقی به خصوص چاقی

فشارخون و چاقی را با نامنی غذایی نشان داده اما مطالعات کمی در خصوص بررسی آن‌ها در طول بارداری انجام گرفته است و اطلاعات متناقض در این خصوص وجود دارد. در مطالعه Seligman و همکاران^(۴۱) که در خصوص ارتباط نامنی غذایی با بیماری‌های مزمن در افراد بزرگسال کم درآمد انجام گرفت، نشان داده شد که با استفاده از اطلاعات کلینیکی، نامنی غذایی با فشارخون و دیابت ارتباط داشت^(۱۴). در مطالعه‌ای دیگر نیز نامنی غذایی با دیابت در بین افراد بزرگسال ارتباط معنی‌داری داشت^(۲۸). در حالی که در مطالعه Laraia و همکاران که با هدف شناسایی ارتباط بین نامنی غذایی خانوار و عوارض ناشی از بارداری انجام شد، مشخص گردید که از بین عوارض بارداری تنها دیابت با نامنی غذایی خانوار ارتباط معنی‌داری دارد و با فشارخون بارداری و آنمی ارتباطی دیده نشد^(۱۶). علت تفاوت نتیجه‌ها در مطالعات مختلف به دو دلیل می‌تواند باشد: ۱- متفاوت بودن شیوه عوارض بارداری در جمعیت‌های مختلف - ۲- متفاوت بودن سطوح اقتصادی، اجتماعی در جمعیت‌های مختلف است که از عوامل تاثیر گذار بر نامنی غذایی خانوار و عوارض دوران بارداری می‌باشدند. عوامل مختلفی ممکن است در ابتلا به دیابت و فشارخون بارداری دخیل باشند که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهیم کرد. در واقع اضافه وزن قبل از بارداری و همچنین افزایش بیش از حد وزن در طول دوران بارداری می‌تواند به عنوان یک علت در ارتباط نامنی غذایی خانوار با ابتلا به دیابت، فشارخون در طول Chen دوران بارداری مطرح باشد. در مطالعه‌ای که توسط و همکاران در سال ۲۰۱۰ روی ۲۵۸۶ زن باردار انجام شد، نشان داده شد که خطر ابتلا به فشارخون بارداری، پرهاکلامپسی و دیابت دوران بارداری در افراد دارای اضافه وزن و چاقی در قبل از بارداری بیشتر بود و مشخص شد که بالا بودن نمایه توده بدن پیش از بارداری و وزن‌گیری بیش از حد در دوران بارداری موجب افزایش خطر پیامدهای نامطلوب بارداری می‌گردد^(۲۹).

یا نا امنی غذایی عامل ایجاد عوارض در طول بارداری و همچنین این که آیا نا امنی غذایی موجود در خانوار مقطعی بوده است یا مزمن نیاز به مطالعات مراقبت و پیگیری وجود دارد. پیشنهاد می شود در مطالعات بعدی میزان فعالیت بدنه مادران نیز سنجیده شود.

در پایان می توان نتیجه گیری کرد که با توجه به نتایج حاصله از این مطالعه پس از تعدیل عوامل محدودش کننده نشان داده شد که زندگی در خانوارهای نا امن غذایی با خطر ابتلا به دیابت، فشارخون ارتباط معنی داری دارد. ولی میان نا امنی غذایی و پروتئینوری ارتباطی دیده نشد. بنابراین با توجه به متغیرهای موثر بر این وضعیت، اقدامات پیشگیری کننده در این باره ضروری به نظر می رسد و ارایه راهکارهای عملی به مردم از طریق سازمان های مربوطه جهت جلوگیری از نا امنی غذایی در خانوارها و افزایش وزن در زنان ضرورت دارد. همچنین پیشنهاد می شود با توجه به این که وضعیت اجتماعی - اقتصادی مهم ترین عامل تعیین کننده نا امنی غذایی می باشد می توان با سیاست گذاری های مناسب در زمینه ارتقاء وضعیت اقتصادی - اجتماعی خانوارها و در نظر گرفتن تسهیلات برای آنها شیوع نا امنی غذایی را در خانوارهای در معرض خطر کاهش داد.

سپاسگزاری

بدین وسیله از جناب آقای دکتر احمد رضا درستی برای در اختیار قرار دادن پرسشنامه مورد استفاده در طرح و از کارشناسان تغذیه خانمها سمانه انصاری، تندیس احمدی و بهاره امین نژاد به خاطر همکاری صمیمانه در اجرای این طرح، تشکر و قدردانی می گردد.

References

1. Frongillo EA, Nanama S. Development and Validation of an Experience-Based Measure of Household Food Insecurity within and across Seasons in Northern Burkina Faso. *J Nutr* 2006; 136(5): 1409S-1419S.
2. Campbell CC. Food insecurity: a nutritional outcome or a predictor variable? *J Nutr* 1991; 121(3): 408-415.
3. Radimer KL, Olson CM, Greene JC, Campbell CC, Habicht J-P. Understanding hunger and

احشایی را در زنان افزایش دهد که خود ممکن است موجب افزایش خطر ابتلا به دیابت گردد (۴۱، ۴۲). در این مطالعه ارتباطی میان پروتئینوری و نا امنی غذایی دیده نشد. تا به حال به طور مستقیم مطالعه ای بروی ارتباط نا امنی غذایی خانوار با پروتئینوری انجام نگرفته است و در این مطالعه برای اولین بار این ارتباط مطرح گردیده است. پروتئینوری در دوران بارداری می تواند به علل مختلف از جمله پره اکلامسی، عفونت ادراری، دیابت ۴۳- ۴۵). در این مطالعه افراد با بیماری کلیه از قبل از بارداری وارد مطالعه نشدند. ضمن این که علت پروتئینوری در بارداری و بیماری های کلیه از قبل از بارداری باشد، پیش تر افراد این مطالعه به ترتیب ناشی از فشارخون بالا و پره اکلامسی در بارداری، عفونت ادراری و سپس دیابت بارداری بود. بنابراین با توجه به این که به نظر می رسد پروتئینوری در بارداری به صورت فیزیولوژیک و به دنبال پره اکلامسی، عفونت ادراری و دیابت دیده می شود، عدم ارتباط نا امنی غذایی و پروتئینوری در این مطالعه قابل توجیه می باشد. با این حال پیشنهاد می گردد این ارتباط در مطالعات آینده مورد بررسی قرار بگیرد. همچنین از آن جایی که در این مطالعه ارتباط نا امنی غذایی با دیابت قوی تر از فشارخون بارداری بود، به نظر می رسد چاقی و اضافه وزن قبل و حین بارداری نقش مهم تری در ابتلا به فشارخون داشته باشد. بنابراین انجام مطالعات مورد شاهدی در زمینه عوارض بارداری مرتبط با تغذیه پیشنهاد می گردد.

مطالعه حاضر شامل محدودیت هایی بود. با توجه به این که این مطالعه مقطعی می باشد، جهت تعیین این که آیا عوارض بارداری عامل خطر نا امنی غذایی است و

- developing indicators to assess it in women and children. *Journal of Nutrition Education.* 1992; 24(1, Supplement 1): 36S-44S.
4. Rose D, Oliveira V. Nutrient intakes of individuals from food-insufficient households in the United States. *Am J Public Health* 1997; 87(12): 1956-1961.
 5. Kendall A, Olson CM, Frongillo Jr EA. Relationship of Hunger and Food Insecurity to Food Availability and Consumption. *J Am Diet Assoc* 1996; 96(10): 1019-1024.
 6. Martin KS, Ferris AM. Food Insecurity and Gender are Risk Factors for Obesity. *J Nutr Educ Behav* 2007; 39(1): 31-36.
 7. Holben DH, Pheley AM. Diabetes Risk and Obesity in Food-Insecure Households in Rural Appalachian Ohio. *Prev Chronic Dis* 2006; 3(3): A82.
 8. Laraia BA, Bodnar LM, Siega-Riz AM. Pregravid body mass index is negatively associated with diet quality during pregnancy. *Public Health Nutrition* 2007; 10(09): 920-926.
 9. Derbyshire E, Davies J, Costarelli V, Dettmar P. Prepregnancy body mass index and dietary intake in the first trimester of pregnancy. *J Hum Nutr Diet* 2006; 19(4): 267-273.
 10. Brawarsky P, Stotland NE, Jackson RA, Fuentes-Afflick E, Escobar GJ, Rubashkin N, et al. Pre-pregnancy and pregnancy-related factors and the risk of excessive or inadequate gestational weight gain. *Int J Gynecol Obstet* 2005; 91(2): 125-131.
 11. Saldana TM, Siega-Riz AM, Adair LS, Suchindran C. The relationship between pregnancy weight gain and glucose tolerance status among black and white women in central North Carolina. *Am J Obstet Gynecol* 2006; 195(6): 1629-1635.
 12. Belogolovkin V, Engel S, Savitz D, Chelimo C, Siega-Riz AM, Sperling R. Weight gain velocity in relation to the development of gestational hypertension and or preeclampsia. *Am J Obs & Gyn* 2006; 195(6): s127-134.
 13. Bodnar LM, Ness RB, Markovic N, Roberts JM. The Risk of Preeclampsia Rises with Increasing Prepregnancy Body Mass Index. *Ann Epidemiol* 2005; 15(7): 475-482.
 14. Seligman HK, Laraia BA, Kushel MB. Food Insecurity Is Associated with Chronic Disease among Low-Income NHANES Participants. *J Nutr* 2010; 140(2): 304-310.
 15. Maddah M, Nikooyeh B. Obesity among Iranian Adolescent Girls: Location of Residence and Parental Obesity. *J Health Popul Nutr* 2010; 28(1): 61-66.
 16. Laraia BA, Siega-Riz AM, Gundersen C. Household food insecurity is associated with self-reported pregravid weight status, gestational weight gain, and pregnancy complications. *J Am Diet Assoc* 2010; 110(5): 692-701.
 17. Mohammadi F, Mehrabi Y, Omidvar N, Houshiar Rad A, Abdollahi M. Association of food security and body weight status of adult members of Iranian households. *Iranian J Nutr Sci Food Tech* 2008; 3(2): 41-53.
 18. Rafiei M, Nord M, Sadeghizadeh A, Entezari MH. Assessing the internal validity of a household survey-based food security measure adapted for use in Iran. *Nutr J* 2009; 8: 28.
 19. Ramesh T, Dorosty Motlagh AR, Abdollahi M. Prevalence of household food insecurity in the City of Shiraz and its association with socio-economic and demographic factors, 2008. *Iranian J Nutr Sci Food Technol* 2010; 4(4): 53-64.
 20. Hakim S, Dorosty Motlagh AR, Eshraghian M. Association of food insecurity and

- household socio-economic status with the body mass index among urban women in Dezful. J School of Public Health and Institute of Public Health Research (sjsp). 2010; 8(2): 55-66.
21. Guidelines IoMUA NRCUCtRIPW. Weight Gain During Pregnancy: Reexamining the Guidelines. Rasmussen KM, Yaktine AL, (eds). Washington DC; 2009.
 22. Brown MA, Lindheimer MD, de Swiet M, Van Assche A, Moutquin JM. The classification and diagnosis of the hypertensive disorders of pregnancy: statement from the International Society for the Study of Hypertension in Pregnancy (ISSHP). Hypertens Pregnancy 2001; 20(1): IX-XIV.
 23. International Association of Diabetes Pregnancy Study Groups Consensus Panel, Gabbe SG, Persson B, Buchanan TA, Catalano PA, Damm P, et al. International Association of Diabetes and Pregnancy Study Groups Recommendations on the Diagnosis and Classification of Hyperglycemia in Pregnancy. Diabetes Care 2009; 33(3): 676-682.
 24. Payab M, Dorosty Motlagh A, Eshraghian MR, Siassi F, karimi T. The association between food insecurity, socio-economic factors and dietary intake in mothers having primary school children living in Ray 2010. Iranian J Nutr Sci Food Technol 2012; 7(1):
 25. Mohammadi Nasrabadi F, Omidvar N, Hoshyar Rad A, Mehrabi Y, Abdollahi M. Association of food security and body weight status of adult members of Iranian households. Iranian J Nutr Sci Food Technol 2008; 3(2): 41-53.
 26. Shariff ZM, Khor GL. Obesity and household food insecurity: evidence from a sample of rural households in Malaysia. Eur J Clin Nutr 2005; 59(9): 1049-1058.
 27. Hakim S, Dorosti MR, Eshraghian MR. Prevalence of food insecurity and its correlates. Payesh 2012; 11(6): 791-797.
 28. Seligman HK, Bindman AB, Vittinghoff E, Kanaya AM, Kushel MB. Food insecurity is associated with diabetes mellitus: results from the National Health Examination and Nutrition Examination Survey (NHANES) 1999-2002. J Gen Intern Med 2007; 22(7): 1018-1023.
 29. Chen Z, Du J, Shao L, Zheng L, Wu M, Ai M, et al. Prepregnancy body mass index, gestational weight gain, and pregnancy outcomes in China. Int J Gynaecol Obstet 2010; 109(1): 41-44.
 30. Drewnowski A. Obesity and the food environment: Dietary energy density and diet costs. Am J Prev Med 2004; 27(3, Suppl): 154-162.
 31. Dixon LB, Winkleby MA, Radimer KL. Dietary Intakes and Serum Nutrients Differ between Adults from Food-Insufficient and Food-Sufficient Families: Third National Health and Nutrition Examination Survey, 1988-1994. J Nutr 2001; 131(4): 1232-1246.
 32. Kirkpatrick SI, Tarasuk V. Food Insecurity Is Associated with Nutrient Inadequacies among Canadian Adults and Adolescents. J Nutr 2008; 138(3): 604-612.
 33. Adrogué HJ, Madias NE. Sodium and Potassium in the Pathogenesis of Hypertension. N Engl J Med 2007; 356(19): 1966-1978.
 34. Belizan JM, Villar J. The relationship between calcium intake and edema-, proteinuria-, and hypertension-gestosis: an hypothesis. American Journal of Clinical Nutrition 1980; 33(10): 2202-2210.

35. Willett W, Manson J, Liu S. Glycemic index, glycemic load, and risk of type 2 diabetes. *Am J Clin Nutr* 2002; 76(1): 274S-80S.
36. Gross LS, Li L, Ford ES, Liu S. Increased consumption of refined carbohydrates and the epidemic of type 2 diabetes in the United States: an ecologic assessment. *Am J Clin Nutr* 2004; 79(5): 774-779.
37. Black KD. Stress, Symptoms, Self-Monitoring Confidence, Well-Being, and Social Support in the Progression of Preeclampsia/Gestational Hypertension. *J Obstet Gynecol Neonatal Nurs* 2007; 36(5): 419-429.
38. Wales JK. Does Psychological Stress Cause Diabetes? *Diabet Med* 1995; 12(2): 109-112.
39. Whitaker RC, Phillips SM, Orzol SM. Food Insecurity and the Risks of Depression and Anxiety in Mothers and Behavior Problems in their Preschool-Aged Children. *Pediatrics* 2006; 118(3): 859-868.
40. Laraia BA, Siega-Riz AM, Gundersen C, Dole N. Psychosocial Factors and Socioeconomic Indicators Are Associated with Household Food Insecurity among Pregnant Women. *J Nutr* 2006; 136(1): 177-182.
41. Gluck ME, Geliebter A, Lorence M. Cortisol Stress Response Is Positively Correlated with Central Obesity in Obese Women with Binge Eating Disorder (BED) before and after Cognitive-Behavioral Treatment. *Ann N Y Acad Sci* 2004; 1032(1): 202-207.
42. Epel ES, McEwen B, Seeman T, Matthews K, Castellazzo G, Brownell KD, et al. Stress and body shape: stress-induced cortisol secretion is consistently greater among women with central fat. *Psychosom Med* 2000; 62(5): 623-632.
43. Piccoli GB, Attini R, Parisi S, Vigotti FN, Daidola G, Deagostini MC, et al. Excessive urinary tract dilatation and proteinuria in pregnancy: a common and overlooked association? *BMC Nephrol* 2013; 14: 52.
44. Davey DA, MacGillivray I. The classification and definition of the hypertensive disorders of pregnancy. *Am J Obstet Gynecol* 1988; 158(4): 892-898.
45. Murakami SOH, Saitoh M, Kubo T, Koyama T, Kobayashi M. Renal Disease in Women With Severe Preeclampsia or Gestational Proteinuria. *Obstet Gynecol* 2000; 96(6): 945-949.