

PCSK9 Associated Promoter Methylation Status in Patients with Hyperlipidemia

Samaneh Bahrami¹,
Maryam Tahmasebi-birgani²,
Mahdi Bijanzadeh³,
seyed Ali-Hossein Saberi⁴

¹ MSc Student in Human Genetics, School of Medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

² Assistant Professor, Department of Medical Genetics, School of Medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

³ Associate Professor, Department of Medical Genetics, School of Medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

⁴ Professor, Department of Medical Genetics, School of Medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

(Received July 20, 2020 ; Accepted May 24, 2021)

Abstract

Background and purpose: Hyperlipidemia is one of the main risk factors for coronary artery disease and is defined as abnormal elevation of lipids or lipoproteins in the blood. Pcsk9 is the ninth member of the proprotein convertase family that binds to the LDLR on the surface of the hepatocyte, leading to degradation of LDLR in lysosomes which could cause hyperlipidemia. The present study aimed to analyze the methylation status of pck9 promoter in patients with hyperlipidemia.

Materials and methods: This case-control study was conducted in 50 patients with hyperlipidemia and 50 healthy controls. DNA isolation from whole blood was performed using salting out procedure. Promoter methylation of the Pcsk9 gene was analyzed by methylation-specific PCR (MSP). Ten MSP products were sequenced to confirm the data obtained.

Results: According to MSP results, methylation pattern of pck9 gene promoter displayed an unmethylated status among the patients and control individuals. In other words, no methylation was seen in case and control samples.

Conclusion: The current study showed no significant association between PCSK9 methylation pattern and blood lipid profile level in case group and control group.

Keywords: hyperlipidemia, methylation, pck9

J Mazandaran Univ Med Sci 2021; 31 (199): 156-161 (Persian).

* Corresponding Author: Maryam Tahmasebi-birgani - School of Medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran (E-mail: Tahmasebi-ma@ajums.ac.ir)

بررسی وضعیت متیلاسیون پرموتور ژن PCSK9 در بیماران مبتلا به هایپرلیپیدمی

سمانه بهرامی^۱

مریم طهماسبی بیرگانی^۲

مهندی بیژن زاده^۳

سید علی حسین صابری^۴

چکیده

سابقه و هدف: هایپرلیپیدمی از مهم‌ترین عوامل خطر بروز بیماری‌های عروق کرونر محسوب می‌شود و به معنای افزایش غیرطبیعی لیپیدها یا لیپوپروتئین‌ها در خون می‌باشد. PCSK9 نهمین عضو شناسایی شده از خانواده پروپروتئین کانورتاز (PC) می‌باشد، به LDLR در سطح سلول‌های کبدی متصل می‌شود و منجر به تجزیه آن در لیزوژوم‌ها می‌شود که بدین صورت منجر به هایپرلیپیدمی می‌شود. هدف از این مطالعه، بررسی متیلاسیون پرموتور ژن PCSK9 در بیماران مبتلا به هایپرلیپیدمی می‌باشد.

مواد و روش‌ها: در این تحقیق مورد شاهدی، 50 بیمار مبتلا به هایپرلیپیدمی و 50 فرد کنترل سالم شرکت نمودند و استخراج DNA به روش حذف نمکی (Salting Out) انجام گردید. جهت بررسی متیلاسیون پرموتور ژن PCSK9، واکنش زنجیره‌ای پلیمراز ویژه متیلاسیون (MSP) انجام گردید. همچنین جهت تایید نتایج به دست آمده، 10 محصول MSP توالی باشی شد. **یافته‌ها:** نتایج حاصل از MSP وضعیت غیرمتیله را در تمامی نمونه‌های افراد بیمار و کنترل نشان داد، به عبارتی در هیچ یک از نمونه‌های بیمار و کنترل متیلاسیون مشاهده نشد.

استنتناج: یافته‌ها موید این مطلب می‌باشد که متیلاسیون پرموتور ژن PCSK9 در گروه بیمار و افراد کنترل با سطح پروفایل چربی خون ارتباط معنی‌داری وجود ندارد.

واژه‌های کلیدی: هایپرلیپیدمی، متیلاسیون، PCSK9

مقدمه

هایپرلیپیدمی از شایع‌ترین بیماری‌های مزمن می‌باشد که طی آن سطح لیپیدها یا لیپوپروتئین‌ها در خون به شکل غیرطبیعی افزایش می‌یابد^(۱)، برخی ارثی هستند و برخی دیگر متعاقب ابتلا به بیماری‌های نظری دیابت، بیماری‌های کبدی و یا رژیم غذایی نادرست حادث می‌شود^(۲). فرم

وراثتی که بنام هایپرکلسیترولمی خانوادگی (FH) شناخته می‌شود، عمدتاً به علت جهش در ژن گیرنده APOB B-100 (LDLR) و ژن آپولیپوپروتئین (APOB LDL) ایجاد می‌شود^(۳)، اما جهش در ژن دیگری تحت عنوان PCSK9 به عنوان سومین ژن مسبب این اختلال

E-mail: Tahmasebi-ma@ajums.ac.ir

مؤلف مسئول: مریم طهماسبی بیرگانی - اهواز: دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دانشکده پزشکی

۱. دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

۲. استادیار، گروه ژنتیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

۳. دانشیار، گروه ژنتیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

۴. استاد، گروه ژنتیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

تاریخ دریافت: ۱۳۹۹/۴/۳۰ تاریخ ارجاع چت اصلاحات: ۱۳۹۹/۵/۱۲ تاریخ تصویب: ۱۴۰۰/۳/۳

کلیوی، اختلالات لیپیدی و چاقی را نداشتند. در این تحقیق تمامی شرایط اخلاقی پزشکی رعایت گردید و قبل از انجام نمونه گیری فرم رضایت‌نامه از بیماران گرفته شد. DNA ژنومی از لکوستیت‌های خون محیطی با روش استخراج شد(11). برای بررسی الگوی متیلاسیون پرموتر (MSPCR) ژن PCSK9 از روش PCR مختص متیلاسیون (MSPCR) استفاده شد. ژنوم افراد مورد مطالعه با استفاده از کیت بی‌سولفیت ساخت شرکت QIAGEN آلمان Lot No:142339708 و با توجه به نحوه دستورالعمل کیت آماده‌سازی گردید. این روش نیازمند دو جفت پرایمر می‌باشد، توالی پرایمرهای مورد نظر در جدول شماره ۱ آورده شده است.

جدول شماره ۱: توالی پرایمر

| سایز محصول | >3' 5'- ^{3'} باول | پرایمر |
|------------|---------------------------------|--------|
| 149 | GTA GTG AGA TTG GTT CGG GC | Me-F |
| 149 | ACG ACG CCT TAA ACC TTA CG | Me-R |
| 156 | AGG TAG TGA GAT TGG TTT GGG T | UMe-F |
| 156 | CAC CAA CAA CAC CTT AAA CCT TAC | UMe-R |

Me: Methylated; UMe: Unmethylated;
F: Forward; R: Reverse

روش کار به طور خلاصه به این صورت بود که محتويات هر تیوب شامل 2 میکرولیتر DNA تیمار شده 0/5 به وسیله بی‌سولفیت، 0/5 میکرولیتر پرایمر مستقیم، 8 میکرولیتر پرایمر معکوس، 8 میکرولیتر Master Mix و با آب مقطر استریل به حجم نهایی 25 میکرولیتر رسانده شد. میکروتیوب‌های بالا در شرایط دمایی 95 درجه سانتی گراد به مدت 5 دقیقه، 35 سیکل به صورت 95 درجه به مدت 1 دقیقه، annealing پرایمرهای متیله و غیرمتیله در دمای 60 درجه سانتی گراد به مدت 45 ثانیه و مرحله طویل شدن در 72 درجه سانتی گراد به مدت 45 ثانیه و در نهایت 7 دقیقه در 72 درجه سانتی گراد و در دستگاه PeQLab، 96 universal gradient، UK ترموسایکلر مدل PCR بر روی ژل آگاراز 1/5 درصد، مشاهده باند 149 bp نشان‌دهنده وجود متیلاسیون در پرموتور ژن PCSK9 و باند 156 bp

معرفی شده است(4). مکانیسم عمل PCSK9 توانایی اتصال آن به گیرنده سطح سلول‌های کبدی می‌باشد که بدین گونه گیرنده‌های LDL کبدی را کاهش می‌دهد و این رسپتورها شکسته و تجزیه می‌شوند(5) و هنگامی که غلظت LDL خون افزایش می‌یابد به آرامی در جدار داخلی سرخرگ‌هایی با قطر متوسط و بزرگ رسبو می‌کند و منجر به تشکیل پلاک‌های فیبری-چربی و تنگی رگ و تصلب شرائین می‌شود که از علل اصلی بروز بیماری‌های ایسکمی دهنده رگ‌های قلب و مغز به شمار می‌رود(6). تغییرات اپیژن‌تیک می‌تواند بروز برخی بیماری‌ها حتی انواع تک ژنی را دستخوش تغییر کند(7). اپیژن‌تیک تغییرات در بیان ژن می‌باشد که توالی DNA دستخوش تغییر نمی‌شود(8). متیلاسیون DNA از شناخته شده ترین تغییرات اپیژن‌تیکی در پستانداران بوده که در تشکیل نواحی هتروکروماتین ژنوم نقش دارد و اگر در نواحی پرموتر ژن رخ دهد منجر به مهار رونویسی از روی ژن می‌شود(9). متیلاسیون DNA به عنوان یک مارکر تشخیص به موقع و پیش‌آگهی در بسیاری از بیماری‌های مختلف ارائه شده است(10). هدف از این مطالعه، بررسی متیلاسیون پرموتر ژن PCSK9 در بیماران مبتلا به هایپرلیپیدمیایی بود که برای جهش‌های سه ژن LDLR، PCSK9 و ApoB منفی بودند.

مواد و روش‌ها

این تحقیق در کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز به تصویب رسیده است. در این مطالعه، 50 بیمار مبتلا به هایپرلیپیدمی و 50 کنترل سالم مورد مطالعه قرار گرفتند. معیارهای ورود به مطالعه در بیماران افرادی بودند که دارای سطح کلسترول تام بیش تر از 290 میلی گرم بر دسی لیتر، سابقه خانوادگی بیماری‌های قلبی عروقی و سطح BMI کمتر از 23 بودند. شاخص‌های خروج شامل دیابت، فشارخون، بیماری‌های کلیوی و BMI بیش تر از 23 بود. گروه سالم افرادی بودند که فشارخون، دیابت، بیماری‌های قلبی و عروقی، بیماری‌های

در ناحیه CpG که متیله نمی‌باشد، به باز *t* تبدیل شده‌اند که تایید کنندهٔ وضعیت غیرمتیله می‌باشد. نتایج حاصله نشان‌گر این مطلب می‌باشد که ارتباط معناداری میان متیلاسیون پروموتور ژن PCSK9 با پارامترهای بالینی بیمار شامل جنس، سن و سطح پروفایل چربی خون دیده نمی‌شود. هایپرکلسترولمی خانوادگی یک بیماری ژنتیکی با الگوی وراثتی اتوزومی غالب می‌باشد که میزان شیوع آن متاسفانه در جوامع انسانی نسبتاً بالا است. تشخیص زودرس و درمان این بیماری می‌تواند ریسک ابتلاء به بیماری‌های قلبی-عروقی زودرس را کاهش دهد. طی پژوهشی پیشین که به بررسی تغییرات نوکلئوتیدی شایع در ژن‌های LDLR، ApoB و PCSK9 بر روی همین بیماران شرکت کننده در پژوهش صورت گرفته بود، جهش شایعی در این ژن‌ها مشاهده نشد و از آن‌جا بی‌جهش مسیبی در این بیماران یافت نشد، می‌توان یک احتمال را در نظر گرفت که علت ابی ژنتیک برای هایپرلیپیدمی وجود دارد. شواهدی وجود دارد که مکانسیم ابی ژنتیک ممکن است در تنظیم سطح چربی بین افراد نقش داشته باشد در نتیجه ممکن است همراه با ریسک بیماری‌های قلبی عروقی باشد⁽¹²⁾. ژن PCSK9 در بازوی کوتاه کروموزوم ۱ واقع شده است و به میزان بالایی در کبد بیان می‌شود⁽¹³⁾. هدف از این مطالعه بررسی تاثیرات بالقوه متیلاسیون DNA بر تنوع پروفایل چربی خون در افراد هایپرلیپیدمی و کنترل بود که نتایج به دست آمده، ارتباط معنی‌داری میان متیلاسیون پروموتور ژن PCSK9 با سطح لیپیدهای پلاسما نشان نداد. نتایج این مطالعه مشابه با نتایج به دست آمده از مطالعه Peng و همکارانش می‌باشد که ارتباط معنی‌داری میان متیلاسیون پروموتور ژن ABCG1 با سطح پروفایل چربی در بیماران مبتلا به عروق کرونری یافت نکردند⁽¹⁴⁾. علاوه بر این، غزنوی و همکارانش با بررسی متیلاسیون پروموتور ژن ABCA1 در بیماران مبتلا به عروق کرونری ارتباط معنی‌داری میان متیلاسیون با سطح لیپید پلاسما در بیماران مبتلا به عروق کرونری مشاهده نکردند⁽¹⁵⁾.

عدم متیلاسیون را نشان می‌دهد. همچنین جهت تایید باندهای مورد مشاهده، 10 محصول PCR مورد توالی‌بای‌بی قرار گرفت.


یافته‌ها و بحث

خصوصیات بالینی افراد مورد مطالعه در جدول شماره 2 ذکر شده است.

جدول شماره 2: خصوصیات کلینیکی افراد بیمار و کنترل

| خصوصیات | بیمار | کنترل | انحراف میان میانگین | انحراف میان میانگین | مردانه |
|---------|-------|--------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 24/26 | 20/30 | | |
| | | 72/12±10/44 | 03.8±12/47 | | سن (ماں) |
| | | 49/16±2/152 | 73.21±96/303 | | TC (mg/dl) |
| | | 74/43±70/106 | 30/106±34/250 | | TG (mg/dl) |
| | | 02/7±50/43 | 75/7±66/40 | | HDL-C (mg/dl) |
| | | 80/18±38/90 | 19/29±32/205 | | LDL-C (mg/dl) |

نتایج حاصل از آزمایش MSP پروموتور ژن PCSK9 و با شرایط ذکر شده در قسمت مواد و روش‌های آزمایش، منجر به تولید محصولی به طول 156 جفت باز به عنوان قطعه مورد آزمایش در مورد عدم متیلاسیون پروموتور ژن PCSK9 در نمونه‌های افراد بیمار و کنترل شد، نتایج ممید این مطلب است که پروموتور ژن مذکور در افراد بیمار و کنترل در وضعیت غیرمتیله قرار دارند (تصویر شماره 1).



تصویر شماره 1: الکتروفورز محصول PCR در تعدادی از نمونه‌های بیمار و کنترل. تصویر (a) نشان دهنده وضعیت متیلاسیون در چند بیمار مبتلا به هایپرلیپیدمی و تصویر (b) وضعیت متیلاسیون را در افراد کنترل نشان می‌دهد. (بیمار- P، کنترل- C، متیله- M، غیرمتیله- U)

لازم به ذکر است که نمونه‌هایی که با پرایمرهای غیرمتیله تکثیر یافته‌اند، قادر به تکثیر با پرایمرهای متیله نیستند و بلعکس. همچنین در توالی‌بای‌بی سنگر مشاهده گردید که تمامی بازه‌های CpG غیر C و همچنین بازه‌های

وجود دارد(18). یافته های مطالعه حاضر، حاکی از آن است که متیلاسیون پرموتر ژن PCSK9 نقشی در تنوع سطح چربی در جمعیت مورد مطالعه ندارد و متیلاسیون این ژن فاکتور مرتبط با بیماری نیست بلکه حوادث مولکولی دیگری نیز در شروع و ایجاد بیماری می تواند دخیل باشد که تایید این موضوع مستلزم بررسی های بیش تر در جامعه آماری بزرگ تر می باشد.

سپاسگزاری

بدین وسیله از دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز که تامین مالی پروژه را به عهده گرفتند و همچنین از اساتید محترم گروه ژنتیک پزشکی، سپاسگزاری می گردد. این مقاله حاصل پایان نامه دانشجویی خانم سمانه بهرامی دانشجوی ارشد ژنتیک پزشکی (طرح تحقیقاتی شماره CMRC-9632 و کد اخلاقی REC.1396.599 IRAJUMS. REC.1396.599) می باشد.

References

- Li B, Hui F, Yuan Z, Shang Q, Shuai G, Bao Y, et al. Untargeted fecal metabolomics revealed biochemical mechanisms of the blood lipid-lowering effect of koumiss treatment in patients with hyperlipidemia. Journal of Functional Foods 2021; 78: 104355.
- Nobukuni Y, Higashikawa F, Miyagawa K, Eboshida A. Hyperlipidemia: Complex Pathophysiology Caused by Multiple Genetic and Environmental Factors. Nippon Eiseigaku Zasshi 2005; 60(4): 426-441.
- Nomura A, Tada H, Okada H, Nohara A, Ishikawa H, Yoshimura K, et al. Impact of genetic testing on low-density lipoprotein cholesterol in patients with familial hypercholesterolemia(GenTLe-FH): a randomised waiting list controlled open-label study protocol. BMJ Open 2018; 8(12): e023636.
- Raal F, Panz V, Immelman A, Pilcher G. Elevated PCSK9 levels in untreated patients with heterozygous or homozygous familial hypercholesterolemia and the response to high-dose statin therapy. J Am Heart Assoc 2013; 2(2): e000028.
- on JD, Cohen JC, Hobbs HH. Molecular biology of PCSK9: its role in LDL metabolism. Trends Biochem Sci 2007; 32(2): 71-77.
- Nelson RH. Hyperlipidemia as a risk factor for cardiovascular disease. Prim Care 2013; 40(1): 195-211.
- Zadel M, Maver A, Kovanda A, Peterlin B. DNA methylation profiles in whole blood of Huntington's disease patients. Front Neurol 2018; 9: 655.
- Braun KV, Voortman T, Dhana K, Troup J, Bramer WM, Troup J, et al. The role of DNA

Alonso و همکارانش با اندازه گیری غلظت پلاسمایی PCSK9 به روش الیزا و تعیین میزان کلسفیکاسیون عروق کرونری در بیماران مبتلا به هایپرکلسترولیمی خانوادگی مشاهده کردند در افرادی که سطح غلظت پلاسمایی بالایی از PCSK9 را دارند، میزان کلسفیکاسیون عروق کرونری بیش تر می باشد و سطح پلاسمایی PCSK9 مرتبط با شدت ابتلا به بیماری عروق کرونری می باشد(16). Fang و همکارانش با بررسی متیلاسیون پرموتر ژن ABCA1 در بیماران مبتلا به عروق کرونری زودرس ارتباط معنی داری با کاهش سطح HDL سرم، سطح بالای متیلاسیون پرموتر ژن ABCA1 و افزایش ریسک ابتلا به عروق کرونری زودرس را مشاهده کردند(17). Guay و همکارانش انجام شد به این نتیجه رسیدند که ارتباط معناداری میان متیلاسیون پرموتر ژن های LPL و CETP و تنوع پروفایل چربی خون در بیماران مبتلا به کلسترول بالای خانوادگی

- methylation in dyslipidaemia: A systematic review. *Prog Lipid Res* 2016; 64: 178-191.
9. Egger G, Liang G, Aparicio A, Jones PA. Epigenetics in human disease and prospects for epigenetic therapy. *Nature* 2004; 429(6990): 457-463.
 10. Teschendorff AE, Marabita F, Lechner M, Bartlett T, Tegner J, Gomez-Cabrero D, et al. A beta-mixture quantile normalization method for correcting probe design bias in Illumina Infinium 450 k DNA methylation data. *Bioinformatics* 2013; 29(2): 189-196.
 11. Miller S, Dykes D, Polesky H. A simple salting out procedure for extracting DNA from human nucleated cells. *Nucleic Acids Res* 1988; 16(3): 1215.
 12. Gomez-Alonso MdC, Kretschmer A, Wilson R, Pfeiffer L, Karhunen V, Seppälä I, et al. DNA methylation and lipid metabolism: an EWAS of 226 metabolic measures. *Clinical Epigenetics* 2021; 13(1): 1-19.
 13. van Asch B, da Costa LFT. Patterns and tempo of PCSK9 pseudogenizations suggest an ancient divergence in mammalian cholesterol homeostasis mechanisms. *Genetica* 2021; 149(1): 1-19.
 14. Peng P, Wang L, Yang X, Huang X, Ba Y, Chen X, et al. A preliminary study of the relationship between promoter methylation of the ABCG1, GALNT2 and HMGCR genes and coronary heart disease. *PloS One* 2014; 9(8): e102265.
 15. Ghaznavi H, Mahmoodi K, Soltanpour MS. A preliminary study of the association between the ABCA1 gene promoter DNA methylation and coronary artery disease risk. *Mol Biol Res Commun* 2018; 7(2): 59-65 (Persian).
 16. Alonso R, Mata P, Muñiz O, Fuentes-Jimenez F, Díaz JL, Zambón D, et al. PCSK9 and lipoprotein (a) levels are two predictors of coronary artery calcification in asymptomatic patients with familial hypercholesterolemia. *Atherosclerosis* 2016; 254: 249-253.
 17. An F, Liu C, Wang X, Li T, Fu H, Bao B, et al. Effect of ABCA1 promoter methylation on premature coronary artery disease and its relationship with inflammation. *BMC Cardiovasc Disord* 2021; 21(1): 78.
 18. Guay S, Brisson D, Lamarche B, Marceau P, Vohl M, Gaudet D, et al. DNA methylation variations at CETP and LPL gene promoter loci: new molecular biomarkers associated with blood lipid profile variability. *Atherosclerosis* 2013; 228(2): 413-420.