

## *Antihypoxic Activities of Betaine in Asphyxia, Haemic and Circulatory Hypoxia Models in Mice*

Mohammad Eghbali<sup>1</sup>,  
Amin Barani<sup>1</sup>,  
Nilofar Rezapour<sup>2</sup>,  
Mohammad Ali Ebrahimzadeh<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Doctor of Pharmacy, Pharmaceutical Sciences Research Center, Hemoglobinopathy Institute, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

<sup>2</sup> Pharmacy Student, Ramsar International Campus, Faculty of Pharmacy, Mazandaran University of Medical Sciences, Ramsar, Iran

<sup>3</sup> Professor, Medicinal Chemistry, Pharmaceutical Sciences Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

(Received February 26, 2023 ; Accepted June 3, 2023)

### **Abstract**

**Background and purpose:** Hypoxia or lack of oxygen in tissues can cause death or serious injury. Betaine is a natural product that is beneficial in some diseases such as obesity, diabetes, cancer, and Alzheimer's disease. It is found in spinach, shrimp, beets, and grains. This research was conducted to investigate the anti-hypoxic activities of betaine in three experimental models of hypoxia in mice.

**Materials and methods:** Protective effects of betaine at 25, 50, and 100 mg/kg, i.p. against hypoxia-induced lethality in mice were evaluated in three experimental models of hypoxia; asphyctic, haemic, and circulatory. Analysis of variance was performed followed by Newman-Keuls multiple comparisons to determine the differences in means.

**Results:** In circulatory model, betaine at 50 mg/kg, significantly prolonged mice survival time and showed similar activity to propranolol 30 mg/kg which was used as positive control ( $P>0.05$ ). At 100 mg/kg, it was more effective than propranolol ( $P<0.0001$ ). In haemic antihypoxic model, betaine 25 mg/kg, significantly increased survival time and showed the same activity as propranolol 20 mg/kg ( $P>0.05$ ), while at 100 mg/kg, it was more effective than propranolol ( $P<0.05$ ). In asphyctic model, betaine 12.5 mg/kg significantly prolonged survival time compared to the control group ( $P<0.05$ ).

**Conclusion:** Betaine showed good protective effects against hypoxia in circulatory and haemic models where the drug at 100 mg/kg, was more effective than propranolol at 30 mg/kg.

**Keywords:** asphyctic hypoxia, haemic hypoxia, circulatory hypoxia, betaine

**J Mazandaran Univ Med Sci 2023; 33 (223): 119-124 (Persian).**

**Corresponding Author: Mohammad Ali Ebrahimzadeh** - Pharmaceutical Sciences Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran. (E-mail: zadeh20@yahoo.com)

## ارزیابی فعالیت آنتی هیپوکسی بتائین در سه مدل مختلف خفگی، خونی و جریان خونی در موش سوری

محمد اقبالی<sup>1</sup>امین بارانی<sup>1</sup>نیلوفر رضا پور<sup>2</sup>محمد علی ابراهیم زاده<sup>3</sup>

### چکیده

**سابقه و هدف:** هیپوکسی یا کمبود اکسیژن در بافت‌ها می‌تواند موجب مرگ یا آسیب جدی شود. بتائین یک ترکیب طبیعی و آنتی‌اکسیدان است که در چندین بیماری مانند چاقی، دیابت، سرطان و آلزایمر اثرات مفید دارد و در مواد غذایی مانند اسفناج، میگو، چغندر و غلات یافت می‌شود. این مطالعه به منظور بررسی فعالیت آنتی‌هیپوکسی بتائین در سه مدل مختلف هیپوکسی در موش سوری انجام شد.

**مواد و روش‌ها:** اثر محافظتی بتائین در دوزهای 25، 50 و 100mg/kg در مقابل مرگ و میر ناشی از هیپوکسی در موش سوری با سه مدل هیپوکسی خفگی، خونی و گردش خونی بررسی شد. آنالیز واریانس یک‌طرفه و نیومن کولز برای مقایسه میانگین‌ها به کار رفت.

**یافته‌ها:** در مدل جریان خونی بتائین در دوز 50mg/kg، زمان مرگ را افزایش داد و اثری مشابه پروپرانولول 30mg/kg که به‌عنوان کنترل مثبت به کار رفت، نشان داد ( $P > 0/05$ ) و در دوز 100mg/kg، از پروپرانولول قوی‌تر بود ( $P < 0/0001$ ). در مدل خونی، در دوز 25mg/kg، زمان مرگ افزایش داد و اثری مشابه پروپرانولول 20mg/kg از خود نشان داد ( $P > 0/05$ ). در دوز 100mg/kg، از پروپرانولول قوی‌تر بود ( $P < 0/05$ ). در مدل خفگی، بتائین در دوز 12/5mg/kg، زمان مرگ را به‌طور معنی‌داری نسبت به گروه کنترل افزایش داد ( $P < 0/05$ ).

**استنتاج:** بتائین فعالیت محافظتی خوبی را در مدل‌های هیپوکسی خونی و گردش خونی از خود نشان داد، تا جایی که دارو در دوز 100mg/kg، موثرتر از پروپرانولول در دوز 30mg/kg بود.

**واژه‌های کلیدی:** هیپوکسی خفگی، هیپوکسی خونی، هیپوکسی جریان خون، بتائین

### مقدمه

استرس اکسیداتیو می‌شود (1). اسفناج، میگو و چغندر سرشار از بتائین هستند. علاوه بر آن بتائین در غلات و سیبوس گندم یافت می‌شود (2). بتائین به‌عنوان یک اسمولیت و یک اهداکننده گروه متیل عمل می‌کند.

هیپوکسی یا کمبود اکسیژن در بافت‌ها می‌تواند موجب مرگ یا آسیب جدی در ایسکمی، سکته، بیماری‌های قلبی - عروقی، حین زایمان، کوه‌گرفتگی و سلول‌های تومور شود و نیز هیپوکسی در این مناطق باعث افزایش

**مؤلف مسئول:** محمدعلی ابراهیم زاده - ساری: کیلومتر 17 جاده فرح آباد، مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم، دانشکده داروسازی E-mail: zadeh20@yahoo.com

1. دکتر داروساز، مرکز تحقیقات علوم دارویی، پژوهشکده هموگلوبینوپاتی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

2. دانشجوی داروسازی، واحد پردیس رامسر، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران


3. استاد، مرکز تحقیقات علوم دارویی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

تاریخ دریافت: 1401/12/7 تاریخ ارجاع جهت اصلاحات: 1402/2/27 تاریخ تصویب: 1402/3/13

سالمین به‌عنوان کنترل منفی در نظر گرفته شد. در هیپوکسی خفگی، فنی توئین (50mg/kg) و در دو مدل دیگر، پروپرانولول 20 یا 30 mg/kg به‌عنوان کنترل مثبت بکار رفت (10،9). اطلاعات به‌صورت Mean±SD گزارش شد. آنالیز واریانس یک‌سویه و متعاقب آن نیومن کولز برای مقایسه میانگین‌ها به کار رفت.

## یافته‌ها و بحث

بتائین، تاثیر خوبی در افزایش بقا در مدل خونی داشت. در پایین‌ترین دوز تست شده (25mg/kg)، زمان مرگ را بیش از 4 دقیقه افزایش داد (از  $12/20 \pm 1/07$  برای گروه کنترل به  $16/44 \pm 1/39$  دقیقه) ( $P < 0/05$ ). بتائین با دوز 100mg/kg، زمان مرگ را حدوداً دو برابر نمود و به  $23/50 \pm 5/32$  دقیقه رساند ( $P < 0/001$ ). پروپرانولول در دوز 20mg/kg به‌طور معنی‌داری زمان مرگ را به  $16/44 \pm 1/39$  دقیقه افزایش داد. تاثیر بتائین در 25mg/kg همانند پروپرانولول بود اما در 100mg/kg، به‌مراتب قوی‌تر از آن عمل کرد ( $P < 0/05$ ) (نمودار شماره 1).



نمودار شماره 1: فعالیت آنتی‌هیپوکسی بتائین در مدل خونی در موش سوری (ns: not significant) \* نسبت به گروه کنترل منفی ( $P < 0/001$ :\*\*\*،  $P < 0/01$ :\*\*،  $P < 0/05$ :\*،  $P > 0/05$ )

در نتایج به‌دست آمده در تحقیقات قبلی، عصاره گل‌گردو در مقادیر 125-312/5 mg/kg زمان مرگ را در مدل خونی از 9 دقیقه به 12 دقیقه افزایش داد


اثرات بتائین در سلامت بدن و توانایی آن در محافظت از بیماری‌ها بررسی شده است. بتائین در بهبود چاقی، دیابت، سرطان و بیماری آلزایمر اثرات دارد (3). بتائین، استرس اکسیداتیو، التهاب و توسعه سرطان را کاهش داده و به‌عنوان یک درمان امیدوارکننده پیشنهاد شده است (4). خواص آنتی‌اکسیدانی بتائین به‌دلیل توانایی آن در از بین بردن رادیکال‌های آزاد است (5). بتائین اثرات محافظتی در برابر عوامل استرس اکسیداتیو، مانند اتانول و لوودوپا، در کبد، مغز، کلیه و معده موش‌ها نشان داده است (6). تاثیر بتائین بر هیپوکسی کاردیومیوسیت ناشی از تزریق ایزوپرنالین (7) و ایزوپروترونول (8) گزارش شده است. نظر به این‌که بتائین دارای اثرات آنتی‌اکسیدانی خوب و موثر در هیپوکسی کاردیومیوسیت می‌باشد، در مطالعه حاضر در جهت کشف ترکیبات موثر در هیپوکسی، ایسکمی و کووید-19، فعالیت آنتی‌هیپوکسی بتائین در سه مدل مختلف هیپوکسی شامل خفگی، خونی و جریان خونی در موش سوری انجام مورد بررسی قرار گرفت.

## مواد و روش‌ها

در این مطالعه، موش‌های سوری نر با سن 9 تا 10 هفته بکار رفت. رعایت اصول اخلاقی به تایید کمیته اخلاق با کد IR.MAZUMS.3.REC.1401.14426 رسید. در هر تست دوز 50 mg/kg از بتائین در نرمال سالمین استفاده شد و سپس حسب پاسخ، دوز بعدی افزایش یا کاهش یافت (8). حداقل سه دوز در هر تست بکار رفت. هر گروه مورد آزمایش شامل 5 موش بود. در مدل هیپوکسی خفگی، 30 دقیقه بعد از تزریق داخل صفاقی (IP) بتائین، حیوان در یک محفظه شیشه‌ای دربسته به حجم 300 میلی‌لیتر قرار گرفت. در مدل هیپوکسی خونی، نیتريت سدیم 360 mg/kg، 30 دقیقه بعد از تزریق IP دوزهای مورد نظر و در مدل هیپوکسی وابسته به گردش خون، سدیم فلورید 150 mg/kg تزریق گردید. اثر ضد هیپوکسی به‌صورت "میزان زمان زنده بودن موش" گزارش شد. در تمامی موارد نرمال

62/5 mg/kg در دوز گلی خنمی در دوز 62/5 mg/kg (P<0/05) (14). عصاره گل خنمی در دوز 125mg/kg موثر بود و زمان بقا را افزایش داد. در دوز 125mg/kg زمان زنده ماندن را از 11/37±1/53 به 14/04±1/36 دقیقه افزایش داد (P<0/01) اما کمی ضعیف تر از پروپرانولول (15/44±1/38) (P<0/01) بود (12). عصاره برگ میوه فعالیت محافظتی خوبی از خود نشان داد اما عصاره میوه حتی در دوز 250mg/kg هیچ فعالیتی نشان نداد (13).


بتائین اثر بسیار خوبی در مدل هیپوکسی خنمی نشان داد. در دوز 12/5mg/kg، زمان مرگ را از 28/20±3/27 دقیقه برای گروه کنترل به 35/05±4/08 دقیقه افزایش داد (P<0/05). در 25 mg/kg موثر بود و زمان مرگ موش ها را به 38/48±2/50 دقیقه افزایش داد (P<0/05). با افزایش دوز به 50mg/kg این زمان بقاء طولانی تر شد و به 44/59±5/36 دقیقه رسید (P<0/001). در 100mg/kg، بتائین به طور قابل توجهی زمان مرگ را به 55/10±5/61 دقیقه رساند (P<0/0001). زنده ماندن در گروه فنی توئین 55/10±5/61 دقیقه بود (P<0/0001) اما بتائین حتی در 100mg/kg، نتوانست اثری مشابه فنی توئین ایجاد کند (P<0/05) (نمودار شماره 3).



نمودار شماره 3: فعالیت آنتی هیپوکسی بتائین در مدل خنمی در موش سوری (ns: not significant) \*نسبت به گروه کنترل منفی (P<0/001:\*\*\*، P<0/01:\*\*، P<0/05:\*، P>0/05)

در نتایج به دست آمده در تحقیقات قبلی، عصاره گل گردو در غلظت های 125-31/25 mg/kg زمان مرگ را از 9 به 15 دقیقه افزایش داد (P<0/001) (11). عصاره گل سیر در دوز 62/5 mg/kg تأثیری نداشت (P>0/05) اما در دوز 125 mg/kg زمان زنده ماندن را افزایش داد

(P<0/01) (11). عصاره سرخ ولیک در دوز 400 mg/kg حدود یک دقیقه زمان بقا را در موش افزایش داد. این افزایش از نظر آماری معنی دار بود (P<0/05) (12). عصاره برگ و میوه پلم به ترتیب با دوز 125 و 62/5 mg/kg نسبت به گروه کنترل فعالیت قابل توجهی از خود نشان دادند و زمان مرگ را به تأخیر انداختند. عصاره برگ مورد حتی با دوز 125 mg/kg اثری نداشت (13). بتائین اثر خوبی در مسمومیت گردش خونی از خود نشان داد. در دوز 50 mg/kg زمان زنده ماندن موش ها را از 12/11±1/54 دقیقه به 15/29±1/71 دقیقه افزایش داد (P<0/05). در 100mg/kg، زمان مرگ را دو برابر نمود (P<0/0001). پروپرانولول در دوز 20 mg/kg موجب افزایش زمان بقاء در موش ها شد (P<0/05). دوز 50mg/kg اثری معادل پروپرانولول از خود نشان داد اما در دوز 100 mg/kg بسیار موثرتر از آن بود (P<0/0001) (نمودار شماره 2).



نمودار شماره 2: فعالیت آنتی هیپوکسی بتائین در مدل گردش خونی در موش سوری (ns: not significant) \*نسبت به گروه کنترل منفی (P<0/001:\*\*\*، P<0/01:\*\*، P<0/05:\*، P>0/05)

در نتایج به دست آمده در تحقیقات قبلی، عصاره گل گردو در غلظت های 125-31/25 mg/kg زمان مرگ را از 9 به 15 دقیقه افزایش داد (P<0/001) (11). عصاره گل سیر در دوز 62/5 mg/kg تأثیری نداشت (P>0/05) اما در دوز 125 mg/kg زمان زنده ماندن را افزایش داد

داشت (13). عصاره گیاه تره نیز در دوز 250mg/kg به طور قابل ملاحظه ای نسبت به گروه کنترل زمان مرگ را به تعویق انداخت ( $P < 0/001$ ) (16).

### سپاسگزاری

این مقاله حاصل پایان نامه دانشجویی به شماره (کد طرح 14426) می باشد که بدین وسیله از حمایت مالی معاونت پردیس رامسر تشکر می گردد.

را نسبت به گروه کنترل منفی افزایش داد. عصاره در 125mg/kg اثری معادل فنی توئین از خود نشان داد و در دوز 250mg/kg قوی تر از فنی توئین بود (15). عصاره گل سیر در دوز 125mg/kg اثری معادل فنی توئین ( $P > 0/05$ ) و در دوز 250mg/kg اثری به مراتب قوی تر از آن ایجاد نمود ( $P < 0/001$ ) (14). عصاره های برگ و میوه پلم در دوزهای تست شده فعالیت از خود نشان ندادند، اما عصاره برگ مورد در دوز 125mg/kg اثر مشابه فنی توئین

### References

1. Yazdani S, Mohammadyan M, Hosseinzadeh MH, Ebrahimzadeh MA. Evaluation of antihypoxic activity of Kojic acid in mice. *SJKU* 2023; 27(6): 1-12 (Persian).
2. Willingham BD, Ragland TJ, Ormsbee MJ. Betaine supplementation may improve heat tolerance: Potential mechanisms in humans. *Nutrients* 2020; 12(10): 2939.
3. Zhao G, He F, Wu C, Li P, Li N, Deng J, et al. Betaine in inflammation: mechanistic aspects and applications. *Front Immunol* 2018; 9: 1070.
4. Arumugam MK, Paal MC, Donohue TM, Ganesan M, Osna NA, Kharbanda KK. Beneficial effects of betaine: A comprehensive Review. *Biology* 2021; 10(6): 456.
5. Alirezaei M, Gheisari HR, Ranjbar VR, Hajibemani A. Betaine: a promising antioxidant agent for enhancement of broiler meat quality. *Br Poult Sci* 2012; 53(5): 699-707.
6. Alirezaei M, Jelodar G, Ghayemi Z, Mehr MK. Antioxidant and methyl donor effects of betaine versus ethanol-induced oxidative stress in the rat liver. *Comp Clin Pathol* 2014; 23(1): 161-168.
7. Chen MH, Wu YP, Chen W, Meng Q, Gao Y. The anti-myocardial hypoxic effects of compound solvia miltiorrhiza injection and betaine hydrochloride. *Journal of Taishan Medical College* 2006; 27(1): 1005-7110.
8. Zhu YY, Gao YS, Zhang JG, Hao LY, Qi YX, Xin XM. Effects of betaine hydrochloride on tolerance hypoxia in mice. *Journal of Taishan Medical College* 2004; 6: 573-574.
9. Hosseinzadeh MH, Shamshirian A, Ebrahimzadeh MA. Dexamethasone vs COVID-19: An experimental study in line with the preliminary findings of a large trial. *Int J Clin Pract* 2021; 75(6): e13943.
10. Khalili M, Dehdar T, Hamed F, Ebrahimzadeh MA, Karami M. Antihypoxic activities of *Eryngium caucasicum* and *Urtica dioica*. *Eur Rev Med Pharmacol Sci* 2015; 19(17): 3282-3285.
11. Nabavi SF, Ebrahimzadeh MA, Nabavi SM, Mahmoudi M, Keyvani Rad Sh. Biological activities of *Juglans regia* flowers. *Rev Bras Farmacogn* 2011; 21(3): 465-470.
12. Ebrahimzadeh MA, Khalili M, Jafari N, Zareh G, Farzin D, Amin G. Antihypoxic activities of *Crataegus pentaegyn* and *Crataegus microphylla* fruits-an in vivo assay. *Braz J Pharm Sci* 2018; 54(2): e17363.
13. Kaveh K, Mohamadyan M, Ebrahimzadeh MA. Antihypoxic activities of *Sambucus ebulus* leaf and fruit and *Myrtus communis*

- leaf in mice. J Mazandaran Uni Med Sci 2019; 29(176): 61-73 (Persian).
14. Shahbazee M, Mohammadyan M, Ebrahimzadeh MA. Antihypoxic activities of Allium sativum Flower in Mice. J Mazandaran Uni Med Sci 2019; 29(175): 145-149 (Persian).
15. Hosseinzadeh MH, Ebrahimzadeh MA. Antihypoxic activities of Hibiscus rosa sinensis in Mice. J Mazandaran Uni Med Sci 2020; 30(186): 133-140 (Persian).
16. Shahnazi R, Mehrdadfar F, Ebrahimzadeh MA. Impact of extraction methods on total phenolic and flavonoid contents, antioxidant and antihypoxic properties of Allium ampeloprasum in Mice. J Mazandaran Univ Med Sci 2018; 27(158): 27-44 (Persian).