

## Stereopsis among Medical Students

Asadollah Farokhfard<sup>1</sup>,  
 Hanieh Ahmadi<sup>1</sup>,  
 Kiumars Nowroozpoor-Dailami<sup>2</sup>,  
 Zahra Heidari<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Assistant Professor, Department of Ophthalmology, Bu-Ali Sina Hospital, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

<sup>2</sup> Associate Professor, Department of Ophthalmology, Bu-Ali Sina Hospital Clinical Research Development Unit, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

(Received October 9, 2022 ; Accepted July 16, 2023)

### Abstract

**Background and purpose:** Depth perception (stereopsis) is the ability to perceive depth in visual space through sensory integration of retinal images in both eyes and is achieved through binocular perception in specific visual pathways in the cerebral cortex. Medical students use a variety of diagnostic tools during their training, and a lack of normal stereoacuity can affect their professional performance. Understanding the appropriate stereopsis also plays a crucial role in their future careers. The purpose of this study was to determine stereopsis using the Titmus test in subjects with and without refractive errors.

**Materials and methods:** In this cross-sectional study, 115 students at Mazandaran University of Medical Sciences who met the inclusion criteria were randomly selected. Based on the presence or absence of refractive errors through retinoscopy, they were divided into symptomatic and asymptomatic groups. The stereopsis was measured by the Titmus test. Data were analyzed in SPSS V 21, and the frequency of stereoacuity was reported.

**Results:** A total of 115 people enrolled in this study. Males accounted 55.7% (n=64) of the subjects and 44.3% (n=51) of the subjects were females. The mean age of male and female participants were  $25.20 \pm 1.88$  and  $24.15 \pm 1.79$  years, respectively ( $P > 0.05$ ). There were 40 (34.8%) students with refractive errors and 75 (65.2%) without refractive errors. The mean values for stereopsis in symptomatic and asymptomatic subjects were  $42.90 \pm 29.59$  and  $29.24 \pm 12.96$  seconds/arc, respectively ( $P = 0.001$ ). These values in males and females were  $32.12 \pm 20.73$  and  $36.33 \pm 21.85$  seconds/arc, respectively ( $P = 0.293$ ). The mean test time was  $57.75 \pm 18.43$  and  $56.0 \pm 18.49$  seconds in symptomatic and asymptomatic subjects ( $P = 0.629$ ), and  $54.45 \pm 17.82$  and  $59.31 \pm 18.94$  seconds in males and females ( $P = 0.160$ ), respectively.

**Conclusion:** Titmus stereo test was found to be an effective test for evaluating the depth perception of symptomatic and asymptomatic subjects. There was no difference in the stereopsis between males and females in this study.

**Keywords:** stereopsis, refractive errors, Titmus test

**J Mazandaran Univ Med Sci 2023; 33(224): 109-116 (Persian).**

**Corresponding Author:** Zahra Heidari - Bu-Ali Sina Hospital Clinical Research Development Unit, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran. (E-mail: Zahra.heidari77@yahoo.com)

## بررسی دید بعد در دانشجویان علوم پزشکی

اسدالله فرخ فر<sup>1</sup>

هانیه احمدی<sup>1</sup>

کیومرث نوروزپور دیلمی<sup>2</sup>

زهره حیدری<sup>1</sup>

### چکیده

**سابقه و هدف:** دید بعد (استریوپسیس) توانایی درک عمق در فضای بینایی از طریق ادغام حسی تصاویر شبکه در هر دو چشم است و به دنبال درک دو چشمی در مسیرهای خاص بینایی در کورتکس مغز حاصل می شود. دانشجویان پزشکی در طول دوره آموزشی خود از انواع ابزارهای تشخیص طبی استفاده می کنند و عدم وجود دید بعد طبیعی، می تواند بر عملکرد حرفه ای آن ها تأثیر بگذارد. درک عمق مناسب از نظر آینده شغلی نیز نقش مهمی برای دانشجویان ایفا می کند. لذا هدف از این مطالعه تعیین دید بعد با تست تیموس در افراد با و بدون عیوب انکساری می باشد.

**مواد و روش ها:** در این مطالعه مقطعی، 115 نفر از دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران که دارای معیارهای ورود به مطالعه بودند، به صورت تصادفی انتخاب شدند. سپس براساس وجود یا عدم وجود عیب انکساری از طریق رتینوسکوپی، به دو گروه با و بدون عیب انکساری تقسیم شدند. از آزمون تیموس برای ارزیابی دید بعد استفاده شد. داده ها در نرم افزار آماری SPSS21 تحلیل شدند و توزیع دید بعد در گروه های مورد مطالعه گزارش شد.

**یافته ها:** در مجموع 115 نفر وارد این مطالعه شدند که 55/7 درصد (64 نفر) مرد و 44/3 درصد (51 نفر) زن بودند. میانگین سنی گروه های مورد مطالعه برای مردان و زنان به ترتیب  $25/20 \pm 1/88$  و  $24/15 \pm 1/79$  سال بود ( $P > 0/05$ ). 40 شرکت کننده (34/8 درصد) با عیب انکساری و 75 نفر (65/2 درصد) بدون عیب انکساری بودند. میانگین دید بعد در افراد با و بدون عیب انکساری به ترتیب  $42/90 \pm 29/59$  و  $29/24 \pm 12/96$  ( $P = 0/001$ ) و در مرد ها و زنان به ترتیب  $32/12 \pm 20/73$  و  $36/33 \pm 21/85$  ثانیه بر کمان بود ( $P = 0/293$ ). میانگین زمان آزمون در افراد با و بدون عیب انکساری  $57/75 \pm 18/43$  و  $56/0 \pm 18/49$  ( $P = 0/629$ ) و در مردان و زنان به ترتیب  $54/45 \pm 17/82$  و  $59/31 \pm 18/94$  ثانیه ( $P = 0/160$ ) بود.

**استنتاج:** تیموس آزمونی موثر برای ارزیابی دید بعد افراد با عیب انکساری و بدون عیب انکساری بود. در این مطالعه تفاوت درک عمق بین زن و مرد وجود نداشت.

**واژه های کلیدی:** دید بعد، عیب انکساری، تست تیموس

### مقدمه

شبکه در هر دو چشم می باشد و به دنبال درک دو چشمی در مسیرهای خاص بینایی در کورتکس مغز حاصل می شود

دید بعد (استریوپسیس: Stereopsis) توانایی درک عمق در فضای بینایی از طریق ادغام حسی تصاویر

E-mail: Zahra.heidari77@yahoo.com

**مؤلف مسئول:** زهره حیدری - ساری: مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا

1. استادیار، گروه چشم پزشکی، مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

2. دانشیار، گروه چشم پزشکی، واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

تاریخ دریافت: 1401/9/18 تاریخ ارجاع جهت اصلاحات: 1402/1/26 تاریخ تصویب: 1402/4/25

و از مزایای مهم دید دو چشمی در انسان است (1). درک عمق از طریق تجزیه و تحلیل دو چشمی ساختار سه بعدی اجسام تعریف می‌شود و حدت بعد به آستانه کوچک‌ترین زاویه جدایی (disparity) دو چشمی (اندازه‌گیری شده در ثانیه بر کمان) که می‌تواند درک عمق یا استریوپی را تحریک کند، اشاره دارد (2). حتی محرک‌های غیرقابل فیوز شدن (rivalrous stimuli) هم ممکن است سبب ایجاد درک عمق کنند (3).

اندازه‌گیری دید بعد از لحاظ تشخیص آنومالی‌های دید دو چشمی نظیر انحرافات چشمی و هم‌چنین از لحاظ پیگیری نتایج درمان‌های غیرجراحی یا جراحی این بیماران از نظر بررسی بهبود عملکرد دید دو چشمی حائز اهمیت است. دامنه دید بعد 130-30 ثانیه بر کمان در گروه‌های مختلف سنی و در نژادهای مختلف در جهان گزارش شده است (4-6). دید بعد ضعیف با کیفیت نامناسب، با حدت بینایی و عملکرد ضعیف سیستم بینایی به‌خصوص در کارهایی که نیاز به هماهنگی چشم و دست و مهارت‌های حرکتی - بصری دارند، مرتبط است. حدت بینایی ضعیف به دلیل عدم وجود دید عمق مناسب منجر به کاهش بهره‌وری در کار و کاهش کیفیت زندگی می‌شود (7) پردازش غیرطبیعی در طول مسیر بینایی از طریق افزایش سن (8)، تنبلی چشم (9)، عیوب انکساری (10)، استرابیسم و آنیزوکونی (5) بوجود می‌آید.

در مطالعه Elamurugan و همکاران، آنیزومتروپی و آمبلیوپیا از علل مهم در کاهش دید بعد در بزرگسالی بوده است (11)، درحالی‌که در مطالعه Fawcett و همکاران، علت اصلی کاهش دید بعد اختلال در دید دو چشمی بیان شده است (12). هنوز بین میزان و نوع عیوب انکساری و میزان کاهش دید بعد توافق دقیقی وجود ندارد. در یک مطالعه گزارش شده است که با افزایش 2 دیوپتر عیب انکساری اسفریک دید بعد 9/5 برابر کاهش می‌یابد (13) و مطالعه دیگری نیز عیب انکساری سیلندریک را از عوامل مهم کاهش دید بعد به دلیل ایجاد آنیزومتروپی محوری معرفی کرده است (14).

علت این تفاوت نظرها در مطالعات مختلف، میزان اندازه‌گیری شده دید بعد براساس گروه‌های سنی مختلف، عیوب انکساری مختلف و تفاوت در نوع اندازه‌گیری دید بعد بوده است.

از آزمون دید عمق در ارزیابی دید دو چشمی در کودکان پیش از مدرسه و در استخدام مشاغل حساس مانند خلبانی استفاده می‌شود. وجود دید بعد طبیعی در علوم پزشکی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و کاهش دید بعد ممکن است بر عملکرد حرفه‌ای افراد تاثیر بگذارد (15). کارورزان و دانشجویان پزشکی در طول دوره آموزشی باید در بخش‌های مختلف از دستگاه‌های تشخیص طبی مختلف مانند اسلیت لمپ و میکروسکوپ استفاده کنند و کار با دستگاه‌های مذکور مستلزم وجود دید بعد طبیعی می‌باشد. هم‌چنین درک عمق مناسب از نظر آینده شغلی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای برای این افراد دارد، به‌طوری‌که انجام هرگونه جراحی در رشته‌های مختلف نیازمند وجود دید بعد است. با توجه به اهمیت دید بعد در علم پزشکی، بر آن شدیم با انجام مطالعه حاضر وضعیت توزیع دید بعد را در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران بررسی کنیم. هدف از این مطالعه مقایسه دید بعد در موارد با و بدون عیب انکساری و هم‌چنین بررسی زمان پاسخ‌دهی به آزمایش درک عمق تیموس در تعیین توزیع دید بعد می‌باشد.

## مواد و روش‌ها

در این مطالعه مقطعی، 115 نفر از دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، به‌صورت تصادفی ساده انتخاب و بر اساس وجود یا عدم وجود عیب انکساری به دو گروه با عیب انکساری و بدون عیب انکساری تقسیم شدند. قبل از شروع آزمون فرم رضایت از افراد داوطلب شرکت در مطالعه دریافت شد. افراد با عینک با میانگین اسفر  $1/71 \pm 1/64$  - (دامنه  $3/00 +$  تا  $5/50 -$ ) و سیلندر  $0/67 \pm 1/15$  - (دامنه  $2/75 -$  تا  $0/25 -$ ) در گروه عیب انکساری و افراد بدون عینک با

عیب انکساری با استفاده از آزمون  $t$  انجام شد و معیار  $P$  کم تر از 0/05 معنی دار آماری در نظر گرفته شد.

### یافته‌ها

از تعداد 115 نفر شرکت کننده در این مطالعه، 64 نفر (55/7 درصد) مرد و 51 نفر (44/3 درصد) زن بودند. میانگین سنی کل افراد مورد مطالعه،  $24/73 \pm 1/91$  سال و در مردان و زنان به ترتیب  $25/20 \pm 1/88$  و  $24/15 \pm 1/79$  سال بوده است ( $P > 0/05$ ). در بین افراد مورد مطالعه 40 نفر (34/8 درصد) در گروه با عیب انکساری و 75 نفر (65/2 درصد) در گروه بدون عیب انکساری قرار گرفتند.

در بررسی دید عمق، تمامی افراد شرکت کننده اعم از با عیب انکساری و بدون عیب انکساری، از صفحه اول کتابچه که بررسی دیسپاریتی رتین بوده است، نمره کامل را کسب کردند. در واقع همه افراد شرکت کننده تصویر مگس را برجسته دیدند و توانستند بال‌های مگس را در فاصله مناسبی با دست‌های خود بگیرند. همچنین تمامی افراد مورد مطالعه توانستند دایره عمق دار را تا لوزی شماره 4 با دیسپاریتی 100 ثانیه بر کمان را به درستی انتخاب کنند. پراکندگی مقدار دید بعد در افراد شرکت کننده به تفکیک جنس و عیب انکساری، در جدول شماره 1 توضیح داده شده است. همچنین در تصویر شماره 1 توزیع دید بعد در افراد بدون عیب انکساری به طور مشخصی بیشتر بوده است.


مقدار میانگین دید بعد اندازه گیری شده در مردان و زنان به ترتیب  $32/12 \pm 20/73$  و  $36/33 \pm 21/85$  بوده است ( $P = 0/293$ ). میانگین دید بعد اندازه گیری شده در افراد با و بدون عیب انکساری به ترتیب  $42/90 \pm 29/59$  و  $29/24 \pm 12/96$  و از نظر آماری معنی دار بوده است ( $P = 0/001$ ). همچنین میانگین زمان انجام تست در مردان و زنان به ترتیب  $54/45 \pm 17/82$  و  $59/31 \pm 18/94$  ثانیه بوده است ( $P = 0/160$ ). میانگین زمان انجام تست در افراد با و بدون عیب انکساری به ترتیب  $57/75 \pm 18/43$  و  $56/0 \pm 18/49$  بوده است که ارتباط معنی داری آماری دیده نشد ( $P = 0/629$ ).

میانگین اسفر  $0/08 \pm 0/59$  (دامنه  $+1/25$  تا  $-0/5$ ) و سیلندر  $0/55 \pm 0/17$  (دامنه  $-0/5$  تا  $0/0$ ) دیوپتر در گروه بدون عیب انکساری قرار گرفتند. در هر دو گروه افراد بدون وجود انحراف آشکار در دور و نزدیک، توانایی درک دید عمق در صفحات غربالگری آزمون‌ها، بهترین حدت بینایی 20/25 یا بهتر در هر چشم، وارد مطالعه شدند. همچنین موارد با سابقه ضربه به سر، وجود بیماری چشمی یا استفاده از داروی خاص، سابقه هرگونه جراحی چشمی، آمبلیوپی و آنیزومتروپی از مطالعه خارج شدند.

برای ارزیابی دید عمق از آزمایش تیموس Stereo Fly Test, Stereo Optical Company, Inc., (Chicago, Illinois) که یکی از رایج ترین تست‌ها برای ارزیابی دید بعد است، استفاده شد. این تست با کمک عینک پلاریزه و یک محرک پلاریزه شده برای اندازه گیری در فاصله 40 سانتی متری انجام می شود. تست شامل یک کتابچه وکتوگرافیک دو صفحه‌ای می باشد. در صفحه اول تصویر یک مگس عمق دار به عنوان تست خام دید عمق با ایجاد تقریباً 3000 ثانیه قوسی دیسپاریتی رتین در فاصله 40 سانتی متری استفاده می شود. در صفحه دوم کتابچه که شامل تصویر 10 لوزی که هر یک حاوی 4 دایره بوده که فقط یکی از دایره‌ها دارای عمق می باشد، مقدار دیسپاریتی از لوزی شماره 1 تا 10 به تدریج کاهش پیدا می کند و به ترتیب برابر با 20، 25، 32، 40، 50، 63، 100، 160، 200، 400 ثانیه بر کمان است. تست براساس دستورالعمل موجود در کتابچه در محیط با روشنایی مناسب انجام و پاسخ‌های افراد ثبت شد. مدت زمان انجام تست تیموس برای هر فرد از آغاز تا پایان آزمایش بر حسب ثانیه اندازه گیری و ثبت شد. تمامی داده‌های جمع آوری شده در نرم افزار آماری SPSS نسخه 21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. توصیف داده‌ها با استفاده از میانگین و انحراف معیار انجام شد و توزیع متغیرها نیز گزارش شد. همچنین مقایسه میانگین داده‌های کمی در دو گروه با و بدون

جدول شماره 1: پراکندگی مقدار دید بعد در دو گروه با و بدون عیب انکساری به تفکیک جنسیت

| دید بعد          | 20 ثانیه | 25 ثانیه | 32 ثانیه | 40 ثانیه | 50 ثانیه | 63 ثانیه | 100 ثانیه | مجموع |
|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-------|
| مرد              | 33       | 6        | 10       | 5        | 4        | 2        | 4         | 64    |
| زن               | 23       | 3        | 5        | 7        | 4        | 6        | 3         | 51    |
| با عیب انکساری   | 17       | 1        | 6        | 3        | 3        | 3        | 7         | 40    |
| بدون عیب انکساری | 39       | 8        | 9        | 9        | 5        | 5        | 0         | 75    |



نمودار شماره 1: پراکندگی مقدار استریوپسیس در دو گروه با و بدون عیب انکساری

## بحث

نتایج این مطالعه با آزمون لوکال تیموس نشان داد میانگین دید بعد اندازه گیری شده به طور قابل توجهی در افراد با عیوب انکساری تصحیح شده متفاوت از افراد سالم (بدون عیوب انکساری) می باشد، به طوری که افراد با عیب انکساری دید کمتری داشته اند. در حالی که تفاوتی بین میانگین زمان دید عمق اندازه گیری شده در گروه های مختلف یافت نشد. تعداد زیادی از افراد در گروه سالم دید بعد 20 ثانیه بر کمان داشتند اما در گروه با عیب انکساری با وجود تصحیح عیب انکساری 58 درصد از افراد دید بعد کم تر از 20 ثانیه بر کمان داشته اند. احتمال وجود انحراف فوری در افراد با عیب انکساری، تغییر فرکانس فضایی به دلیل وجود عیب انکساری و به دنبال آن تغییر لومینانس نور و کاهش فیوژن حسی از دلایل کاهش دید بعد در افراد با عیب انکساری است. به علاوه افراد با عیب انکساری که در طی سالیان قبل از تصحیح انکساری استفاده کرده اند به تدریج دچار سازگاری می شوند (14) و دید بعد نزدیک به طبیعی که

در 42 درصد این افراد در این مطالعه مشاهده شده است، نشانگر ظرفیت بالای دید بعد سیستم بینایی این افراد نیست. وضعیت فیوژن افراد با دید بعد مرتبط است و افرادی که فیوژن ضعیف تری دارند دید بعد کمتری را گزارش می کنند (16، 17)، عیوب انکساری نیز سبب کاهش فیوژن حسی و متعاقباً کاهش دید بعد می شوند (18). به طور مشابه با نتایج این مطالعه، Tilahun و همکاران دریافتند حدود 40 درصد افراد مورد مطالعه پس از تصحیح عیوب انکساری همچنان دید بعد ضعیفی در ارزیابی با TNO داشتند (19). هم چنین آستانه درک شده ناهمگون در افراد با عیب انکساری سبب می شود که دید بعد در این افراد نامطلوب تر از افراد بدون عیب انکساری باشد (20). نوع عیب انکساری نیز نقش مهمی در کاهش دید بعد دارد، به طوری که افراد دوربین (هایپروپ) دید بدتری نسبت به افراد نزدیک بین دارند (21). آستیگماتیسم مخصوصاً از نوع خلاف قائده می تواند تاثیر زیادی در کاهش دید بعد داشته باشد (22) و افراد امتریپ بدون آستیگماتیسم بهترین میزان دید بعد را دارند (23). از طریق بررسی دید بعد حتی عمق آمبلیوپی افراد آنیزومترئوپیک نیز قابل بررسی است (24). در این مطالعه ارتباط بین دید بعد با عیوب انکساری مختلف مورد بررسی قرار نگرفته است. نکته قابل توجه وجود تفاوت سبب تصاویر در نتیجه تصحیح عیوب انکساری است که می تواند سبب تفاوت دید بعد افراد با عیوب انکساری تصحیح شده در مقایسه با افراد طبیعی بدون عیب انکساری باشد (14). جهت جلوگیری از این تغییرات در نتیجه تصحیح عیوب انکساری استفاده از لنز تماسی به جای عینک طبی توصیه می شود (25). افراد با دید بعد بهتر دواطلب بهتری برای دوره های تخصصی جراحی می باشند به طوری که افرادی که درک کمتری از دید بعد دارند در موارد جراحی های لاپاراسکوپی عملکرد نامناسب تری داشته اند (26). در مطالعه حاضر سعی شد تا توزیع دید بعد در پزشکان آینده بررسی شود تا بر اساس این اطلاعات افراد بتوانند

مهارت‌های جراحی یا سایر مهارت‌ها در حیطه پزشکی را بهتر بررسی کنند.

نتایج این مطالعه در مورد اندازه‌گیری دید بعد در میان زنان و مردان مشابه بوده است، در حالی که در مطالعه Adhikari و همکارانش، زنان دید بعد بهتری داشتند (27)، در مطالعه دیگری نیز این نتیجه تایید شد (28). اما در مطالعه Slonim و همکارانش مردان دید بعد بهتری را گزارش کردند (29). تفاوت در نتایج مطالعات علاوه بر نمونه‌های نژادی مختلف و استفاده از آزمون‌های ارزیابی دید بعد مختلف، می‌تواند ناشی از آگاهی افراد در چگونگی پاسخ دادن دادن به تست مورد نظر باشد.

از آزمون‌های مهم ارزیابی دید بعد علاوه بر تیموس می‌توان از TNO، فریزی و رندات نام برد (30). مطالعه Szymkiw و Lovasik (13) نشان داد نتایج ارزیابی دید بعد با تست تیموس در مقایسه با آزمون رندات بیشتر تحت تاثیر انیزومترایی و انیزوکونیای حاصل از آن است. هم‌چنین در ارزیابی دامنه دید بعد و عوامل موثر در دید بعد تک چشمی و دو چشمی با فیلترهای کامپیوتری، آزمون تیموس در مقایسه با

فریزی بیش‌تر تحت تاثیر تاری دید تک چشمی قرار گرفت (31). مطالعات نشان داده‌اند که با افزایش سن دید بعد کاهش می‌یابد (8،4). در مطالعه حاضر دامنه تغییرات سنی افراد شرکت کننده در مطالعه بین 22-28 سال بوده است و رابطه مقدار دید بعد با تغییرات سن مورد بررسی قرار نگرفت. از محدودیت‌های دیگر این مطالعه عدم ارزیابی فوریا و ارتباط آن با درک دید بعد در موارد مورد مطالعه بوده است. در آینده مطالعات کامل‌تری با ارزیابی دید بعد دو چشمی، بررسی انحرافات فوریا و همچنین مقایسه اندازه‌گیری دید بعد با آزمون‌های مختلف از جمله TNO، رندات و فریزی در این افراد توصیه می‌شود. این مطالعه نشان داد که توزیع دید بعد طبیعی در بین دانشجویان پزشکی بدون عیب انکساری بیش‌تر بوده است. کاهش دید بعد در دانشجویان با عیب انکساری ممکن است دلیل اصلی عدم عملکرد مناسب آن‌ها در دانشکده پزشکی و در نتیجه آسیب رساندن به حرفه آن‌ها در جراحی‌های حساس در آینده باشد. بنابراین شناسایی زود هنگام کاهش دید بعد در بینایی دانشجویان پزشکی، از طریق غربالگری درک عمق با تست رایج تیموس توصیه می‌شود.

## References

1. Jones RK, Lee DN. Why two eyes are better than one: the two views of binocular vision. *J Exp Psychol Hum Percept Perform* 1981; 7(1): 30-40.
2. Levy NS, Glick EB. Stereoscopic perception and Snellen visual acuity. *Am J Ophthalmol* 1974; 78(4): 722-724.
3. O'Connor AR, Birch EE, Anderson S, Draper H. The functional significance of stereopsis. *Invest Ophthalmol Vis Sci* 2010; 51(4): 2019-2023.
4. Lee SY, Koo NK. Change of stereoacuity with aging in normal eyes. *Korean J Ophthalmol* 2005; 19(2): 136-139.
5. Smith EL, Hung LF, Arumugam B, Wensveen JM, Chino YM, Harwerth RS. Observations on the relationship between anisometropia, amblyopia and strabismus. *Vision Res* 2017; 134: 26-42.
6. Tilahun MM, Hussen MS, Mersha GA, Eticha BL. Stereoacuity Among Patients with Refractive Error at University of Gondar, Northwest Ethiopia. *Clin Optom* 2021; 13: 221-126.
7. Ciner EB, Ying GS, Kulp MT, Maguire MG, Quinn GE, Orel-Bixler D, et al. Stereoacuity of preschool children with and without vision

- disorders. *Optom Vis Sci* 2014; 91(3): 351-358.
8. Garnham L, Sloper JJ. Effect of age on adult stereoacuity as measured by different types of stereotest. *Br J Ophthalmol* 2006; 90(1): 91-95.
  9. Levi DM, Knill DC, Bavelier D. Stereopsis and amblyopia: A mini-review. *Vision Res* 2015; 114: 17-30.
  10. Shippman S, Cohen KR. Relationship of heterophoria to stereopsis. *Arch Ophthalmol* 1983; 101(4): 609-610.
  11. Elamurugan V, Shankaralingappa P, Aarthy G, Kasturi N, Babu RK. Assessment of stereopsis in pediatric and adolescent spectacle-corrected refractive error-A cross-sectional study. *Indian J Ophthalmol* 2022; 70(2): 604-608.
  12. Fawcett SL. An evaluation of the agreement between contour-based circles and random dot-based near stereoacuity tests. *J AAPOS* 2005; 9(6): 572-578.
  13. Lovasik JV, Szymkiw M. Effects of aniseikonia, anisometropia, accommodation, retinal illuminance, and pupil size on stereopsis. *Invest Ophthalmol Vis Sci* 1985; 26(5): 741-750.
  14. Atchison DA, Lee J, Lu J, Webber AL, Hess RF, Baldwin AS, et al. Effects of simulated anisometropia and aniseikonia on stereopsis. *Ophthalmic Physiol Opt* 2020; 40(3): 323-332.
  15. Fedoryak X, Simiera J, Loba P. Awareness among medical students regarding the binocularity level in the course of future specialty choice. *Med Pr* 2020; 71(1): 9-16.
  16. Kulp MT, Ying GS, Huang J, Maguire M, Quinn G, Ciner EB, et al. Associations between hyperopia and other vision and refractive error characteristics. *Optom Vis Sci* 2014; 91(4): 383-389.
  17. Simons K. Preschool vision screening: rationale, methodology and outcome. *Survey of Ophthalmology* 1996; 41(1): 3-30.
  18. Guo DD, Wu JF, Hu YY, Sun W, Lv TL, Jiang WJ, et al. Stereoacuity and Related Factors: The Shandong Children Eye Study. *PloS One* 2016; 11(7): e0157829.
  19. Tilahun MM, Hussen MS, Mersha GA, Eticha BL. Stereoacuity Among Patients with Refractive Error at University of Gondar, Northwest Ethiopia. *Clin Optom* 2021; 13: 221-226.
  20. Momeni-Moghadam H, Kundart J, Ehsani M, Gholami K. The comparison of stereopsis with TNO and Titmus tests in symptomatic and asymptomatic University students. *J Behav Optom* 2011; 23(2): 35-39.
  21. Lee JY, Seo JY, Baek SU. The effects of glasses for anisometropia on stereopsis. *American journal of ophthalmology* 2013; 156(6): 1261-1266.e1.
  22. Gawęcki M. Threshold Values of Myopic Anisometropia Causing Loss of Stereopsis. *J Ophthalmol* 2019; 2019(5): 2654170.
  23. Armarnik S, Kozlov Y, Yahalomi T, Ekshtein A, Levian L, Gurfinkel Y, et al. The influence of refractive state and heterophorias on visual acuity and stereoacuity in healthy young adults. *The Official Publication of the American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus* 2022; 26(4): 181.e1-181.e6.
  24. Karabela Y, Salman İA. Evaluation of Stereoacuity and Binocular Functions in Patients with Anisometropic Amblyopia Through Titmus, TNO, and Synoptophore. *Haydarpasa Numune Med J* 2022; 62(3): 346-352.
  25. Dadeya S. Contact lenses in the management of high anisometropic amblyopia. *Eye* 2004; 18(1): 109.

26. Suleman R, Yang T, Paige J, Chauvin S, Alleyn J, Brewer M, et al. Hand-eye dominance and depth perception effects in performance on a basic laparoscopic skills set. *Journal of the Society of Laparoendoscopic Surgeons* 2010; 14(1): 35-40.
27. Gautam Adhikari P, Shah S, Bhatta N, Mandal P, Sharma Paudel B, Pokhrel A, et al. Stereoacuity among Undergraduate Medical and Nursing Students at a Tertiary Care Hospital: A Descriptive Cross-sectional Study. *JNMA J Nepal Med Assoc* 2022; 60(245): 54-58.
28. Bosten JM, Goodbourn PT, Lawrance-Owen AJ, Bargary G, Hogg RE, Mollon JD. A population study of binocular function. *Vision Research* 2015; 110: 34-50.
29. Slonim PS, Weissman S, Glazer E, Nettler PA. Effects of training on dynamic stereo acuity performance by males and females. *Percept Mot skills* 1975; 40(2): 359-362.
30. Fricke T, Siderov J. Non-stereoscopic cues in the Random-Dot E stereotest: results for adult observers. *Ophthalmic Physiol Opt* 1997; 17(2): 122-127.
31. Williamson I, Keating P, Bjerre A. The effect of induced monocular blur by bangerter filters on measures of visual acuity and stereoacuity. *Strabismus* 2021; 29(2): 74-80.