

ORIGINAL ARTICLE

The Relationship Between Serum Lipids and Severity of Macular Edema in Diabetic Patients

Ebrahim Mikaniki¹, Seyed Ahmed Rasoulinejad¹, Leila GharehDaghly², Amir Hosein Shirzadian², Ali Bijani³

¹ Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran

² General Physician, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran

³ General Physician, Non-Communicable Pediatric Diseases Research Center, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran

(Received 23 October, 2010 ; Accepted 20 January, 2011)

Abstract

Background and purpose: Macular edema is a common causes of visual imparity in diabetic patients. Several studies have been done to evaluate prevention methods and management strategies. This study was performed to determine whether serum lipids accelerates the creation of macular edema.

Materials and methods: Blood serum lipids in 180 diabetic patients referred to eye clinic of Shahid Beheshti Hospital were evaluated. Data obtained from patients were classified in three groups: diabetic retinopathy without macular edema (group 1), patients with mild diabetic retinopathy with macular edema (group 2) and patients with diabetic retinopathy with macular edema and hard exudates (group 3). The data were analyzed by SPSS version 18 using ANOVA Tukey test. P.value less than 0.05 were considered significant.

Results: Total cholesterol in groups 1, 2 and 3 were 402.53 ± 95.202 , 213.52 ± 17.204 and 201.113 ± 74.228 , respectively ($P>0.05$). The mean HDL in groups 1, 2 and 3 were 586.15 ± 25.44 , 920.22 ± 32.47 and 009.11 ± 49.48 , respectively. The mean VLDL in groups 1, 2 and 3 were 396.22 ± 09.37 , 238.20 ± 85.36 and 127.15 ± 51.33 , respectively ($P>0.05$). The mean TG in groups 1, 2 and 3 were 911.227 ± 74.212 , 448.109 ± 43.187 and 741.238 ± 28.218 , respectively ($P>0.05$). The mean LDL level in group 3 (132.33 ± 53.75) was statistically higher than group 1 (113.39 ± 38.48) and group 2 (113.08 ± 42.08) ($P<0.05$).

Conclusion: The results of this study showed that, serum LDL, the intensity of macular edema and hard exudates plaques, are associated.

Key words: Diabetes, diabetic retinopathy, macular edema, lipids

J Mazand Univ Med Sci 2011; 21(80): 9-15 (Persian).

بررسی رابطه لیپیدهای سرمه و شدت ادم ماکولا در افراد مبتلا به دیابت

ابراهیم میکانیکی^۱ سید احمد رسولی نژاد^۱ لیلا قره داغلی^۲ امیرحسین شیرزادیان^۲ علی بیژنی^۳

چکیده

سابقه و هدف : ادم ماکولا یکی از علل شایع کاهش دید در بیماران دیابتی می‌باشد. مطالعات مختلفی به منظور بررسی راه‌های پیشگیری و کاهش سرعت پیشرفت آن انجام شده است. این تحقیق به منظور تعیین سطح سرمی لیپید، در ایجاد و تسریع ادم ماکولا انجام شد.

مواد و روش ها : طی یک مطالعه مورد-شاهدی سطح سرمی لیپیدهای خون در ۱۸۰ بیمار دیابتی مراجعه کننده به درمانگاه چشم بیمارستان شهید بهشتی بابل طی سال‌های ۸۷ و ۱۳۸۸ اندازه گیری شد. سپس اطلاعات به دست آمده از بیماران در ۳ گروه بیماران مبتلا به رتینوپاتی دیابتی بدون ادم ماکولا (گروه ۱: ۴۵ نفر)، بیماران مبتلا به رتینوپاتی دیابتی با ادم ماکولا خفیف (گروه ۲: ۴۵ نفر) و بیماران مبتلا به رتینوپاتی دیابتی با ادم ماکولا به همراه پلاک اگزودای سخت (گروه ۳: ۹۰ نفر) طبقه‌بندی شدند. سپس مقادیر آزمایشگاهی جمع آوری شد و توسط نرم افزار آماری SPSS و آزمون‌های ANOVA و Tukey مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها : در این بررسی میانگین کلسترول تام (mg/dl) در گروه‌های یک تا سه بترتیب $53/4 \pm 95/95$ ، $213/202 \pm 52/202$ و $204/17 \pm 52/113$ و $228/74 \pm 0/05$ ($p > 0/05$)، میانگین HDL (mg/dl) در گروه‌های یک تا سه به ترتیب $48/49 \pm 0/05$ ، $47/32 \pm 0/09$ و $48/44 \pm 0/09$ ($p > 0/05$)، میانگین VLDL در گروه‌های یک تا سه بترتیب $15/58 \pm 22/25$ ، $920/25 \pm 11/00$ و $47/32 \pm 11/00$ ($p > 0/05$)، میانگین تری گلیسرید (mg/dl) در گروه‌های یک تا سه بترتیب $33/51 \pm 15/12$ و $36/85 \pm 20/23$ ، $37/09 \pm 22/39$ ($p > 0/05$)، میانگین LDL (mg/dl) در گروه سوم ($113/08 \pm 42/08$) بود. اما میانگین سطح LDL (mg/dl) در گروه سوم ($132/33 \pm 53/75$) بطور معنی داری بالاتر از گروه اول ($113/39 \pm 38/48$) و گروه دوم ($113/44 \pm 10/9$) بود ($p < 0/05$).

استنتاج : نتایج این مطالعه نشان داد که، سطح سرمی LDL، با شدت ادم ماکولا و پلاک اگزودای سخت، ارتباط دارد.

واژه‌های کلیدی: دیابت، رتینوپاتی دیابتی، ادم ماکولا، لیپید

مقدمه

شیوع جهانی دیابت شیرین طی دو دهه گذشته به نحو چشمگیری افزایش یافته است و از حدود ۳۰ میلیون

مورد در سال ۱۹۸۵، به ۱۷۷ میلیون مورد در سال ۲۰۰۰ رسیده است. پیش‌بینی می‌شود، تا سال ۲۰۳۰ بیش از

E-mail: dr_emikaniki@yahoo.com

مؤلف مسئول: ابراهیم میکانیکی- بابل: دانشگاه علوم پزشکی بابل

۱. گروه چشم، داشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل

۲. پژوهش عمومی، دانشگاه علوم پزشکی بابل

۳. پژوهش عمومی، مرک تحقیقات بیماریهای غیر واگیر کودکان دانشگاه علوم پزشکی بابل

تاریخ دریافت: ۸۹/۰۸/۰۳ تاریخ ارجاع جهت اصلاحات: ۸۹/۱۰/۱۵ تاریخ تصویب: ۸۹/۱۰/۳۰

است با حلقه‌هایی از اگزوودای سخت مشتق از لیپوپروتئین‌های پلاسما که به نظر می‌رسد از میکروآنوریسم‌ها ناشی شده است در ارتباط باشد. جذب اجزای مایع منجر به ته نشین شدن بقایای لبپید می‌گردد. این اتفاق معمولاً در لایه‌های پلکسی فرم داخلی و خارجی و گاهی در زیر شبکیه حسی رخ می‌دهد. این بقایا، رسوبات سفید تا زرد رنگی هستند که اگزوودای سخت نامیده می‌شود. با افزایش تراکم اگزوودای سخت، نشت لیپوپروتئین‌ها از مویرگ‌ها به سمت مرکز فووه آ، گسترش می‌یابد که باعث ایجاد و توسعه فیروز Sub fovea و در نتیجه کاهش غیر قابل برگشت بینایی می‌شود(۱۱،۱۰،۲). ادم منتشر ماکولا با ناهنجاری‌های گستردۀ مویرگ‌های شبکیه همراه است که نشت منتشر از گستگی‌های وسیع در سد خونی- شبکیه‌ای را سبب می‌شود(۷).

عوامل مختلفی در بروز ادم ماکولای دیابتی و شدت آن نقش دارند که از آن جمله می‌توان به زمان آغاز دیابت (هیپرگلیسمی مزمن و طول دوره دیابت)، کنترل ضعیف قند خون افزایش مقدار HbA_{1C}، فشار خون بالا، هیپرلیپیدمی اشاره کرد(۶).

در مطالعه‌ای در بیماران هندی مبتلا به دیابت نوع دو به همراه رتینوپاتی غیر پرولیفراتیو به همراه ادم ماکولا قابل توجه از نظر بالینی، سطح کلسترول و LDL به عنوان ریسک فاکتورهای مستقل در ایجاد اگزوودای سخت دیابتی معرفی شدند(۲). در مطالعه دیگری در ترکیه، ارتباطی بین سطح سرمی لبپیدها و HbA_{1C} با شدت ادم ماکولای دیابتی و پلاک اگزوودای چربی سخت یافت شد(۲) و یا در مطالعه دیگری در روسیه، مشخص گردید کنترل سطح لبپید و سطح گلوکز و فشارخون نقش مهمی در جلوگیری از ایجاد رتینوپاتی ناشی از دیابت دارند(۱۳) همچنین در مطالعه‌ای در ایالات متحده انجام شد، مشخص گردید که سطوح بالای کلسترول و LDL سرمی با ادم ماکولای دیابتی و ادم ماکولا قابل توجه از نظر بالینی ارتباط دارد(۱۴).

۳۶۰ میلیون نفر به دیابت مبتلا شوند و حتی برخی از کشورهای جهان سوم مثل هندوستان به صورت مرکز جهانی دیابت تا سال ۲۰۳۰ تبدیل خواهد شد(۱-۳). عوارض سیستمیکی که این بیماری دارد بر روی فرد و جامعه اثرگذار است. زیرا بیمار مبتلا به دیابت را در مهم‌ترین سال‌های مفید و تولید کنندگی اش در جامعه تحت تأثیر قرار می‌دهد(۵،۴).

عوارض چشمی دیابت از جمله مهم‌ترین عوارض آن است که توجه زیادی را به خود جلب کرده است و شامل رتینوپاتی، ادم ماکولا و ... می‌باشد. رتینوپاتی دیابتی به دو مرحله زودرس؛ رتینوپاتی دیابتی غیر پرولیفراتیو و مرحله پیشرفته؛ رتینوپاتی پرولیفراتیو طبقه‌بندی می‌شوند(۶،۷).

ادم ماکولا (Diabetic macular edema: DME)

از عوارض بینایی بسیار مهم ناشی از نفوذپذیری غیر طبیعی عروق شبکیه در افراد مبتلا به رتینوپاتی دیابتی است(۷). به طور کلی، ادم ماکولا عارضه عمده دیابت در مبتلایان به دیابت نوع یک و نوع دو می‌باشد. تغییرات غیر طبیعی در مویرگ‌های چشم و نشت مویرگی ناشی از نفوذپذیری غیر طبیعی عروق شبکیه منجر به ادم ماکولای دیابتی و کاهش بینایی و نایینایی احتمالی درصورت عدم درمان می‌شود(۸). ادم ماکولا قابل توجه از نظر بالینی را به شکل ذیل تعریف نموده است:

- ناحیه‌ای از افزایش ضخامت شبکیه در مرکز ماکولا یا ناحیه ۵۰۰ میکرون از مرکز ماکولا
- اگزوودای سخت در مرکز ماکولا یا ناحیه ۵۰۰ میکرون از مرکز ماکولا اگر با ناحیه‌ای از افزایش ضخامت شبکیه همراه باشد.

- ناحیه یا نواحی از ضخامت شبکیه به وسعت یک دیسک، با فاصله ۱۵۰۰ میکرون از مرکز ماکولا(۹).

DME به صورت افزایش کانونی یا منتشر ضخامت رتین با یا بدون اگزوودا ظاهر می‌یابد. ادم کانونی ممکن

کلسترول اندازه‌گیری و ثبت شد. براساس نوع معاینه شبکیه و ماکولا بیماران به سه دسته تقسیم شدند: (الف) گروه شاهد (گروه اول)، بیماران دیابتی با رتینوپاتی ولی بدون ادم ماکولای شامل ۹۰ بیمار (ب) گروه مورد (گروه دوم)، بیماران دیابتی با رتینوپاتی همراه با ادم ماکولای خفیف شامل ۴۵ بیمار (ج) گروه مورد (گروه سوم)، بیماران دیابتی با ادم ماکولای شدید و اگزودای سخت شامل ۴۵ بیمار. تمامی معاینات توسط یک پزشک متخصص چشم انجام شده است.

داده‌ها پس از جمع‌آوری وارد نرم‌افزار آماری SPSS شده و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. برای داده‌های پارامتریک از آزمون آماری ANOVA و آزمون Tukey استفاده شد (مقدار p کمتر از ۰/۰۵ معنی‌دار تلقی گردید).

یافته‌ها

متوسط سن افراد شرکت‌کننده در گروه یک (بیماران دیابتی همراه با رتینوپاتی ولی بدون ادم ماکولا) $52/3 \pm 9/94$ سال، که ۶۸ نفر زن ($74/5$ درصد) و ۲۲ نفر مرد ($25/5$ درصد)، متوسط سن در گروه دوم (بیماران دیابتی با رتینوپاتی همراه با ادم ماکولای خفیف) $51/95 \pm 7/78$ سال، که ۳۴ نفر زن ($76/2$ درصد) و ۱۱ نفر مرد ($23/8$ درصد) و متوسط سن در گروه سوم (بیماران دیابتی با ادم ماکولای شدید و اگزودای سخت) $56/04 \pm 8/68$ سال، که ۳۲ نفر زن ($70/3$ درصد) و ۱۳ نفر مرد ($29/2$ درصد) بودند.

متوسط طول دوره دیابت برای گروه‌ها در گروه یک: $6/58 \pm 9/82$ سال ($11/16$ سال)، در گروه دو: $6/92 \pm 15/17$ سال ($17/32$ سال)، در گروه سه: $6/35 \pm 13/38$ سال ($14/22$ سال) (CI ۹۵% = ۱۰/۵۵ - ۱۴/۲۲) بود.

مقدار میانگین و همینظر مقدار p ، برای هر یک از متغیرهای مورد مطالعه به تفکیک گروه‌های سه گانه در جدول شماره ۱ آمده است.

حتی در یک مطالعه مشخص شد که درمان خوراکی آتورواستاتین در بیماران با دیابت نوع دو همراه با دیس لیپیدی، باعث کاهش اگزودای سخت در ادم ماکولای قابل توجه می‌شود(۱۵).

در سال‌های اخیر مطالعاتی برای به تاخیر انداختن و جلوگیری از شروع عوارض چشمی ناشی از دیابت انجام شده است که تاثیر لیپیدهای سرم و هیرپلیپیدمی در شروع این فرآیند بسیار مورد توجه بوده است. هیرپلیپیدمی به علت سیتوتوکسیک بودن برای سلول‌های اندوتیال از فاکتورهای خطر ایجاد ادم ماکولا و اگزودای چربی می‌باشد(۶). با توجه به مطالعه فوق بررسی سطح سرمی لیپیدها در بیماران مبتلا به دیابت و رتینوپاتی دیابتی ضروری بنظر می‌رسد. لذا این مطالعه با هدف تعیین رابطه لیپیدهای سرم و شدت ادم ماکولا در افراد دیابتیک انجام شد.

مواد و روش‌ها

طی یک مطالعه مورد- شاهدی در سال‌های ۸۷ و ۱۳۸۸، از میان بیماران با تشخیص قطعی دیابت مراجعه کننده به درمانگاه چشم بیمارستان شهید بهشتی و آیت‌الله روحانی شهرستان بابل، ۱۸۰ بیمار انتخاب شدند. معیار ورود به مطالعه، بیماران مراجعه کننده به درمانگاه با تشخیص قطعی دیابت بر مبنای معیارهای WHO بود که تشخیص بیماری براساس علائم بالینی بیمار به همراه غلظت تصادفی گلوكز خون بالای ۲۰۰ میلی‌گرم در دسی‌لیتر و یا گلوكز ناشتاپی پلاسمابالای ۱۲۶ میلی‌گرم در دسی‌لیتر در دو نوبت یا قند دو ساعت بعد از غذا بیشتر از ۲۰۰ میلی‌گرم بر دسی‌لیتر بود(۷). بیمارانی که سابقه مصرف داروهای کاهنده چربی خون و سابقه پرفشاری خون داشتند از مطالعه کنار گذاشته شدند. در پرسشنامه تهیه شده برای هر بیمار، اطلاعات موردنیاز مطالعه شامل سن، جنس، طول مدت ابتلا به دیابت، میزان HbA_{1C}، قندخون ناشتا، سطح سرمی لیپیدهای سرم شامل LDL، VLDL، HDL، تری‌گلیسرید و

جدول شماره ۱: مقایسه مقادیر متغیرهای اندازه گیری شده به تفکیک گروه ها

گروه	رنتیوپاتی بدون ادم ماکولا	انحراف معیار \pm میانگین	(ادم ماکولا) خفیف	سطح معنی داری
° HbA ₁ C	۹/۵۳ \pm ۱/۸۴۸	۹/۱۳ \pm ۱/۵۰۵	۹/۷۷ \pm ۱/۷۷۴	۰/۴۲۳
قندخون ناشتا °	۲۰/۸۰۳ \pm ۷۴/۰۷۵	۲۱/۷۷ \pm ۶۳/۴۶	۲۱۵/۶۳ \pm ۷۷/۱۱۸	۰/۷۲۹
کلسترول °	۲۰/۲۹۵ \pm ۵۳/۴۰۲	۲۰۴/۱۷ \pm ۵۲/۲۱۳	۲۲۸/۷۴ \pm ۱۱۳/۲۰۱	۰/۱۳۵
تری کلیسرید °	۲۱۲/۷۴ \pm ۲۲۷/۹۱۱	۱۸۷/۴۳ \pm ۱۰۹/۴۴۸	۲۱۸/۲۸ \pm ۲۳۸/۷۴۱	۰/۷۷۹
° VLDL	۳۷/۰۹ \pm ۲۲/۳۹۶	۳۶/۸۵ \pm ۲۰/۲۳۸	۳۳/۵۱ \pm ۱۵/۱۲۷	۰/۶۲۵
° LDL	۱۱۳/۳۹ \pm ۲۸/۴۸۷	۱۱۳/۰۸ \pm ۴۲/۰۸۹	۱۳۲/۳۳ \pm ۵۳/۷۵۶	۰/۰۴۹
° HDL	۴۴/۲۵ \pm ۱۵/۵۸۶	۴۷/۳۲ \pm ۲۲/۹۲	۴۸/۴۹ \pm ۱۱/۰۰۹	۰/۳۲۳

واحد: درصد

واحد: میلی گرم در دسی لیتر

بحث

تقسیم شدند و سطوح کلسترول، تری گلیسرید، VLDL در آنها اندازه گیری شد(۱۶). البته در مطالعه حاضر اگر چه میانگین سطح سرمی تری گلیسرید در گروه سوم بالاتر بود ولی این ارتباط از نظر آماری معنی دار نبود. در این مطالعه میانگین سطح سرمی HDL و VLDL بین گروهها ارتباط معنی داری نداشت. نتایج فوق در مورد سطح سرمی VLDL مشابه نتیجه به دست آمده توسط Ozera و همکاران در سال ۲۰۰۸ در ترکیه بوده است(۱۲). همین طور در مطالعه Ugum و همکاران بین سطح تری گلیسرید، VLDL و HDL بین دو گروه با وابدوان اگزودای سخت، ارتباط معنی دار یافت نشد(۱۷) که در این مطالعه بیماران با رنتیوپاتی دیابتی غیر پرولیفراتیو در دو گروه بدون اگزودای سخت و مبتلا به اگزودای سخت مورد بررسی قرار گرفتند. همین طور در مطالعه Klein و همکاران در ایالت متحده، بین مقادیر کلسترول سرم و HDL، با پیشرفت رنتیوپاتی و یا ادم ماکولا در بیماران با شروع جدید دیابت ارتباطی یافت نشد(۱۸). علی‌رغم این نتایج، مطالعات دیگری هم انجام شده است که بین سطوح لیپیدهای سرم و اگزودای سخت رتین، ارتباط معنی داری را گزارش کرده‌اند که از آن جمله می‌توان به مطالعه Lyons و همکاران بر روی بیماران دیابت نوع یک اشاره کرد که گزارش کردن رنتیوپاتی با افزایش تری گلیسرید و VLDL همراهی داشته ولی با HDL رابطه عکس دارد(۲۹).

در این مطالعه سطوح قند خون ناشتا و HbA₁C، تری گلیسرید، کلسترول تام، VLDL، LDL، HDL در بین سه گروه مورد نظر ارزیابی شد. در مطالعه حاضر بین سطح HbA₁C و شدت ادم ماکولا ارتباطی یافت نشد، اگرچه متوسط HbA₁C در گروه سوم بالاتر از دو گروه دیگر بود ولی این ارتباط از لحاظ آماری معنی دار نبود. متوسط HbA₁C، در گروه سوم ۹/۵۳ \pm ۱/۷۷ بود که بعلت بالا بودن می‌تواند نشانگر عدم کنترل مناسب دیابت باشد که مشابه نتیجه به دست آمده توسط Ozera و همکاران در سال ۲۰۰۸ در ترکیه می‌باشد(۱۲).

در مطالعه حاضر بین سطح قندخون ناشتا و شدت ادم ماکولا ارتباط معنی دار یافت نشد اگرچه مقدار قندخون ناشتا در بیماران گروه مورد، بیشتر از گروه شاهد بوده است ولی این ارتباط از لحاظ آماری معنی دار نبود. سطح سرمی کلسترول در گروه سوم بیشتر از دو گروه دیگر بود، لیکن این اختلاف از لحاظ آماری معنی دار نبود که مشابه نتیجه بدست آمده توسط Ozera و همکاران در ترکیه در سال ۲۰۰۸ بوده است(۱۲). به طور مشابه در مطالعه‌ای که در دانشگاه هاروارد توسط Miljanovir و همکاران انجام شد بین سطح سرمی کلسترول و پیشرفت رنتیوپاتی بعد از ثابت کردن مقادیر HbA₁C، ارتباط معنی داری یافت نشد که در آن بیماران دیابتی به سه گروه بدون رنتیوپاتی و یا ادم ماکولا و گروه با ادم ماکولا خفیف و گروه با ادم ماکولا شدید

یا گلیکوزیله شده) باعث کاهش بیان ژن در پریسیت‌ها می‌شود^(۲۳) و به دنبال این تغییرات اختلال عملکرد میتوکندری و مرگ پریسیت‌ها، رخ می‌دهد^(۲۴). همینطور در مدل‌های حیوانی (Bovin) LDL اکسید شده باعث کاهش عمر پریسیت‌ها و تخریب سلول‌های اندوتیال شده بود^(۲۵).

در نهایت، مطالعه حاضر نشان داد که سطح سرمی LDL با شدت ادم ماکولاً دیابتی و اگزودای سخت ارتباط دارد لذا بنظیری رسید استفاده از پایین آورنده‌های سطح لپید در جلوگیری از پیشرفت ادم ماکولاً و تشکیل اگزودای سخت موثر باشد.

سپاسگزاری

از پرسنل بخش چشم و همچنین بخش آزمایشگاه بیمارستان‌های شهید بهشتی و آیت الله روحانی شهرستان بابل که در انجام این پژوهش ما را یاری نمودند قدردانی می‌گردد.

References

- Wild S, Roglic G, Green A, Sicree R, King H. Global prevalence of diabetes: Estimates for the year 2000 and projections for 2030-published by American diabetes association. *Diabetes Care J* 2004;1047-1053.
- Sachdev N, Sahni A. Association of systemic risk factors with the severity of retinal hard exudates in a north Indian population with type 2 diabetes. *J Postgrad Med* 2010; 56(1): 3-6.
- Fauci AS, Braunwald E, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL, et al. Harrison's manual of Medicine. 17th ed. McGraw-Hill: Philadelphia, 2008.
- Devlin TM. Textbook of biochemistry with clinical correlations. 6th ed. Philadelphia:
- Wiley, 2006.
- Bhavasar AR, Atebara NH, Drouilhet JH. Retinopathy, Diabetic, Proliferative. eMedicine Web site. Available at: URL: <http://emedicine.medscape.com/article/1225210-overview>. Updated September 7, 2006. Accessed February 17, 2009.
- Riordan-Eva P, Whitcher JP. Vaughan and Asbury'S General Ophthalmology. 16th ed, McGraw-Hill, Philadelphia; 2008. P 240-247.
- Basic and Clinical Science Course. American Academy of Ophthalmology; Retina and Vitreous; Section 1; page 110-115.
- Chen E, Looman M, Laouri M, Gallagher M, Nuys K.V, Lakdwall D, et al. Burden of illness of diabetic macular edema: Literature review.

در مطالعه ما میانگین سطح سرمی LDL در گروه سوم یعنی بیماران مبتلا به ادم ماکولا به همراه اگزودای سخت، بیشتر از سایر گروه‌ها بود که این ارتباط از لحاظ آماری معنی دار بوده است. نتایج این مطالعه مشابه نتیجه به دست آمده توسط Raman و همکاران، در سال ۲۰۱۰ بوده، که در آن سطح سرمی LDL در بیماران مبتلا به ادم ماکولاً دیابتی بالاتر بوده است^(۲۰). همین‌طور در مطالعه انجام شده توسط Romero و همکاران بر روی بیماران دیابتی بدون رتینوپاتی و نفروپاتی مشخص شد که کنترل سطح LDL، باعث کاهش پیشرفت ادم ماکولا می‌شود^(۲۱). Klein و Roy در مطالعه‌ای بر روی بیماران مبتلا به دیابت نوع یک در دو گروه با ادم ماکولا و گروه با اگزودای سخت، نشان دادند که پروتئینوری، جنس مذکور، سطح بالاتر LDL و دوره ابتلا به دیابت به طور چشمگیر و مستقلی، با شدت اگزودای سخت شبکیه ارتباط دارد^(۲۲). دیابت به عنوان عامل مهم رتینوپاتی دیابتی و ناینایی در بالغین باعث افزایش اکسیداسیون LDL شده و LDL تغییر یافته (اکسید شده

- Curr Med Res Opini J 2010; 26(7): 1587-1597.
9. Federman JL, Gouras P, Schubert H. Retina and vitreous; Vol 9. Textbook of Ophthalmology. 1994. PP 7-24.
 10. Chew EY, Klein ML, Ferris FL, Remaley NA, Murphy RP, Chantry K, et al. Association of elevated serum lipid levels with retinal hard exudates in diabetic retinopathy: Early Treatment Diabetic Retinopathy study (ETDRS) report 22. Arch Ophthalmol 1996; 114: 1079-1084.
 11. Fong DS, Segal PP, Myers F, Ferris FL, Hubbard LD, Davis MD. Subretinal fibrosis in diabetic macular edema.: (ETDRS) report 23. Early Treatment Diabetic Retinopathy Study Research Group. Arch Ophthalmol 1997; 115: 873-877.
 12. Ozer PA, Unlu N, Demir MN, Hazirolan DO, Acar MA, Duman S. Serum lipid profile in diabetic macular edema. J Diabetes Complications 2009; 23(4): 244-248.
 13. Dedov I, Maslova O, Suntsov Y, Bolotskaia L, Milenkaia T, Besmertnaia L. Prevalence of diabetic retinopathy and cataract in adult patient with type 1 and type 2 diabetes in russia. Society for Biomedical Diabetes Research Journal. Rev Diabet Stud 2009, 6(2): 124-129.
 14. Gupta V, Thapar Sh, Bhansali A. Lipid lowering drug atorvastatin as an adjacent manegment of diabetic macular edema. Am J Ophthalmol 2004; 137(4): 675-682.
 15. Tapp RJ, Shaw JE, Harper CA, De Courten MP, Balkau B, McCarty DJ, et al. The prevalence of and factors associated with diabetic retinopathy in the Australian population. Diabetes Care J 2003; 26: 1731-1737.
 16. Miljanovic B, Glynn RJ, Nathan DM, Manson JE, Schaumberg DA. A prospective study of serum lipids and risk of diabetic macular edema in type 1 diabetes. Diabetes 2004; 53(11): 2883-2892.
 17. Ucgun NI, Yildirim Z, Kiliç N, Gürsel E. The importance of serum lipids in exudative diabetic macular edema in type 2 diabetic patients. Ann N Y Acad Sci 2007; 1100: 213-217.
 18. Klein BE, Klein R, Moss SE. Is serum cholesterol associated with progression of diabetic retinopathy or macular edema in persons with younger-onset diabetes of long duration? Am J Ophthalmol 1999; 128(5): 652-654.
 19. Lyons TJ, Jenkins AJ, Zheng D, Lackland DT, McGee D, Garvey WT, et al. Diabetic retinopathy and serum lipoprotein subclasses in the DCCT/EDIC cohort. Invest Ophthalmol Vis Sci 2004; 45(3): 910-918.
 20. Raman R, Rani PK, Kulothungan V, Rachepalle SR, Kumaramanickavel G, Sharma T. Influence of serum lipids on clinically significant versus nonclinically significant macular edema: SN-DREAMS Report number 13. Ophthalmology 2010; 117(4): 766-772.
 21. Romero P, Baget M, Mendez I, Fernandez J, Salvat M, Martinez I. Diabetic macular edema and its relationship to real microangiopathy: a sample of type I diabetes mellitus patients in a 15-year follow-up study. Diabet Complication J 2007; 21(3): 172-180.
 22. Roy MS, Klein R. Macular edema and retinal hard exudates in African Americans with type 1 diabetes: the New Jersey 725. Arch Ophthalmol 2001; 119(2): 251-259.
 23. Song W, Barth JL, Yu Y, Lu K, Dashti A, Huang Y, et al. Effects of oxidized and glycated LDL on gene expression in human retinal capillary pericytes. Invest Ophthalmol Vis Sci 2005; 46(8): 2974-2982.

24. Song W, Barth JL, Lu K, Yu Y, Huang Y, Gittinger CK, et al. Effects of modified low-density lipoproteins on human retinal pericyte survival. *Ann N Y Acad Sci* 2005; 1043: 390-395.
25. Lyons TJ, Li W, Wells-Knecht MC, Jokl R. Toxicity of mildly modified low-density lipoproteins to cultured retinal capillary endothelial cells and pericytes. *Diabetes* 1994; 43(9): 1090-1095.

Archive of SID